DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION DE DIFFERENTS MEDICAMENTS APRES OUVERTURE

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
Antiseptiques							
AMUKINA MED *sol. aqueuse*	hypochlorite de sodium		ouvert	3 mois	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la lumière	[1]
BETADINE *sol. aqueuse*	PVP-iode		ouvert	3 ans	T° ambiante	Flacon bien fermé	[1], [7], [10], [11]
			ouvert et **dilué**	Utilisation immédiate	-		
BETASEPTIC *sol. alcoolique*	PVP-iode		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la chaleur	[5], [10], [11]
CHLORHEXIDINE Braun *sol. aqueuse*	chlorhexidine		ouvert	24 h	T° ambiante	Flacon bien fermé	[7], [11]
CUTASEPT G *sol alcoolique colorée*	chlorure benzalkonium		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Abri de la chaleur	[2]
DAKIN Cooper stabilisé *sol. aqueuse*	hypochlorite de sodium		ouvert	1 mois	T° ambiante	Flacon bien fermé	[6]
EAU OXYGENEE 3% HAENSELER *sol. aqueuse*	peroxyde d'hydrogène		ouvert	1 mois	T° ambiante	Flacon bien fermé	[2], [7], [11]
ETHANOL 70% *sol. alcoolique*	alcool éthylique		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la chaleur	[2], [7]
HIBIDIL *sol aqueuse colorée*	chlorhexidine		ouvert	Utilisation immédiate	-	Usage unique	[1], [7]
LIFO-SCRUB *savon liquide*	chlorhexidine		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Flacon bien fermé	[7], [10], [11]
MERFEN *sol. aqueuse*	chlorhexidine + benzoxonium chlorure		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[2]
MICLORBIC alc. 2% coloré *sol. alcoolique*	chlorhexidine + isopropanol		ouvert	30 jours	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la chaleur	[24]
PRONTOSAN *sol. aqueuse*	polihexanide + undecylenamidopropyl betaine		ouvert	8 semaines	T° ambiante	-	[1, 16]
SOFTASEPT CHX 2% *sol. alcoolique*	chlorhexidine + isopropanol		ouvert	1 an	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la chaleur	[2], [5], [11]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
STERILLIUM *gel*	mecetronium + propranolol		ouvert, en distributeur	6 mois	T° ambiante	Flacon bien fermé	[7], [10]
Préparations à usage ophtalmologique							
ALPHAGAN	brimonidine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
ARTEOPTIC	cartéolol	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
ARTEOPTIC LA UD *monodoses*	cartéolol	N	**sachet** ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
			monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique	
AZOPT	brinzolamide	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
COSOPT	dorzolamide + timolol	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
COSOPT-S *monodoses*	dorzolamide + timolol	N	**sachet** ouvert	15 jours	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
			monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique	
DESOMEDINE	hexamidine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
DESOMEDINE-DD *monodoses*	hexamidine	O	**sachet** ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
			monodose	12 h	T° ambiante	Refermer après chaque emploi, jeter en fin de journée	
FLOXAL	ofloxacine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
FLOXAL-UD *monodoses*	ofloxacine	N	monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique	[1]
FUCITHALMIC	acide fusidique	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
LACRINORM	carbomère 980	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
LACRINORM F UD *monodoses*	carbomère 980	N	monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique	[1]
LACRYCON	acide hyaluronique	N	**sachet** ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
			monodose	12 h	T° ambiante	Refermer après chaque emploi, jeter en fin de journée	
LACRYVIS SE *monodoses*	carbomère 934	N	monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique, abri de la lumière	[1]
LATANOPROST MEPHA	latanoprost	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo	Abri de la lumière	[1]
			ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	
NACL 0.9% *monodoses*	NaCl 0,9%	N	monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique	[1]
OCULAC	polyvidone	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
OCULAC-SDU *monodoses*	polyvidone	N	monodose	Utilisation immédiate	-	Usage unique, abri de la lumière	[1]
TOBRADEX *susp. ophtalm.*	tobramycine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Conserver le flacon en position verticale, agiter avant l'emploi	[1]
TRUSOPT	Dorzolamide	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
VITAMINE A « BLACHE »	rétinol	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo		[1]
			ouvert	1 mois	T° ambiante		
XALACOM	latanoprost et timolol	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo	Abri de la lumière	[1]
			ouvert	1 mois	T° ambiante		
Formes liquides orales							
ABIDEC ***sol***	polyvitamines	N	ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[5]
AERIUS *sol*	desloratadine	O	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[1], [5]
ALUCOL *gel*	aluminium + Mg hydroxydes	O	ouvert	2 mois	T° ambiante	-	[1]
ALGIFOR JUNIOR *susp*	ibuprofène	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[12]
APIRETAL *sol*	paracétamol	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Dans l'emballage original	[25]
AXURA *sol. + pompe doseuse*	mémantine	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[1]
ATROPINE sulfate 0,5 mg/mL *gttes*	atropine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[3]
BENOCTEN *gttes*	diphénhydramine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
BEPANTHEN MED *sol*	dexpanthénol	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
BEXINE *gttes*	dextrométhorphane	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
BEXINE *sirop*	dextrométhorphane	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[12]
BUCCO TANTUM *sol*	benzydamide	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[6], [3]
CETALLERG *gttes*	cétirizine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante		[1], [2]
CIPRALEX *gttes*	escitalopram	O	ouvert	8 semaines	T° ambiante		[1]
CLOPIXOL *gttes*	zuclopenthixol	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo	-	[5]
			ouvert	6 semaines	T° ambiante	Abri de la lumière	
COLOLYT	sels de sodium, de potassium + macrogol	N	reconstitué	7 jours	frigo	-	[1]
DAFALGAN 30 mg/mL *sirop*	paracétamol	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[1]
DEPAKINE *sol*	valproate de sodium	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
DEPAKINE *sirop*	valproate de sodium	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2], [3]
DIFLUCAN *susp*	fluconazole	O	reconstitué	14 jours	T° ambiante	-	[1]
DISTRANEURIN *mixture*	clométhiazole	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo	-	[5]
			ouvert	4 mois	frigo	Conserver dans l'emballage original à l'abri de la lumière	
DROSSADIN	hexetidine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Conserver dans l'emballage original à l'abri de la lumière	[6]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
ENSURE	supplément nutritif oral		ouvert	24 h	frigo	-	[5]
FENIALLERG *gttes*	dimétidine maléate	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [2]
FLATULEX *gttes*	siméticone	O	ouvert	13 semaines	T° ambiante		[1]
FORTIMEL	supplément nutritif oral		ouvert	24 h	frigo	-	[5]
GARGARISME CONTRE LES APHTES - PIC	sodium bicarbonate + lidocaïne HCl + diphénhydramine HCl	O	Non ouvert	Date d'expiration	frigo	-	[6]
			ouvert	14 jours	frigo	-	
GASTROGRAFIN	meglumine diatrizoate (iode)	O	ouvert	72 h	T° ambiante		[1]
GUTRON	midodrine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[2]
HALDOL *gttes*	halopéridol	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[2], [12]
HYDROMORPHONE 1 mg/ml PIC *sol. orale*	hydromorphone HCl	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[6], [18]
HYDROMORPHONE 5 mg/ml PIC *sol. orale*	hydromorphone HCl	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[6], [18]
KEPPRA *solution*	lévétiracétam	O	ouvert	7 mois	T° ambiante	-	[1]
LAXATIVE ED	extrait de bourdaine + lactulose		ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[6]
LAXOBERON	picosulfate de sodium	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2], [3], [12]
LEFAX PUMP-LIQUID *susp*	siméticone	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[5]
MALTOFER *sirop et gouttes*	hydroxyde de fer (III)	O	ouvert	2 mois	T° ambiante	-	[2], [4]
METHADONE 10 mg/mL BICHSEL *sol. orale*	méthadone	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[5]
METHADONE 1% (10 mg/mL) STREULI *gouttes*	méthadone	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[26]
MORPHINE 20 mg/mL Bichsel *gttes*	morphine HCl	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[6]
MORPHINE 1 mg/mL Apolab *Sol. orale*	morphine HCl	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[5]
MYCOSTATINE	nystatine	O	ouvert	1 semaine	T° ambiante	-	[3]
NEO-ANGIN *spray*	chlorhexidine + lidocaïne	N	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[5]
NEOCITRAN Expectorant *sirop*	guaïfénésine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[1, 6]
NOZINAN	lévomépromazine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [3]
OXYNORM	oxycodone	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
PHOSPHONEUROS *gttes*	mélange de sels de phosphate	N	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[21]
PREDNISOLONE Bichsel 10 mg/mL *sol. orale*	prednisolone	O	ouvert	2 semaines	T° ambiante	-	[5]
PRIMPERAN *solution*	métoclopramide	O	ouvert	12 jours	T° ambiante	Abri de la lumière	[3, 5]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
RISPERDAL *sol*	rispéridone	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[1]
RIVOTRIL *gttes*	clonazépam	N	ouvert	4 mois	T° ambiante	-	[1]
RUDOLAC	lactulose, lactose, galactose	N	ouvert	6 mois	T° ambiante	Flacon bien fermé, abri de la lumière	[2], [3]
SIROP DE FIGUES	figues + séné	O	ouvert	2 mois	T° ambiante	-	[1]
SOIN DE BOUCHE BICHSEL	bicarbonate Na + NaCl	N	ouvert	24 h	T° ambiante	-	[5]
SOLIAN *gttes*	amisulpride	O	ouvert	2 mois	T° ambiante	-	[1]
SUPRADYN PROTOVIT *sol*	polyvitamines	N	ouvert	2 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[20]
SURMONTIL *gttes*	trimipramine	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
TRAMADOL MEPHA *gttes*	tramadol	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[1, 3]
VI-DE 3	cholécalciférol	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[2], [12]
VITAMINE D3 STREULI PROPHYLAX	cholécalciférol	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	Conserver dans l'emballage original à l'abri de la lumière, ne pas utiliser si sol. trouble	[1, 6]
Antibiotiques per os							
AMOXI-MEPHA *susp*	amoxicilline	O	reconstitué	14 jours	frigo	-	[1]
AZITHROMYCINE Mepha *susp*	azithromycine	N	reconstitué	5 jours	T° ambiante	Conserver dans l'emb. d'origine	[1]
CEFPODOXIM *susp*	cefpodoxime	O	reconstitué	14 jours	frigo	Le dessiccant (dans le bouchon du flacon) doit être retiré et jeté avant la reconstitution	[1]
CIPROXINE *susp*	ciprofloxacine	N	reconstitué	14 jours	T° ambiante	-	[1], [3]
CLARITHROMYCINE *susp*	clarithromycine	O	reconstitué	14 jours	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [12]
CO-AMOXI MEPHA *susp*	amoxicilline + ac. clavulanique	O	reconstitué	7 jours	frigo	-	[1], [3]
NOPIL sirop enfants	triméthoprime + sulfaméthoxazole	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]
ZINAT *susp*	céfuroxime	O	reconstitué	10 jours	frigo	Abri de la lumière	[1]
ZITHROMAX *susp*	azithromycine	O	reconstitué	5 jours	T° ambiante	Conserver dans l'emb. d'origine	[1]
Comprimés et capsules *per os* sensibles à l'humidité							

D'une manière générale, tous les médicaments devraient être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de la prise. Les comprimés/capsules ne doivent pas être déblistérisés dans les barquettes de médicaments des patients. Ceci afin de permettre l'identification des médicaments et le maintien de conditions optimales.

De plus, certains médicaments sont **particulièrement sensibles à l'humidité** et sont conditionnés dans des emballages contenant un **dessiccant**. Il est donc nécessaire de les conserver dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de la prise.

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
ANTRAMUPS (OMED, OMEPRAX et autres génériques conditionnés en flacon) *caps*	oméprazole	*na*	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les caps dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise *(dessiccant dans le bouchon)*	[1]
CREON *caps*	pancrélipase	*na*	ouvert	6 mois	T° ambiante	Conserver les caps dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise	[1]
DANCOR *cpr*	nicorandil	*na*	blister ouvert	10 jours	T° ambiante	Une fois le blister entamé, les cpr se conservent max 10 jours *(dessiccant dans le blister)*	[1]
INTELENCE *cpr*	étravirine	*na*	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les cprs dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise *Ne pas retirer le dessiccant du flacon*	[1]
ISENTRESS *cpr*	raltégravir	*na*	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les cprs dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise *Ne pas retirer le dessiccant du flacon*	[1]
PRADAXA *caps*	dabigatran	*na*	blister ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les blisters de caps dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise Détacher une caps en suivant les perforations de la plaquette	[1, 17]
PROGRAF *caps*	tacrolimus	*na*	blister ouvert	12 mois	T° ambiante	Une fois la protection d'aluminium ouverte, les caps contenues dans les blisters se conservent max 12 mois *(dessiccant dans le suremballage aluminium du blister)*	[1]
SUPRADYN PRO ENERGY-COMPLEX *cpr, cpr eff*	vitamines et minéraux	*na*	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les cprs dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise *(dessiccant dans le bouchon)*	[5]
TRUVADA *cpr*	emtricitabine et ténofovir	*na*	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Conserver les cprs dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de la prise *Ne pas retirer le dessiccant du flacon*	[1]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
Injectables multidoses							
ACTRAPID HM	insuline humaine	O	ouvert	1 mois	frigo	Abri de la lumière	[1]
CLEXANE MULTI	enoxaparine	O	ouvert	28 jours	T° ambiante	-	[1]
HUMALOG	insuline lispro humaine	O	Amp. ouverte	1 mois	frigo	-	[9],[6]
			FlexPen ouvert	1 mois	T° ambiante	**Pas de frigo**, Abri de la lumière	
INSULATARD HM	insuline humaine NPH	O	Amp. ouverte	1 mois	frigo	-	[9],[6]
			FlexPen ouvert	6 semaines	T° ambiante	**Pas de frigo**, Abri de la lumière	
LANTUS	insuline glargine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	**Pas de frigo**, Abri de la lumière	[9],[6]
LEVEMIR	Insuline détemir	O	FlexPen ouvert	6 semaines	T° ambiante	**Pas de frigo**, Abri de la lumière	[9],[6]
VICTOZA	liraglutide	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	**-**	[1]
Pommades, crèmes, gels, lotions, pour usage individuel [6]							
AMITRIPTYLLIN 2%, KETAMIN 1% *gel*	amitriptyline 2% + kétamine 1%		ouvert	6 mois	T° ambiante	Préparation de Spirig	[5]
AVIRAL	aciclovir	O	ouvert	14 jours	T° ambiante	-	[1]
BACTROBAN *pommade*	mupirocine	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
BETNOVATE *pommade / crème*	bétaméthasone valérate	N / O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
CHLORHEXAMED 1% *gel*	chlorhexidine		ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[5]
COMFEEL *crème*	crème siliconée	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
DAIVOBET *gel*	calcipotriol + bétaméthasone	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	Tube bien fermé, abri de la lumière	[1]
DAIVOBET *pommade*	calcipotriol + bétaméthasone	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
DAKTARIN *gel oral*	miconazole	N	ouvert	jusqu'à la fin du ttt, max. 6 mois	T° ambiante	-	[2], [6]
DIPROGENTA *pommade / crème*	béthaméthasone + gentamycine	N / O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
DIPROSALIC	béthaméthasone + acide salicylique	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
DOXIPROCT	dobésilate de calcium + lidocaïne	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
DOXIPROCT PLUS	dobésilate de calcium + lidocaïne + dexaméthasone	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
ELOCOM *pommade / crème*	mométasone	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
ELOCOM *solution*	mométasone	N	ouvert	30 jours	T° ambiante		[1]
FUCICORT *crème*	ac. fusidique + bétaméthasone	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[2]
FUCIDINE *crème*	acide fusidique	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Tube bien fermé	[1]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
FUCIDINE *pommade*	acide fusidique	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	Tube bien fermé	[1]
HUILE AMANDE DOUCE HAENSELER	huile d'amande douce	N	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[6]
ICHTHOLAN	ichthyol	N	ouvert	1 an	T° ambiante	Tube bien fermé, abri de l'humidité	[2]
K-Y *gel stérile*	hydroxyméthylcellulose	O	ouvert	6 mois a)	T° ambiante	a) Si application stérile exigée, utiliser un tube non entamé	[5, 6]
LAMISIL *crème*	terbinafine	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[6]
LAMISIL Pedisan *spray*	terbinafine	O	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[1]
NIZORAL *crème*	ketoconazole	N	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[1]
NU-GEL	Hydrogel + alginate de sodium + propylenglycol		ouvert	1 semaine	T° ambiante	-	[19]
OESTRO GYNAEDRON *crème*	estriol	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
OXYPLASTINE	oxyde de zinc	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
PASTA BOLI *pâte*	acide salicylique	N	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[5]
PEVARYL *crème*	econazole	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
PEVISONE	econazole + triamcinolone	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
PROCTO SYNALAR N *pommade*	acétonide de fluocinolone + lidocaïne	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
PRONTOSAN *gel*	polihexanide + Undecylenamidopropyl betaine	N	ouvert	8 semaines	T° ambiante	-	[1]
SCHERIPROCT *pommade*	prednisolone + cinchocaïne	N	ouvert	1 an	T° ambiante	**Pas de frigo**	[2]
TANNO-HERMAL *lotion*	talc + oxyde de zinc + tanin	O	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[1]
XYLOCAINE 2% *gel*	lidocaïne	O	ouvert	Utilisation immédiate	T° ambiante	Usage unique	[1]
Pommades, crèmes, gels, lotions, pour plusieurs patients [6]							
BRAUNOVIDON *pommade*	PVP-iode	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2], [6]
COLD CREAM KA	cire blanche + huile arachide + huile ricin + palmitate d'ascorbyle + laurylsulfate de sodium + vit.E + éthanol + eau	N	ouvert	1 mois	frigo	-	[15]
DALACIN V 2% *crème avec applicateurs individuels*	clindamycine	O	ouvert	1 an	T° ambiante	Jeter applicateur après utilisation	[2], [6]
EMLA *crème*	lidocaïne, prilocaïne	N	ouvert	1 semaine	T° ambiante	-	[18]
EXCIPIAL *pommade / crème*	lipides	N / O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
EXCIPIAL U lipolotion	lipids + urée	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
FASTUM	kétoprofène	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
FENISTIL *gel*	maléate de dimétindène	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
FLAMMAZINE	sulfadiazine d'argent	O	ouvert	2 semaines	T° ambiante	Jeter si changement de couleur (si rose, noir ou argenté)	[1]
FORTALIS	ac. formique + ac. salicyl. + camphre + salicylate de méthyle + ol. Spicea	N	ouvert	1 an	T° ambiante	Conserver dans l'emballage original à l'abri de la lumière et de l'humidité	[2]
IALUGEN	acide hyaluronique	O	tube ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
		O	eo 500 g ouvert	6 mois	T° ambiante		[1]
IALUGEN PLUS	acide hyaluronique + sulfadiazine d'argent	N	ouvert	1 an	T° ambiante	Abri de la lumière	[2]
LYMAN *crème / gel / emgel*	héparine + allantoïne + dexpanthenol	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
OLFEN *gel*	diclofénac	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
PANTOTHEN *pommade*	dexpanthénol	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
SPORTUSAL *gel / emgel*	salicylate d'hydroxyéthyle + héparine + DMSO + polidocanol + dexpanthénol	N	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
UNGUENTOLAN	huile foie de morue + rétinol	O	ouvert	1 an	T° ambiante	-	[2]
VITA MERFEN	palmitate Vit. A + chlorhexidine + chlorure benzoxonium	N	ouvert	1 an		-	[2]
Préparations à usage nasal							
BACTROBAN nasal	mupirocine	N	ouvert	jusqu'à fin arrêt du ttt max. 1 mois	T° ambiante	-	[1], [2]
IMIGRAN *spray nasal*	sumatriptan	N	Non ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
			ouvert	Utilisation immédiate	-	dose unitaire	
DROSSA-NOSE	Sel marin	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[2]
NASIVINE Pur *spray nasal*	oxymétazoline	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1, 6]
NASIVINE Pur *diffuseur*	oxymétazoline	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1, 6]
NOCUTIL *spray nasal*	desmopressine	O	ouvert	2 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1]
VIBROCIL *spray / gttes*	dimétindène maléate + phényléphrine	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [2]
RUEDI ONGUENT NASAL	essence menthe + huile camphrée	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[2]

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
Préparations à usage auriculaire							
CERUMENOL	Dicaprylocaprate de propylèneglycol, butoxyl, h.e. de térébenthine, chlorocrésol	N	ouvert	6 mois	T° ambiante	-	[2]
CIPROXINE HC	ciprofloxacine + hydrocortisone	O	ouvert	14 jours	T° ambiante	**Pas de frigo**, Abri de la lumière	[1]
Autres formes / usages							
ALGOPEDOL 24% *monodoses*	sucrose, eau ppi	N	monodose	Utilisation immédiate	T° ambiante	-	[5]
AMSURE	eau stérile pour inhalation	N	ouvert	- 30 jours - 1 sem. si nouveau-né prématuré	T° ambiante		[23]
AQUAPAK	eau stérile pour inhalation	N	ouvert	- 30 jours - 1 sem. si nouveau-né prématuré	T° ambiante		[23]
ATROVENT *monodoses*	ipratropium	N	**sachet** ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [5]
			monodose	Utilisation immédiate	-		
EAU DE LAVANDE	huile ess. lavande, éthanol 96%	N	ouvert	3 mois	T° ambiante	-	[6], [18]
EOSINE Gilbert 2% *sol. aqueuse monodose*	éosine		ouvert	48 h	T° ambiante	-	[16]
ETHER	éther		ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[2]
IPRAMOL	salbutamol + ipratropium	N	**sachet** ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [5], [6]
			monodose	Utilisation immédiate	-	Vérifier si pas de coloration	
ISOKET *spray*	dinitrate d'isosorbide	O	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	-	[1]
KAMILLOSAN *liquide*	extrait alcoolique de camomille	O	ouvert	12 mois	T° ambiante	A utiliser dilué	[1]
MUCILAR *poudre*	psyllium	N	ouvert	6 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité	[6]
NEURODOL *patch*	lidocaïne	O	sachet ouvert	3 mois	T° ambiante	Conserver dans l'emballage	[5]
OLFEN *patch*	diclofenac	O	sachet ouvert	3 mois	T° ambiante	**Pas de frigo**	[1]
PEVARYL *poudre*	econazole	N	ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	Abri de l'humidité	[1,6]
PRONTO DRY *test*	*test diagnostique H. pylori*	-	non ouvert / ouvert	Date d'expiration	T° ambiante	**Pas de frigo**	[5]
PULMICORT *respules*	budésonide	N	**sachet** ouvert	3 mois	T° ambiante	Abri de la lumière	[1], [6]
			monodose	Utilisation immédiate	T° ambiante	-	

NOM	COMPOSITION	Cons.*	DUREE ET MODALITE DE CONSERVATION				Réf.
			Etat	Durée §	Température	Particularités	
PULMOZYME *amp.*	dornase alfa	N	**sachet** ouvert	Date d'expiration	Frigo	Sachet bien fermé, abri de la lumière	[1]
			monodose	Utilisation immédiate	-	-	
RESONIUM A *poudre*	sulfonate de polystyrène	N	ouvert	3 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité	[22]
VENTOLIN *sol. conc. inhalation*	salbutamol	O	ouvert	1 mois	T° ambiante	-	[1]

* Cons. = conservateur, O = oui, N = non

§ Durée proposée sauf si la date d'échéance indiquée sur l'emballage intervient avant

Surligné en jaune : dernières mises à jour faites le 06.01.2025 /TCR

STOCKAGE

Les médicaments sont à conserver à la température **recommandée par le fabricant !** [1]

Pour rappel, les températures de conservation sont de + 15 à + 25°C pour la température ambiante et de + 2 à + 8°C pour le réfrigérateur. Si un médicament est à conserver au réfrigérateur, il ne devra jamais être stocké dans le bac à légumes ni dans la porte du frigo, car la température y dépasse les 8°C.

Un médicament à conserver à température ambiante ne doit pas être placé au réfrigérateur en raison du risque d'altération du produit. C'est également le cas si un médicament devant être conservé à 2- 8°C est gardé par mégarde à T° ambiante.

➔ Appeler la PIC si le médicament a été stocké dans de mauvaises conditions **021 804 2146**

Les préparations fabriquées par la PIC sont à conserver selon les recommandations mentionnées sur l'étiquette. Si la durée et la modalité de conservation sont modifiées après ouverture, cela est également indiqué sur l'étiquette.

ETIQUETTES

Afin de vous aider dans la gestion des dates de validité de vos stocks, la PIC met à votre disposition des étiquettes destinées à être apposées sur les médicaments entamés. Vous pouvez les commander à la PIC au **021 804 2141** (n° article 7797)

Ouvert le : ……

Ne pas utiliser après le : ……

Références

[1] www. swissmedicinfo.ch, 2016, 12.4.23, 25.5.23. 25.11.24
[2] Conservation des médicaments après ouverture, Pharmacie Interjurassienne, version 2012-2014
[3] « Conservation des prép. liquides orales »; pharmacie du CHUV ; version 5.0, juin 2009.
[4] https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/conservation_liquides_oraux.pdf
[5] Fabricant
[6] Décision de la Pharmacie interhospitalière de la Côte
[7] https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/pha/pha_phatab_desinfectants.pdf.
[8] http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_prep_ped_soindebouchev2.pdf
[9] http://smorintranet:8080/jahia/webdav/site/myjahiasite/groups/editeurs_PIC/public/Informations/InfoM%C3%A9tabolisme/ Insulines_Conservation.pdf
[10] http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/stabilite_desinfectants.pdf , remplacé par réf [11]
[11] https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/tab_antiseptiques.pdf
[12] Durée de conservation des solutions orales une fois entamées ; pharmacie des Hôpitaux de l'Est lémanique ; v 3.8, 2012
[13] https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf
[14] Protocole EHC Uvesterol ADEC, v1-12.2013
[15] Préparations magistrales dermatologiques en Suisse, C. Deplazes et al, éd. 3ème, 2010, www. preparations-magistrales.ch
[16] https://pharmavista.ch, consulté le 17.4.23
[17] Questionnaire GSASA Pradaxa www.gsasa.ch, consulté le 27.5.2014

[18] Délais d'utilisation des préparations de récepture, Manuel du pharmacien 2006
[19] tableau matériel pansements élaboré par Groupe de travail Plaies/GRESI, HUG, 2012
[20] RefMed/NINJA, consulté le 29.7.20, 17.4.23
[21] http://www.omedit-centre.fr/
[22] Choix PIC, donnée extrapolée de l'information officielle de Sorbisterit®, www. swissmedicinfo.ch consulté le 12.4.23
[23] Analyse de risque sur l'usage multi-patients de l'eau stérile pour inhalation, séance médicale du 28.3.2023, Direction Générale de la Santé (VD)
[24] Information du fabricant de Miclorbic® alc. 2%, https://neochemical.es/
[25] Mode d'emploi d'Apiretal®, fabriqué par Laboratorios Ern SA, Espagne
[26] Monographie 'Méthadone HCl sol. buvable 10 mg/mL', Pharmacopée helvétique, éd. 12 + choix PIC du 23.1.24, harmonisation avec Méthadone Bichsel 10 mg/mL sol. buvable

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 2024