

ENANIVE (dexpanthenol = vit. B5)

« Stimulant motilité intestinale »

Présentation	Ampoule 500 mg / 2 mL → 250 mg/mL	
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques	Particularités
SC/ IVD/ IM : <u>Administration</u> : Sans dilution. ¹	pH : 5,1 – 6,5	Osmolarité/ osmolalité : hypertonique
	Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -	ATTENTION : - Remplace le Bepanthen® ampoule - La solution est incolore. - Le contenu des ampoules peut être ajouté aux liquides de perfusion (NaCl 0,9%, G5%, Ringer-lactate etc...)
	Mode de conservation : Température ambiante (15-25 °C) ²	
	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate ¹ <u>Sol. diluée</u> : 8h à T amb. ¹	Principaux risques / EI : Lésions cutanées allergiques, ² œdème de Quincke, bronchospasme, ⁴ diarrhée
PI : <u>Dilution</u> : dose prescrite + 100 mL de NaCl 0,9% ¹ <u>Administration</u> : par gravité par voie périphérique ou centrale <u>Durée</u> : 15 min. ¹	Surveillance : Signes de réaction allergique	
	Etiquette emballage : -	Principales incompatibilités (mélange + Y) :