

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Formulaire à usage interne envoyer par e-mail à la pharmacie de l'hôpital : E-MAIL	Valable à partir du 31.10.2022 Créé : OFSP Page : 1 de 1
Ordonnance de nirmatrelvir [PF-07321332] / ritonavir (Paxlovid®)		

Ou l'étiquette du patient

Nom / prénom du patient
 Numéro de référence du patient
 Année de naissance et sexe du patient
 Nom / prénom du médecin
 Nom de l'hôpital

Conditions de traitement selon les [critères SSI](#) (cocher ce qui convient):

- Le patient a contracté le SARS-CoV-2, confirmé par un test COVID positif et présente des symptômes qui ne datent généralement pas de plus de 5 jours, et fait partie du groupe des personnes à risque d'évolution sévère de COVID-19 selon les [critères de la SSI](#).

Les critères supplémentaires suivants doivent être remplis :

- Âge du patient : au moins 12 ans¹ et au moins 40 kg
- Le contrôle des interactions a été effectué (voir [COVID-19 Drug Interactions Checker](#) et [Interactions with selected outpatient medicines and Paxlovid®](#))
- Aucune contre-indication pour Paxlovid (voir information professionnelle sur [swissmedicinfo.ch](#))
- Patient répond aux [critères de la SSI](#)
- Le patient a été informé de la thérapie et a consenti à cette thérapie.

Date et heure de la thérapie : **Service :**

- Rp. 300 mg nirmatrelvir (deux comprimés de 150 mg) et 100 mg ritonavir (un comprimé de 100 mg) à prendre en même temps toutes les 12 heures pendant 5 jours².**
- Autre posologie (par exemple en cas d'insuffisance rénale) :**

.....

Le Paxlovid peut être pris avec ou sans repas. Les comprimés doivent être avalés entiers et ne doivent pas être mâchés, cassés ou écrasés, car aucune donnée n'est actuellement disponible.

Date :

Nom, prénom du médecin / tampon :

Signature :

L'utilisation et le classement de ce formulaire sont facultatifs, à condition que la prescription et le respect des [critères de la SSI](#) soient documentés et démontrables d'une autre manière.

¹ La sécurité et l'efficacité chez les patients pédiatriques de moins de 18 ans n'ont pas été établies à ce jour pour nirmatrelvir [PF-07321332] / ritonavir (Paxlovid). Aucune donnée n'est disponible.
² D'autres indications de dosage s'appliquent à des groupes de patients particuliers, voir les recommandations d'utilisation ou la liste des critères de la SSI.