


<b>Date :</b>  Coller ici étiquette patient	<b>PROTOCOLE D'ADMINISTRATION DU PAXLOVID®</b>												
<b>Présentation du produit</b>	principe actif (p.a):	nirmatrelvir + ritonavir											
	excipients :	Lactose, cellulose, carmellose, sodium, silice colloïdale, natrii stearylis fumaras, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol, oxyde de fer, copovidone, sorbitani laureas, calcium hydrogenophosphate anhydre, hydroxypropylcellulose, talc, polysorbate 80											
	conditionnement :	Boîte de 30 cp 											
<b>Indications et dosages</b>	<b>Traitement précoce préventif de l'infection CoVID-19 chez les patients remplissant les critères d'éligibilité selon les recommandations de la Société suisse d'infectiologie (SSI).</b> <a href="https://pharmpic.ch/Actualites/COVID-19.html">https://pharmpic.ch/Actualites/COVID-19.html</a>												
	Dosage en fonction de la fonction rénale du patient: Date : ..... DFG = ..... mL/min												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DFG (mL/min)</th> <th style="width: 55%;">Dose et posologie</th> <th style="width: 30%;">Etiquette à coller</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">&gt;60</td> <td>2 cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour</td> <td>           Posologie usuelle :            PATIENT : .....  <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b>  <i>Posologie usuelle :</i> prendre 2 comprimés de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour.         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30-60</td> <td>1 <b>seul</b> cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour</td> <td>           Posologie réduite            PATIENT : .....  <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b>  <i>Posologie réduite (insuffisance rénale):</i> Prendre 1 <b>seul</b> comprimé de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;30</td> <td>Contre-indiqué</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaler les comprimés en entier (ne pas couper ni écraser), indépendamment des repas</li> <li>- Durée de traitement : 5 j</li> <li>- 1 boîte de 30 cp suffit pour 1 patient</li> </ul>		DFG (mL/min)	Dose et posologie	Etiquette à coller	>60	2 cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour	Posologie usuelle : PATIENT : ..... <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b> <i>Posologie usuelle :</i> prendre 2 comprimés de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour.	30-60	1 <b>seul</b> cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour	Posologie réduite PATIENT : ..... <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b> <i>Posologie réduite (insuffisance rénale):</i> Prendre 1 <b>seul</b> comprimé de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour	<30	Contre-indiqué
DFG (mL/min)	Dose et posologie	Etiquette à coller											
>60	2 cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour	Posologie usuelle : PATIENT : ..... <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b> <i>Posologie usuelle :</i> prendre 2 comprimés de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour.											
30-60	1 <b>seul</b> cp de 150 mg + 1 cp de 100 mg, en 1 prise, 2 fois par jour	Posologie réduite PATIENT : ..... <b>PAXLOVID (150 mg + 100 mg)</b> <i>Posologie réduite (insuffisance rénale):</i> Prendre 1 <b>seul</b> comprimé de 150 mg et 1 comprimé de 100 mg en même temps 2 fois par jour											
<30	Contre-indiqué												
<b>Mise en garde / Précautions / CI</b>	<b>A vérifier avant de délivrer le médicament :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dose</li> <li>- Fonction rénale</li> <li>- La pharmacie aura vérifié avec le médecin prescripteur les potentiellement nombreuses interactions médicamenteuses            (<a href="https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/ritonavir-boosted-nirmatrelvir--paxlovid-/paxlovid-drug-drug-interactions/">https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/ritonavir-boosted-nirmatrelvir--paxlovid-/paxlovid-drug-drug-interactions/</a>)         </li> </ul>												

<b>Matériel nécessaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emballage de Paxlovid®</li> <li>- Etiquette posologie (usuelle ou réduite) à coller sur la boîte de médicament par l'infirmière.</li> </ul>									
<b>Administration</b>	<p>Administration par <b>voie per os</b></p> <p>Donner au patient 1 ou 2 comprimés de 150 mg (selon dose prescrite) et 1 comprimé de 100 mg en une seule prise, avec un verre d'eau.</p> <p>Après avoir vérifié la posologie prescrite, renseigner le nom du patient sur l'étiquette adéquate et coller l'étiquette sur la boîte.</p> <p>Le patient repartira avec la boîte à domicile.</p>									
<b>Effets indésirables</b>	<p><i>Tableau 2: Effets indésirables de Paxlovid</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe de systèmes d'organes</th> <th>Fréquence</th> <th>Effets indésirables</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affections du système nerveux</td> <td>Fréquents</td> <td>Dysgueusie, céphalées</td> </tr> <tr> <td>Affections gastro-intestinales</td> <td>Fréquents</td> <td>Diarrhée, vomissements</td> </tr> </tbody> </table>	Classe de systèmes d'organes	Fréquence	Effets indésirables	Affections du système nerveux	Fréquents	Dysgueusie, céphalées	Affections gastro-intestinales	Fréquents	Diarrhée, vomissements
Classe de systèmes d'organes	Fréquence	Effets indésirables								
Affections du système nerveux	Fréquents	Dysgueusie, céphalées								
Affections gastro-intestinales	Fréquents	Diarrhée, vomissements								
<b>Surveillance</b>	<p>Chez les patients poly-allergiques, surveillance des paramètres vitaux aux 15 min jusqu'à 1h après la prise des 3 premiers comprimés.</p> <p style="text-align: center;"><b>Si réaction allergique / anaphylactique : tél 144</b></p>									
<b>Infos à donner au patient</b>	<p>➤ En cas de question, appeler :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hôpital</th> <th>Durant les heures ouvrables</th> <th>En dehors des heures ouvrables</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GHOL</td> <td>Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44</td> <td>médecin de garde : 022 994 61 61</td> </tr> <tr> <td>EHC</td> <td>Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13</td> <td>Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ Si le patient oublie une dose de Paxlovid® et s'en rend compte dans les 8 heures suivant l'heure à laquelle elle est habituellement prise, il doit la prendre dès que possible puis reprendre le schéma posologique normal.</p> <p>Si le patient oublie une dose et que cet oubli remonte à plus de 8 heures, il ne doit pas prendre la dose oubliée et doit prendre la dose suivante à l'heure prévue. Le patient ne doit pas doubler la dose pour compenser une dose oubliée.</p> <p>➤ Ne prendre <b>aucun</b> autre médicament que les médicaments habituels, dont le dosage peut avoir été modifié pour la durée du traitement de Paxlovid™, sans avis médical.</p> <p>➤ Tout effet secondaire observé consécutivement à la prise du Paxlovid® doit être immédiatement annoncé au médecin traitant.</p>	Hôpital	Durant les heures ouvrables	En dehors des heures ouvrables	GHOL	Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44	médecin de garde : 022 994 61 61	EHC	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13
Hôpital	Durant les heures ouvrables	En dehors des heures ouvrables								
GHOL	Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44	médecin de garde : 022 994 61 61								
EHC	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13								

**Références :**

[1] Informations du fabricant Pfizer, février 2022