

INFO ALERTE

Morges, le 15 janvier 2024

ADMINISTRATION CORRECTE DU PAXLOVID®

Le médicament Paxlovid® est la **combinaison** de :

- 1) **nirmatrelvir**, principe actif **efficace** contre le SARS-CoV-2 (= 2 cpr de 150mg)
- 2) **ritonavir**, principe actif* utilisé ici uniquement pour **renforcer** l'effet du nirmatrelvir (= 1 cpr 100mg)

*ritonavir seul n'a pas d'activité contre SARS-CoV_2



dose du matin

dose du soir



Plusieurs boîtes ont été retournées à la Pharmacie avec des blisters où seul le ritonavir a été prélevé et administré aux patients !

Conséquence: traitement inefficace !

face arrière
de la plaquette



face avant
de la plaquette



Manipuler la plaquette du **côté avant** pour bien visualiser les comprimés à donner avant de les extraire


Exemples de schémas d'administration par jour



A RETENIR

A chaque prise le patient doit prendre en même temps:

- **LE** comprimé de ritonavir
- **1 (ou 2)** comprimé(s) de nirmatrelvir
- **1 à 2 fois** par jour



Le médecin prescrit la posologie journalière selon la fonction rénale du patient.



Le traitement dure 5 jours et la posologie peut varier (Jour 1 \neq Jour 2 à Jour 5) en cas d'insuffisance rénale.

Posologies détaillées :

⇒ [Protocole d'administration du Paxlovid®](#)

Durée de traitement

5 j → 1 boîte de 30 cpr est **destinée à 1 patient** et suffit pour les 5 jours de traitement

Informations détaillées

⇒ [Protocole d'administration du Paxlovid®](#) sur pharmpic.ch

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Dr Anne Florence Rasca
Pharmacien

Dr Corinne Challet
Pharmacien- chef adjoint