

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Formulaire à usage interne envoyer par e-mail à la pharmacie de l'hôpital : E-MAIL	Numéro : F0_002 Valable à partir du 25.03.2022 Créé : OFSP Page : 1de 1
Ordonnance de Veklury® (remdesivir) ambulatoire - nosocomial - découverte fortuite		

Ou l'étiquette du patient

Nom / prénom du patient
 Numéro de référence du patient
 Année de naissance et sexe du patient
 Nom / prénom du médecin
 Nom de l'hôpital

Conditions de traitement selon les [critères de la CCG/SSI](#) (cocher ce qui convient):

- Le patient a contracté le SARS-CoV-2, confirmé par un test COVID positif et présente des symptômes qui ne datent généralement pas de plus de 5 jours, et fait partie du groupe des personnes à risque selon les [critères de la CCG /SSI](#).
- Consultation ambulatoire OU
- Infection nosocomiale ou découverte fortuite

Les critères supplémentaires suivants doivent être remplis :

- Âge du patient : au moins 12 ans et au moins 40 kg
- Aucune contre-indication pour Veklury® (recommandation d'utilisation pour les professionnels de santé en anglais sous www.swissmedicinfo.ch)
- Patient
 - répond aux [critères de la CCG /SSI](#) OU
 - ne** répond **pas** ou **pas exactement** aux critères CCG /SSI, mais la thérapie a été approuvée par l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital.
- Le patient a été informé de la thérapie et a consenti à cette thérapie¹.

Date et heure de la thérapie : **Service :**

Rp. 200 mg remdesivir (jour 1)¹ dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%
100 mg remdesivir (jour 2)¹ dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%
100 mg remdesivir (jour 3)² dans 100 ml NaCl 0.9% ou dans 250 ml NaCl 0.9%

Chaque flacon de Veklury® doit être reconstitué **avec de l'eau stérile (19 ml par flacon)**, puis administré en perfusion intraveineuse pendant 30 à 120 minutes après dilution dans du NaCl 0,9%. Il convient de suivre les instructions de préparation de la perfusion (Preparation of Veklury solution for infusion) selon les recommandations d'utilisation pour professionnels de santé (en anglais sur swissmedicinfo.ch). Les patients doivent être surveillés conformément aux pratiques médicales en vigueur.

Date :

Nom, prénom du médecin / tampon :

Signature :

- Cette ordonnance doit être conservée dans la pharmacie de l'hôpital et envoyée sur demande anonymisée à l'OFSP (HMR_COVID@bag.admin.ch).

¹ Cette application n'est pas incluse dans l'information destinée aux professionnels de santé de Veklury® (remdesivir). La décision de cette utilisation off-label doit donc être prise par l'équipe multidisciplinaire responsable.