

Aux unités de soins des hôpitaux
desservis par la PIC

Morges, le mercredi 24 juillet 2024

**Objet : Remplacement temporaire de FLUORESCÉINE 0, 5% SDU Faure collyre 0,4 mL par
MINIMS LIDOCAÏNE 4% + FLUORESCÉINE 0,25% collyre 0,5 mL**

Madame, Monsieur,

Les monodoses de FLUORESCÉINE 0,5% SDU Faure collyre 0,4 mL ne sont plus disponibles chez
notre fournisseur. Nous vous proposons de les remplacer dès ce jour par celles de MINIMS
LIDOCAÏNE 4% & FLUORESCÉINE 0,25% 0,5 mL importées du Royaume Uni.

NON DISPONIBLE

FLUORESCÉINE 0, 5% SDU Faure
collyre 0,4 mL



Fluorescéine 0,5% SDU Faure
Fluoresceinum natrium 2 mg/0,4 ml
Collyre

Tenir hors de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante (15-25°C) et à l'abri
de la lumière.
Voir notice d'emballage.
Ne pas avaler.
Ne pas conserver le restant de la monodose ouverte.
Après ouverture du blister, l'utilisation des monodoses
d'un sachet ouvert ne doit pas dépasser un mois.
Titulaire de l'autorisation : Curatis AG, 4110 Lenzburg

4 x 5 monodoses
de 0,4 ml

Curatis AG

N° art.: 9900 Pharmacode :1870482 Stat.: 1

API : Fluorescéine sodique
Excipient(s) : sodium chlorure, sodium hydroxyde, aqua ad
collyr.



NOUVEAU

MINIMS LIDOCAÏNE 4% +
FLUORESCÉINE 0,25% collyre 0,5 mL



Bausch & Lomb
Minims®
Lidocaine hydrochloride 4% w/v
and Fluorescein sodium 0.25% w/v
Eye Drops, Solution

20 Single-dose containers
Preservative-free

N° art.: 14554 Pharmacode :N/A Stat.: 1

API : Fluorescéine sodique, lidocaïne
Excipient(s) : povidone, HCl, eau purifiée

ATTENTION: L'article de remplacement a une teneur deux fois plus faible en fluorescéine et
contient 4% de lidocaïne.

MINIMS LIDOCAÏNE 4% & FLUORESCÉINE 0,25% se conserve à température ambiante (<25°C).

En restant à disposition pour toute question complémentaire, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos cordiales salutations.

Manuel Masconi
Pharmacien responsable distribution

Source images : HCl, PIC