




Morges, le 13 novembre 2024

SCHERIPROCT® suppositoires et onguent remplacés par DOXIPROCT Plus® onguent

Madame, Monsieur,

Les deux spécialités de SCHERIPROCT® suppositoires et onguent sont actuellement indisponibles. Nous vous proposons de les remplacer transitoirement par DOXIPROCT Plus® onguent dont les caractéristiques sont les suivantes.

Médicaments non disponibles	Médicament de remplacement
<p>SCHERIPROCT® (Prednisolone hexanoate, Cinchocaïne chlorhydrate)</p> <p>Onguent</p>  <p>Excipients : bergamottae aetheroleum, vanillinum et alia ; excipients ad unguentum.</p> <p>n° art. PIC : 8340 Pharmacode : 660363</p>	<p>DOXIPROCT Plus® (Dobésilate de calcium, Lidocaïne chlorhydrate, Dexaméthasone acétate)</p> <p>Onguent</p>  <p>Excipients : polysorbate 80, gallate de propyle (E310), butylhydroxyanisole (E320), acide citrique (E330), alcool cétyle, macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, propylène glycol</p>
<p>SCHERIPROCT® (Prednisolone hexanoate, Cinchocaïne chlorhydrate)</p> <p>Suppositoires</p>  <p>Excipients : excipients pro suppositorio.</p> <p>n° art. PIC : 6374 Pharmacode : 425219</p>	<p>n° art. PIC : 4591 Pharmacode : 679575</p>

Les principes actifs sont différents. Le Scheriproct® contient un corticostéroïde topique et un anesthésique local, idem pour le Doxiproct Plus® qui contient en plus un principe actif permettant de corriger les dysfonctions capillaires locales.

Le Doxiproct Plus® peut s'utiliser en cas d'hémorroïdes internes et externes, de prurit, d'eczéma ou de fissure anale ou encore, en cas de thrombose hémorroïdaire aiguë.

En l'absence de suppositoires disponibles, il convient d'utiliser la canule fournie avec la spécialité pour permettre une application interne.

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Titouan Cretignier
Pharmacien

Source images : <https://pharmavista.ch>