

Si le médicament d'un patient ne figure pas dans la Liste des médicaments de la Pharmacie Interhospitalière de la Côte (PIC), le médecin évaluera s'il peut le remplacer par un équivalent de la Liste. Pour cette substitution, des propositions sont présentées dans le tableau ci-après.

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
ACCURETIC 20/12.5 (20mg quinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINAPRIL 10/12.5 (10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
ACCUPRO 20 (20 mg quinapril)	LISINAPRIL 10 (10mg lisinopril)	
ACIMETHIN (méthionine)		Commander
ACTONEL (35 mg risédronate)	ALENDRON (70mg alendronate)	Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation. Si un biphosphonate est introduit à l'hôpital pour l'enseignement d'une prise adéquate, proposer Alendron Mepha (alendronate) qui est dans la liste des médicaments.
ACTOS (pioglitazone)		Commander Glitazone non conseillée en cas d'insuffisance cardiaque, de maladie cardiaque ischémique ou d'artériopathie périphérique
ACULAR (0.5% ketorolac)		équivalent possible Voltaren 0.1% selon l'indication -> appeler pharmacien
AERIUS (5mg desloratadine)	CETIRIZINE (10mg cétirizine)	
AGIOLAX MITE (psyllium)	MUCILAR (psyllium)	
AGOPTON (15mg lansoprazole) (30mg lansoprazole)	PANTOZOL (20mg pantoprazole) (40 mg pantoprazole)	
AMARYL (glimepiride)	GLIMEPIRIDE ZENTIVA (glimepiride)	Générique
ANDREAFOL (0.4mg ac. folique)	ACIDE FOLIQUE Streuli (5mg acide folique)	
ANORO ELLIPTA (uméclicidium + vilantérol)		Commander
ANTRA (20 mg omeprazole)	PANTOPRAZOL (20 à 40 mg pantoprazole)	Dose à définir selon l'indication
ARIMIDEX (1 mg anastrozole)	ANASTRAZOLE (1 mg anastrozole)	
ARIXTRA (1.5 / 5 / 7.5 / 10mg fondaparinux)	CLEXANE (enoxaparine)	Dose de Clexane à définir en fonction de l'indication
ARIXTRA (2.5mg fondaparinux)		Commander pour indication SCA (NSTEMI ou STEMI ou angor) uniquement
AROMASIN (25 mg exemestane)	EXEMESTAN (25 mg exemestane)	
ASACOL (mésalazine)		commander
ASSAN crème	SPORTUSAL ou FORTALIS	
ATACAND (8 ou 16mg candésartan cilexétel) (32 mg candésartan cilexétel)	IRBESARTAN (150 mg irbesartan) (300 mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
ATACAND plus 8/12,5 (8mg candésartan cilexétel + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
ATEDUREX (100mg atenolol + 25mg chlortalidone)		Commander
ATENOLOL 50 ou ATENIL MITE (50mg aténolol)		Commander
AULIN (nimésulide)		Choisir un anti-inflammatoire non stéroïdien de la liste NB: risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation en 10.2011 par Swissmedic - traitement de 2ème intention - indiqué pour douleurs aiguës et dysménorrhées primaires pour une courte durée (max 15j) - indication 'arthrose localisée (genou, hanche)' retirée!
AVODART (dutastéride)		Commander
AZAREK (50mg azathioprine)	IMUREK (50mg azathioprine)	Médicament hors-liste en stock: Ordonnance HL svp
AZILECT (1mg rasagiline)		commander
AZOPT 1% (2-3x) brinzolamide)		Commander
BAYPRESS (20mg nitrendipine)	AMLODIPINE 10mg amlodipine)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire
BETMIGA (mirabégron)		Commander
BETOPTIC S gttes (betaxolol)		Commander
BLOPRESS (8 ou 16mg candésartan cilexétel)	IRBESARTAN (150 mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
BLOPRESS PLUS (8 mg candésartan cilexétel + 12,5 mg Hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150 mg irbesartan + 12,5 mg Hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
BRIVEX (125 mg brivudine)		Commander
CADUET 5/10 (5mg amlodipine + 10mg atorvastatine)	AMLODIPINE 5 (5mg amlodipine) + 1/2 cpr SORTIS 40 (20mg atorvastatine)	Sortis 10mg n'est pas tenu en stock à la PIC. Mais OK pour donner 20mg pendant quelques jours à l'hôpital.
CALCIUM CARBONATE (500mg carbonate de calcium)	CALCIUM ACETATE (400mg ou 500mg acetate de calcium) ou CALCIUM CARBONATE SALMON (500mg de carbonate de calcium) ou CALCIUM SANDOZ F ou FF (500 ou 1000mg carbonate, lactate + gluconate de calcium)	Evaluer l'indication et choisir Calcium Acétate/carbonate ou Calcium Sandoz F/FF Besoin d'une ordonnance HL pour Calcium carbonate Salmon

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
CALCORT (6mg déflazacort)	PREDNISONE (5mg prednisone)	cf tableau d'équivalence liste des médicaments, Ed. déc 2012, p.47
CALPEROS D3 (500mg calcium + 400 UI vit. D3)	CALCIUM SANDOZ D3 500/440 ou CALCIMAGON D3 (500mg calcium + 400 UI vit. D3)	
CAPTOSOL (25 mg captopril) (50 mg captopril) (100 mg captopril)	LISINAPRIL (10 mg lisinapril) (20 mg lisinapril) (40 mg lisinapril)	
CARDURA CR (doxazosine)		Commander
CASODEX (50 mg bicalutamide)	BICALUTAMIDE (50 mg bicalutamide)	
CEDUR RETARD (400mg bézafibrate)		Les fibrates ne sont pas une classe homogène comme les statines. Ils sont moins efficaces, sauf lors d'hypertriglycéridémie. Un dosage du CT, LDL, TG permettrait de déterminer si le fibrate représente un bon choix thérapeutique. ⇒ arrêter le traitement pendant quelques jours ou éventuellement le commander
CELEBREX (celecocixib)		Choisir un anti-inflammatoire non stéroïdien de la liste (+/- gastroprotecteur)
CELLCEPT (mycophénolate mofétil)		Commander Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur !
CIBACEN (5mg bénazépril) (10mg bénazépril) (20mg bénazépril)	LISINAPRIL (5mg lisinapril) (10mg lisinapril) (20mg lisinapril)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
CHOLIB (fenofibrate 145 mg simvastatine 20mg)	LIPANTHYL 200 mg + SIMCORA 20 mg	Commander mais en cas de rupture de stock, substituer par Lipanthyl 200 et Simcora (cela fait 55mg de fenofibrate en plus).
CIBADREX (20mg bénazépril + 25mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINAPRIL 20/12.5 (20mg lisinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
CIMIFEMINE (extrait de cimicifuga)		Peut être stoppé pendant séjour hospitalier
CIPRALEX (10mg escitalopram)	ESCITALOPRAM (10 mg escitalopram)	
CLARITINE (10 mg loratédine)	CETIRIZINE (10 mg cétirizine)	
CLOPIN (clozapine)	LEPONEX (clozapine)	
CO-IRBESARTAN 300/12.5 (300mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN (150mg irbesartan)	
CO-IRBESARTAN 300/25 (300mg irbesartan + 25mg hydrochlorothiazide)	2 cpr CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
CODICONTIN (dihydrocodéine)		A remplacer par un autre antalgique de la liste
CO-DIOVAN 80/12.5 (80mg valsartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
CO-DIOVAN FORTE 160/12.5 (160mg valsartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
CO-DIOVAN FORTE 160/25 (160mg valsartan + 25mg hydrochlorothiazide)	2 cpr CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
CO-ENATEC ou CO-EPRIL (20mg enalapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINAPRIL 20/12.5 (20mg lisinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
COMPETACTION (15mg pioglitazone + 850mg metformine)	METFORMIN (850mg metformine) + ACTOS (15mg pioglitazone)	Commander si pas d'ACTOS en stock
CONCOR (Bisoprolol)	BISOPROLOL (Bisoprolol)	
CONCOR 5 PLUS (5mg bisoprolol + 12.5mg hydrochlorothiazide)	BISOPROLOL (5mg bisoprolol) + 1/2 cpr ESIDREX (12.5mg hydrochlorothiazide)	
CONCOR 10 PLUS (10mg bisoprolol + 25mg hydrochlorothiazide)		Commander
CONDROSULF (chondroïtine sulfate sodique)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
CO-RENITEN (20mg enalapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINAPRIL 20/12.5 (20mg lisinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
COSAAR (50mg losartan)	IRBESARTAN (150 mg irbesartan)	<u>Ne pas substituer</u> Cosaar si patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique. NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
COSAAR PLUS 50/12.5 (50mg losartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	<u>Ne pas substituer</u> Cosaar si patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique. NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
COSAAR PLUS 100/25 (100mg losartan + 25mg hydrochlorothiazide)	2 cpr CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	<u>Ne pas substituer</u> Cosaar si patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique. NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
COTENOLOL MEPHA NEO MITE (50mg aténolol + 12.5mg chlortalidon)		Commander
COVERAM 5/5 MG (5mg perindopril + 5 mg amlodipine)	LISINAPRIL 10 (10 mg lisinapril) + AMLODIPINE 5 (5 mg amlodipine)	
COVERSUM N (5mg péridopril arginine) (ancien. Coversum 4mg perindopril terbutylamine)	LISINAPRIL 10 (10mg lisinapril)	
COVERSUM N COMBI 5 / 1,25 (5 mg perindopril arginine / 1,25 mg indapamide)	CO-LISINAPRIL 10/12.5 (10mg lisinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	Poursuivre perindopril + indapamide si ttt post AVC (selon étude PROGRESS)!
CREON 10'000 UI (150 mg pancréatine)		Commander
CRESTOR (5mg rosuvastatine) (10mg rosuvastatine) (20mg rosuvastatine) (40mg rosuvastatine)	PRAVASTATINE (40mg pravastatine) ATORVASTATINE (40mg atorvastatine) ATORVASTATINE (80mg atorvastatine)	Pravastatine 40mg à préférer si Crestor 5 ou 10mg car minimise le risque d'IA par rapport à l'atorvastatine Attention! Contrôler les interactions si substitution par atorvastatine

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
CUTIVATE CREME (0.05% fluticasone)	BETNOVATE crème (0.1% betaméthasone)	
DAFLON (diosmine + hespéridine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier, sauf si hémorroïdes
DALMADORM /MITE (15mg flurazépam) (30mg flurazépam)	NOCTAMID (1mg lormétazépam) (1mg lormétazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
DAONIL (5 mg glibenclamide)		Commander
DEANXIT (flupentixol + méliétracène)		Evaluer - Eventuellement remplacer par un anxiolytique de la liste
DEMETRIN (10mg prazépam) (20mg prazépam)	ANXIOLIT (15mg oxazépam) (15mg oxazépam + 1cp Anxiolit en réserve)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
DENTOHÉXINE sol (chlorhexidine)		Commander pour le trempage des dentiers lors de mycose de la cavité buccale.
DEROXAT (paroxétine)	PAROXÉTINE (paroxétine)	Paroxétine médicament HL en stock: ordonnance HL svp
DICETEL (pinavérine)	DUSPATALIN (mébévérine)	
DILATREND (carvédilol)	CARVEDILOL (carvédilol)	
DILZEM RR 180 mg 1x/j (diltiazem)	DILZEM Retard 90mg 2x/j (diltiazem)	
DIOVAN (80mg valsartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	
DIOVAN (160mg valsartan)	2 cpr IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
DOXIUM (dobésilate)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
DOXYCYCLINE (doxycycline)	VIBRAMYCINE (100mg doxycycline)	
DUODART (0,5 mg dutastéride + 0,4 mg tamsulosine)		Commander
DUOPLAVIN 50/ 100 (clopidogrel 75 mg + aspirine 100 mg)	PLAVIX (clopidogrel 75 mg) + ASPIRINE CARDIO (AAS 100mg)	
ECOFENAC (diclofénac)	OLFEN (diclofénac)	
EDARBI (40 mg azilsartan)	IRBESARTAN (150 - 300mg irbesartan)	Commencer par 150mg et titrer, éventuellement augmenter à 300mg
EDARBYCLOR (40 mg azilsartan + 25 mg chlorthalidone)	IRBESARTAN (150mg irbesartan) + ESIDREX (25mg hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire ! Si augmenté à 300mg cela correspond à 2 comprimés de Co-Irbesartan 150/12.5mg et arrêt de l'Esidrex
EFEXOR ER (venlafaxine)	VENLAFAXINE ER (venlafaxine)	
EFIENT (5 mg prasugrel) (10mg prasugrel)		Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l'anamnèse !! Non recommandé si ≥75 ans, si poids < 60kg Commander <u>uniquement</u> pour l'indication 'intervention coronarienne'. Dans les autres cas, Plavix suggéré. cf. pharmacien
EFFORTIL (étiléfrine)	GUTRON (midodrine)	L'efficacité de l'étiléfrine n'est pas bien établie. La midodrine semble être efficace dans l'hypotension orthostatique, bien que certaines études récentes ne le confirment pas.
ELOCOM crème (mométasone fluoate 0.1%)	BETNOVATE crème (betaméthasone 0.1%)	
EMSELEX (7.5mg darifenacine 1x/j) (15mg darifenacine 1x/j)	DETRUSITOL SR caps ret (2mg tolterodine 1x/j) (4mg tolterodine 1x/j)	Att! baisser à DETRUSITOL 2mg - en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, ...) - si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)
ENATEC ou EPRIL (10mg énalapril)	LISINAPRIL 10 (10mg lisinopril)	Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril.
EPROTAN MEPHA (600mg eprosartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	
EUTHYROX (lévothyroxine)	ELTROXINE- LF (lévothyroxine)	cpr d'Eltroxine sécable 'LF' = lactose free
EXFORGE 5/80 ou 5/160 (5mg amlodipine + 80 ou 160mg valsartan)	AMLODIPINE (5mg amlodipine) + IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire !
EXFORGE 10/160 (10mg amlodipine + 160mg valsartan)	AMLODIPINE (10mg amlodipine) + IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire !
EVISTA (raloxifène)		Commander
EZETROL (ezetimibe)		Commander
FAKTU suppos Poliresulenum, Cinchocaini hydrochloridum	SULGAN-N suppos chlorhydrate de lidocaïne, camphre, menthol.	
FAKTU pomade Poliresulenum, Cinchocaini hydrochloridum	DOXIPROCT crème Dobésilate de calcium, chlorhydrate de lidocaïne	
FELODIL (5mg félodipine)	AMLODIPINE (5mg amlodipine)	
FEMARA (2.5mg létrozol)	LETROZOLE Teva (2.5mg létrozol)	
FERRO GRADUMET (105mg fer, sulfate)	DUOFER (69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
FERRUM HAUSMANN (100mg fer, fumarate)	DUOFER (69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
FEMANNOSE (D-mannose)		Stopper car pas d'études solides ni sur l'efficacité ni sur l'innocuité de ce traitement enregistré comme dispositif médical.
FLOX EX (100 mg fluvoxamine)	FLOXYFRAL (100 mg fluvoxamine)	Générique. Floxyfral médicament HL en stock: ordonnance HL svp
FOLVITE (1mg ac.folique)	ACIDE FOLIQUE Streuli (5mg ac. folique)	
FOSAMAX (70mg alendronate)	ALENDRON (70mg alendronate)	Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation Si introduit à l'hôpital pour enseignement d'une prise adéquate, prescrire le générique Alendron Mepha qui est en liste.
FOSAVANCE (70mg alendronate + 2800 UI cholecalciferol)	ALENDRON (70mg alendronate)	Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation Attention! Eviter la prescription de Calcimagon D3 et de Fosavance car risque de surdosage de vitD3. Préférer, p.ex., Calcimagon D3 + Alendron Mepha

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
FOSINOPRIL HCT (20mg fosinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10/12.5 (10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
FOSINOPRIL (10mg fosinopril)	LISINOPRIL 5 (5mg lisinopril)	
FRAXIPARINE/ -FORTE (nadroparine)	CLEXANE (enoxaparine)	Dose selon l'indication cf. Liste des médicaments de la PIC, p.44, éd. Juin. 2015
FUROSPIR (50mg spironolactone + 20mg furosémide)	LASILACTONE 50 (50mg spironolactone + 20mg furosémide)	
GALVUMET (50 mg vildagliptine/500 mg metformine) (50 mg vildagliptine/850 mg metformine) (50 mg vildagliptine/1000 mg metformine)	GALVUS 50 mg + METFORMIN 500 ou 850 ou 1000 mg	
GALVUS (50 mg vildagliptine)		Commander
GLUCOBAY (acarbose)		Commander
GLUCOPHAGE (metformin)	METFORMIN Actavis (metformin)	
GLUCOVANCE (500mg metformine + 2.5mg glibenclamide)		Commander
GLUCOVANCE MITE (250mg metformine + 1.25mg glibenclamide)		Commander
GRODUREX (5mg amiloride + 50mg hydrochlorothiazide)	COMILORIDE (5mg amiloride + 50mg hydrochlorothiazide)	Générique
HALCION (0.25mg triazolam)	DORMICUM (7.5mg midazolam) ou ZOLPIDEM (10mg zolpidem)	Important effet amnésiant d'Halcion !
HYDERGIN (co-dergocrine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
HYTRIN BPH (2x 5mg térazosine)	TAMSULOSINE cpr retard (0.4 mg tamsulosine)	
IALUGEN plus crème (hyaluronate de Na 2mg et sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g)	FLAMMAZINE crème (sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g) Exception pour le service des urgences donner IALUGEN plus crème (car fait partie d'un protocole pour brûlures)	
IMOVANE (zopiclone)	ZOPICLONE (zopiclone)	
IMPORTAL (lactitol)	RUDOLAC (lactulose)	
INDAPAMIDE MEPHA (2.5mg indapamide)	FLUDEX SR (1.5mg indapamide)	
INEGY (10mg ezetimibe + 10/20/40/80mg simvastatine)	Ezetrol 10 mg + SIMCORA (20/ 40/ 80 mg simvastatine)	Commander NB: maximum 20mg SIMCORA en période péri-opératoire car augmentation du risque de rhabdomyolyse
INHIBACE MITE (2.5mg cilazapril)	LISINOPRIL 5 (5mg lisinopril)	
INHIBACE PLUS (5mg cilazapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10/12.5 (10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
INSIDON (50mg opipramol)		Commander
IRBESARTAN 300 (300mg irbesartan)	2 cpr IRBESARTAN 150 (150mg irbesartan)	
ISOCOLAN (2 sachets pour 1L)	COLOLYT (1 sachet pour 1L)	
JANUMET (50 mg sitagliptine + 500 mg metformine) (50 mg sitagliptine + 850 mg metformine) (50 mg sitagliptine + 1000 mg metform.)	JANUVIA 50 mg (50 mg sitagliptine) + METFORMIN (500/ 850/ 1000 mg) selon dosage	
JANUVIA 25 (25 mg sitagliptine)	1/2 cpr JANUVIA 50 (25 mg sitagliptine)	
JARDIANCE 10 mg (10 mg empagliflozine)		Commander
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 500mg metformine) (5 mg empagliflozine + 850mg metformine) (5 mg empagliflozine + 1000mg metformine)		Commander
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/500 mg metformine) (2.5 mg linagliptine/850 mg metformine) (2.5 mg linagliptine/1000 mg metformine)		Commander
KARDEGIC 300 (540mg acétylsalicylate de lysine)	ASPIRINE CARDIO 300 (300mg ac. acétylsalicylique)	
KENDURAL (105mg fer + 500mg vit. C)	DUOFER (69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
KINZAL (40mg telmisartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
LACRYCON gel (larmes artificielles avec ac. hyaluronique)	LACRINORM gel (larmes artificielles)	A discuter avec le PHAR
LAMISIL (terbinafine)		Commander
LECICARBON supp. adultes (bicarbonate de Na 500mg et phosphate de Na 680 mg)		En stock HL (délivrer sur ordonnance HL)
LEGALON caps (silymarine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
LESCOL (20-40mg fluvastatine) (80mg fluvastatine)	PRAVASTATINE (20mg pravastatine) --> 1/2 cpr de pravastatine 40mg PRAVASTATINE (40mg pravastatine) ou ATORVASTATINE (10-20mg atorvastatine)	Pravastatine à préférer car minimise le risque d'IA par rapport à l'atorvastatine. NB: 20 mg de pravastatine ne baisse pas le risque cardiovasculaire contrairement à 40mg. Attention! Contrôler les interactions si substitution par atorvastatine
LIBRAX (5mg chlordiazépoxyde + 2.5mg clidinium)	TRANXILIMUM (5-10 mg clorazépate)	
LIMBITROL (12.5mg amitriptyline + 5mg chlordiazépoxyde)		Attention! Contrôler les interactions si substitution par atorvastatine

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
LIPANTHYL (fenofibrate)		Les fibrates ne sont pas une classe homogène comme les statines. Ils sont moins efficaces, sauf lors d'hypertriglycéridémie. Un dosage du CT, LDL, TG permettrait de déterminer si le fibrate représente un bon choix thérapeutique. => arrêter le traitement pendant quelques jours ou éventuellement le commander
LISITRIL (lisinopril)	LISINOPRIL (lisinopril)	Générique
LITHIOFOR (lithium)		Commander Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments -> cf. pharmacien
LIVAZO (1 mg pitavastatine) (2 - 4 mg pitavastatine)	PRAVASTATINE (20mg pravastatine) --> 1/2 cpr de Pravastatine 40mg PRAVASTATINE (40 mg pravastatine)	NB: 20 mg de pravastatine ne baisse pas le risque cardiovasculaire contrairement à 40mg.
LIVIAL (2.5mg tibolone)		Commander
LOCAPRED (désoride)		cf pharmacien
LODINE (etodolac)		Choisir un anti-inflammatoire non stéroïdien de la liste
LODOZ (2.5/5/10mg bisoprolol + 6.25mg hydrochlorothiazide)		Commander
LOFTYL (bulfomedil)		Commander si indiqué pour claudication intermittente ou artériopathie périphérique
LOGIMAX 5/50 (5mg félodipine + 50mg métoprolol)	AMLODIPINE (5mg amlodipine) + BELOC ZOK (50 mg métoprolol)	
LOGROTON RETARD (200mg métoprolol + 25mg chlorthalidone)	BELOC ZOK (200mg métoprolol) + ESIDREX (25mg hydrochlorothiazide)	
LOMIR SRO MITE (2,5 mg isradipine)	AMLODIPINE (5 mg amlodipine)	
LOPRESOR (50mg métoprolol tartrate)	BELOC ZOK (50mg métoprolol succinate)	
LORAMET (1mg lormétazépam)	NOCTAMID (1mg lormétazépam)	
LYRINEL OROS (5mg oxybutinine 1x/j) (10mg oxybutinine 1x/j)	DETRUSITOL SR caps ret (2mg tolterodine 1x/j) (4mg tolterodine 1x/j)	Att! baisser à DETRUSITOL 2mg - en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, ...) - si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)
MAGNESIOCARD 10 (10 mmol magnésium)	MAG 2 FORTE (7.5mmol magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Mag 2 Forte en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MARCOUMAR (phenprocoumone)		Besoin d'une ordonnance HL mais médicament tenu en stock
MAXALT (5 mg rizatriptan) (10 mg rizatriptan)	ALMOGRAN (12,5 mg almotriptan)	
MEDIAVEN (naftazone)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
MEPHANOL (allopurinol)	ALLOPURINOL (allopurinol)	Générique
METAMUCIL (psyllium)	MUCILAR (psyllium)	
METO ZEROK (métoprolol)	BELOC ZOK (métoprolol)	Générique
MEVALOTIN (20mg pravastatine) (40mg pravastatine)	PRAVASTATINE SANDOZ (1/2 cpr 40mg pravastatine) (40mg pravastatine)	
MGS GRANORAL (12mmol magnésium)	MAG 2 FORTE (7.5mmol magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Mag 2 Forte en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MICARDIS 40 (40mg telmisartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
MICARDIS 80 (80mg telmisartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
MICARDIS PLUS (80mg telmisartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
MIDAMOR (5mg amiloride)		Hors commerce. Cf avec pharmacie pour préparation magistrale ou produit français.
MIFLONIDE (0,2 mg budésonide)	PULMICORT (0,25 mg budésonide)	
MINALGINE (500mg métamizole)	NOVALGINE (500mg métamizole)	
MINITRAN TTS (nitroglycérine)	DEPONIT TTS (nitroglycérine)	
MODURETIC (50mg hydrochlorothiazide + 5mg amiloride)	COMILORIDE (50mg hydrochlorothiazide + 5mg amiloride)	
MOGADON (5mg nitrazépam)	ANXIOLIT (15mg oxazépam)	
MUCOFOR (erdostéine)	SOLMUCOL (acétylcystéine)	
MULTAQ (dronédarone)		Commander mais attention aux contre-indications (utilisation restreinte en France - Afssaps oct 2011)
MUXOL (10mg bisacodyl)	2 cpr PRONTOLAX (EN STOCK MAIS PAS EN LISTE) (5mg bisacodyl)	2 cpr de Prontolax = 2 cpr de Dulcolax bisacodyl = 1 cpr de Muxol
NASONEX (mométasone)	AVAMYS (fluticasone)	
NEBILET (5mg nébivolol)		Commander
NEULASTA (Pegfilgrastim 6 mg fabriqué à partir de bactéries E. coli génétiquement modifiées)		filgrastim pégylé commander
NEUPOGEN (30 MIU filgrastim = r-metHuG-CSF, non glycosylé, recombiné dans E. Coli)	ZARZIO (30 MIU filgrastim = r-metHuG-CSF, non glycosylé, recombiné dans E. Coli)	biosimilaire

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
NEURONTIN (100 mg gabapentine) (300 mg gabapentine) (400 mg gabapentine) (600 mg gabapentine) (sécable) (800 mg gabapentine) (sécable)	GABAPENTINE Sandoz (100 mg gabapentine) (300 mg gabapentine) (1/2 cpr 800 mg gabapentine) (600 mg gabapentine) (sécable) (800 mg gabapentine) (sécable)	
NEXIUM MUPS (20mg esoméprazole)	PANTOPRAZOL (20 mg pantoprazole)	Ne pas substituer Nexium Mups si le médicament doit être passé par la sonde --> dans ce cas Esomep en stock HL (ne pas écraser le cp d'Esomep mais le diluer dans l'eau)
NIF - TEN (nifédipine + aténolol)		Commander
NISULID (nimésulide)		Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste NB: risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation en 10,2011 par Swissmedic - traitement de 2ème intention - indiqué pour douleurs aiguës et dysménorrhées primaires pour une courte durée (max 15j) - indication 'arthrose localisée (genou, hanche)' retirée!
NITRODERM TTS ou NITRO-DUR TTS (nitroglycérine)	DEPONIT TTS (nitroglycérine)	
NOLVADEX (tamoxifène)	TAMOXIFEN FARMOS (tamoxifène)	Attention aux interactions médicamenteuses: tamoxifène est une prodrogue -->cf. pharmacien
NORMISON (20mg témazépam)	TEMESTA (1mg lorazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire ! Cf. annexe liste Benzo
NOVORAPID (insuline asparte)	HUMALOG (insuline lispro)	Remplacer par Humalog sauf si le patient gère son traitement lui-même avec Novorapid.
OEDEMEX (furosemide)	LASIX (furosemide)	Générique
OLBETAM (250mg acipimox)		Suspendre pendant hospitalisation
OLMETEC (10mg olmesartan) (20mg olmesartan) (40mg olmesartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose d'irbesartan si nécessaire !
OMEPRAZOLE (20mg oméprazole)	PANTOPRAZOL (20 à 40mg pantoprazole)	cf indication
OMIX OCAS cp retard (0.4mg tamsulosine)	TAMSULOSINE cpr retard (0,4 mg tamsulosine)	
ONGLYZA (2,5 mg saxagliptine) (5 mg saxagliptine)	JANUVIA (50 mg sitagliptine) (100mg sitagliptine)	
ORFIRIL Long (1000, 500, 300 ou 150 mg de valproate de Na)	DEPAKINE CHRONO 333 mg valproate de Na + 145 mg acide valproïque (corresp à 500 mg de valproate de Na) 200 mg valproate de Na + 87 mg acide valproïque (corresp à 300 mg de valproate de Na)	
OSPEN 1000 cpr (1Mio UI phénoxyéthylpénicilline)	PENICILLINE SPIRIG cpr (1Mio UI phénoxyéthylpénicilline)	
OSSOPAN (osseïne-hydroxyapatite)		Peut-être stoppé pendant hospitalisation - éventuellement remplacer par calcium
OXIS (formotérol)		Commander
PANZYTRAT 25'000 (332 mg pancréatine)	CREON 25'000 (150 mg pancréatine)	
PARIET (20mg rabéprazole)	PANTOPRAZOL (20 à 40mg pantoprazole)	cf indication
PEMZEK (8 ou 16mg candésartan cilexétl) (32 mg cadésartan cilexétl)	IRBESARTAN (150 mg irbesartan) (300 mg irbesartan)	
PENTACARINAT (Pentamidine eisetionas)		Toxicité élevée nécessitant une salle adaptée. Se pratique en hôpital universitaire.
PENTOXI-Mepha (pentoxifylline)		Commander en cas de claudication intermittente
PERENTEROL 250 mg caps (Saccharomyces boulardii)	BIOFLORIN 75 mio caps (Enterococcus faecium)	Proposer le Bioflorin (en liste) à la place du Perenterol. S'assurer qu'il n'y a pas d'immunosuppression ni de voie centrale. Voir "remarque pour pharmacien" pour le détail.
PERINDOPRIL + INDAPAMID (2.5 mg perindopril + 0.625mg indapamide)	1/2cpr CO-LISINOPRIL 10/12.5 (10mg lisinoprol + 12.5mg hydrochlorothiazide)	Poursuivre perindopril + indapamide si tt posé avec AVC (selon étude PROGRESS)! Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
PHLEBODRIL N (ruscogénine + hespéridine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
PHLEBOSTASIN (aescine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
PIROXICAM MEPHA (piroxicam)		Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste
PLENDIL (5mg félodipine)	AMLODIPINE (5mg amlodipine)	
PRADIF T (0.4mg tamsulosine)	TAMSULOSINE cpr retard (0,4 mg tamsulosine)	Générique
PRAVALOTIN (20mg pravastatine) (40mg pravastatine)	PRAVASTATINE SANDOZ (1/2 cpr 40mg pravastatine) (40mg pravastatine)	
PREDNISOLONE (5mg prednisolone)	PREDNISONE (5mg prednisone)	La prednisone est la prodrogue de la prednisolone. Ne pas substituer la prednisolone en cas de trouble du métabolisme hépatique.
PRIADEL RETARD (carbonate de lithium)		Commander Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments -> cf. pharmacien
PROCORALAN (ivabradine)		Commander
PRONTOSAN	Merfen sol aqueuse	
PROSCAR (5mg finastéride)	FINASTERIDE SANDOZ (5mg) finastéride)	
PROSTA-URGENINE (sabal)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
PROXEN (naproxène)	NAPROXENE 500 mg (naproxène)	

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
QUILONORM / - retard (lithium)		Commander Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments → cf. pharmacien
QUIRIL (5 mg quinapril) (10mg quinapril) (20mg quinapril)	LISINAPRIL (2.5mg lisinopril) (5mg lisinopril) (10mg lisinopril)	
RAMIPRIL (2,5 mg ramipril) (5mg ramipril) (10mg ramipril)	LISINAPRIL 10 (10 mg lisinopril) (10 mg lisinopril) (20 mg lisinopril)	Si ramipril 5mg: rester à 10mg de lisinopril, suivre la TA et augmenter la dose de lisinopril si nécessaire
RASILEZ (150/ 300 mg aliskirène) RASILEZ HCT (150 mg aliskirène + 12.5mg HCT) (150 mg aliskirène + 25mg HCT) (300 mg aliskirène + 12.5mg HCT) (300 mg aliskirène + 25mg HCT)		Commander
REBALANCE (millepertuis)		Risque élevé d' interactions médicamenteuses! Consulter un pharmacien. Autres spécialités contenant du Millepertuis: Remotiv, Hypericum-Mepha, Hyperforce, HyperMed, Hyperplant, Hyperval, Jarsin, Lucium, Solevita....
RENITEN (20 mg énalapril)	LISINAPRIL 20 (20mg lisinopril)	Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril.
RESONIUM A (résine - Na)	SORBISTERIT (résine - Ca)	Resonium comporte un risque d'hypématrémie et de rétention hydrosodée que n'a pas Sorbisterit
RIMACTAN sol 20 mg/ml (rifampicine)	RIFADINE sol 20 mg/ml (rifampicine)	Solution de Rimactan hors commerce, remplacée par le produit français
ROCALTROL caps (Calcitriol)	CALCITRIOL Salmon Pharma caps (Calcitriol)	
ROHYPNOL (1mg flunitrazépam)	ANXIOLIT (15mg oxazépam) ou NOCTAMID (1mg lormétazépam)	ou continuer selon contexte clinique NB: Rohypnol est classé dans les stupéfiants pour limiter les abus
SALAZOPIRIN (500 mg sulfasalazine)		Commander
SANDIMMUN NEORAL (cyclosporine)		Commander Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur !
SELECTOL (200mg céliprolol)		Commander
SELIPRAN (20mg pravastatine) (40mg pravastatine)	PRAVASTATINE SANDOZ (1/2 cpr 40mg pravastatine) (40mg pravastatine)	Générique
SEVIKAR (20mg olmesartan + 5mg amlodipine) (40mg olmesartan + 10mg amlodipine)	IRBESARTAN + AMLODIPINE (150mg + 5mg) (150mg + 10mg)	Suivre la TA et adapter la dose d'Irbésartan si nécessaire !
SEVIKAR HCT (20mg olmesartan + 5mg amlodipine + 12.5mg HCT) (40mg olmesartan + 10mg amlodipine + 12.5mg HCT)	CO-IRBESARTAN + AMLODIPINE (150/12.5mg + 5mg) CO-IRBESARTAN + AMLODIPINE (150/12.5mg + 10mg)	Suivre la TA et adapter la dose d'Irbésartan si nécessaire !
SINEMET /-CR (levodopa + carbidopa)		Commander Attention: Malgré la rainure, les comprimés ne sont pas sécables ! Le principe actif n'est pas réparti de manière homogène. → Ne pas prescrire de 1/2 comprimés. Sinemet peut être écrasé extemporanément pour être passé dans SNG mais pas Sinemet CR (perte de l'effet retard si coupé ou écrasé).
SINGULAIR (montélukast)		Commander
SOLATRAN (30 mg kétazolam)		A remplacer par une autre benzodiazépine → cf. pharmacien
SOMNIUM (1mg lorazépam + 25mg diphényhydramine)	TEMESTA (1mg lorazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
SORBIDILAT (dinitrate d'isosorbide)	ISOKET RETARD (dinitrate d'isosorbide)	
SORTIS (atorvastatine)	ATORVASTATINE (atorvastatine)	
SPERSADEX MONO 0.1% collyre (dexaméthasone)	PRED FORTE 1% collyre (prednisolone)	
SPERSALLERG collyre (antazoline + tétryzoline)	LIVOSTIN collyre (lévocabastine)	
STARLIX (natéglinide)		Commander
STILNOX CR (6.25 mg zolpidem) (12.5 mg zolpidem)	ZOLPIDEM (5 mg zolpidem) (10 mg zolpidem)	
STRUCTUM (sulfate de chondroïtine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
SULGAN-N pommade chlorhydrate de lidocaïne, camphre, menthol.	DOXIPROCT crème Dobésilate de calcium, chlorhydrate de lidocaïne	
SYMFONA (gingko biloba)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
TARDYFERON (80mg fer, sulfate)	DUOFER (69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
TARGIN (10mg oxycodone + 5mg naloxone) (20mg oxycodone + 10mg naloxone)	OXYCONTIN RETARD (10mg oxycodone) (20mg oxycodone) + laxatif d'office	A cette dose, la naloxone agit au niveau intestinal pour contrer la constipation induite par l'oxycodone sans affecter l'effet antalgique. Si Targin est remplacé par Oxycontin, prescrire un laxatif d'office. Si Targin maintenu, attention à la dose max. !: Dose max. = Targin 80mg oxycodone + 40mg naloxone - compléter avec Oxycontin retard si nécessaire.
TARKA (180mg vérapamil retard + 2mg trandolapril)		Commander
TELFAS (120 ou 180 mg fexonfénadine)	CETIRIZINE (10 mg cétirizine)	
TENORETIC MITE (50mg aténolol + 12.5mg chlortalidone)		Commander
TENORETIC (100mg aténolol + 25mg chlortalidone)		Commander

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
TENORMIN SUBMITE (25mg aténolol) MITE (50mg aténolol)		Commander
TEVETEN (600mg eprosartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	
TEVETEN PLUS (600mg eprosartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN (150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)	
TILDIEM (200mg diltiazem cps lib. prolongée)	DILZEM RR (180mg diltiazem)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
TILUR RETARD (acémétacine)		Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste
TORA DOL cpr (ketorolac)	OLFEN cpr (diclofenac)	
TOVIAZ cp ret (4mg ou 8mg fesoterodine)	DETRUSITOL SR caps ret (4mg tolterodine)	Att! baisser à DETRUSITOL 2mg - en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, ...) - si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)
TRAJENTA (5 mg linagliptine)		commander
4 sachets de TRANSIPEG (macrogol 3350 2.95 g + électrolytes)	1 sachet de MOVICOL (macrogol 3350 13.125 g + électrolytes)	4 sachets de Transipeg normal = 1 sachet de Movicol
2 sachets de TRANSIPEG Forte (macrogol 3350 5.9 g + électrolytes)		2 sachets de Transipeg forte = 1 sachet de Movicol
TRESIBA (insuline degludec)		Commander
TRIALIX (5mg ramipril + 6mg pirétanide)		Commander
TRIA TEC 2,5 mg (2,5 mg ramipril)	LISINOPRIL 10 (10 mg lisinopril)	
TRIA TEC COMP MITE (2,5 mg ramipril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10 / 12,5 (10 mg lisinopril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	
TRIA TEC COMP (5 mg ramipril + 25mg hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 20 / 12,5 (20 mg lisinopril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter les doses si nécessaire
TRILEPTAL (oxcarbazépine)		Commander
ULTIBRO (indacatérol + glycopyrronium)		Commander
UROREC (silodosine 8 mg)	TAMSULOSINE cps retard (0,4 mg tamsulosine)	Selon les études la silodosine 8 mg est non inférieure à la tamsulosine 0.4mg. Il n'y a par contre pas de données sur le dosage à 4 mg qui est en principe utilisé en cas de CICr 30-50 mL/min. La tamsulosine ne s'adapte pas lors d'IR.
UROREC (silodosine 4 mg)		
VALVERDE DETENTE NERVEUSE (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	RELAXANE (hors liste stocké) (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	
VASCORD 20/ 5 (20mg olmesartan + 5mg amlodipine)	IRBESARTAN (150mg irbesartan) + AMLODIPINE (5 mg amlodipine)	Suivre la TA et augmenter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire.
VELMETIA (50 mg sitagliptine + 500 mg metformine) (50 mg sitagliptine + 850 mg metformine) (50 mg sitagliptine + 1000 mg metformine)	JANUVIA 50 mg (100 mg sitagliptine) + METFORMIN (500/ 850/ 1000 mg) selon dosage	
VENORUTON (oxérutine)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
VENTOLIN DISKUS (salbutamol)		Commander
VESICARE (5 ou 10mg solifénacine)	DETRUSITOL SR caps ret (4mg tolterodine)	Att! baisser à DETRUSITOL 2mg - en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, ...) - si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)
VICTOZA (6 mg/ml liraglutide en stylo prérempli)		Commander
VIMOVO (500 mg naproxène + 20 mg esoméprazole 2x/j)	NAPROXENE 500 mg (500 mg naproxène 2x/j) + PANTOPRAZOL (40 mg pantoprazole 1x/j)	
VISKALDIX (10mg pindolol + 5mg clopamide)		Commander
VISKENE (10mg pindolol)		Commander
VITREOLENT (iodure de potassium et de sodium)		Commander
VOTUM (10mg olmesartan) (20mg olmesartan) (40mg olmesartan)	IRBESARTAN (150mg irbesartan)	Suivre la TA et adapter la dose d'irbesartan si nécessaire !
XALATAN (0.05mg/ml latanoprost)	LATANOPROST (0.05mg/ml latanoprost)	Générique de Xalatan
XATRAL UNO (10 mg affuzosine)	TAMSULOSINE cpr retard (0,4 mg tamsulosine)	
XELEVIA (25 mg sitagliptine) (50 mg sitagliptine) (100 mg sitagliptine)	JANUVIA (25 mg sitagliptine) (50 mg sitagliptine) (100 mg sitagliptine)	Commander le dosage à 25 mg uniquement car nous avons en stock Januvia 100 mg
XELODA (150 mg capecitabine) (500 mg capecitabine)	CAPECITABINE (150 mg capecitabine) (500 mg capecitabine)	

**LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!**

PIC-DPC28 Version: 4.8 /11.2019

MEDICAMENT DU PATIENT	MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC	REMARQUE
XENALON (50mg spironolactone)	ALDACTONE (50mg spironolactone)	
XENICAL (orlistat)		Peut être stoppé durant séjour hospitalier
XYZAL (5mg lévocétirizine)	CETIRIZINE (10mg cétirizine)	
ZADITEN (1mg kétotifène)	CETIRIZINE (10 mg cétirizine)	
ZADITEN collyre (0.25mg/mL kétotifène)	LIVOSTIN collyre (0.5mg/mL lévocabastine)	
ZALDIAR (37.5mg tramadol + 325mg paracétamol)	DAFALGAN (paracétamol) + TRAMADOL (15 gttes = 37.5 mg) (tramadol)	Adapter les doses selon les douleurs
ZANIDIP (10mg lercanidipine)	AMLODIPINE (5mg amlodipine)	Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
ZANIPRESS 10/20 (10mg lercanidipine + 20 mg enalapril)	AMLODIPINE (5mg amlodipine) + LISINOPRIL (20 mg lisinopril)	
ZANTIC (Ranitidine)	RANITIDINE (Ranitidine)	Générique
ZOLIM (mizolastine)	CETIRIZINE (cétirizine)	
ZOMIG (2.5 mg zolmitriptan) (5 mg zolmitriptan)	ALMOTRIPTAN (12,5 mg almotriptan)	
ZURCAL (pantoprazole)	PANTOPRAZOL (pantoprazole)	
ZYLORIC (allopurinol)	ALLOPURINOL (allopurinol)	
ZYVOXID (linezolid)		Commander Attention risque d'interactions médicamenteuses! cf. pharmacien

'cpr' = comprimé, 'cps' = capsule, LM= liste des médicaments, ND= no data

Références principales: Micromedex Healthcare Series 2013; Compendium suisse des médicaments, Documed, 2013; FAMI, 2014