Principe:
Si le patient a un médicament qui ne figure pas dans la liste des médicaments de l'hôpital, le médecin évalue s'il peut le remplacer par un médicament équivalent de la liste. Pour cette substitution, il peut s'aider des propositions ci-après.
Il est à noter que la substitution médicamenteuse est un acte médical !

Si vous ne trouvez pas un médicament, appelez l'assistance pharmaceutique: 021 804 21 46

Mise à jour: CC/19.6.2025

Médicament du patient	Médicament à l'hôpital	Remarque
Abilify cpr 5 mg (aripiprazole)	Aripiprazol cpr 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
Abilify cpr 10 mg (aripiprazole)	Aripiprazol cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
Abilify cpr 15 mg (aripiprazole)	Aripiprazol cpr 15 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Abilify sirop 1 mg/mL (aripiprazole)	Aripiprazol sirop 1 mg/mL	Générique HL, commander avec ordonnance
ACCUPRO 20 mg (quinapril)	LISINOPRIL 10 mg (lisinopril)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ACCURETIC 20/12,5 mg (quinapril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ACIMETHIN (méthionine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Aclasta amp 5 mg/100 mL	Zoledronat amp 5 mg/100 mL	Générique
Activelle® (estradiol, noréthistérone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
ACTONEL 35 mg (risédronate)	suspendre pendant hospitalisation	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécesssaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion. Si un biphosphonate est introduit à l'hôpital pour l'enseignement d'une prise adéquate, proposer Alendron Mepha (alendronate) 70 mg 1x/semaine qui est dans la liste des médicaments.
ACTOS (pioglitazone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ACULAR 0.5% (ketorolac)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ADENURIC cpr 80 mg (febuxostat)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ADVAGRAF cps retard (tacrolimus)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
AERIUS cpr 5 mg (desloratadine)	DESLORATADINE cpr 5 mg	Générique
AGIOLAX MITE (psyllium)	MUCILAR AVENA poudre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3x/j
AGOPTON 15 mg (lansoprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
AGOPTON 30 mg (lansoprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ALOXI sol inj 0,25 mg/5 mL (palonosetron)	PALONOSETRON sol inj 0,25 mg/5 mL	Générique
Alphagan collyre 0,2%	Brimonidine collyre 0,2%	Générique HL, commander sans ordonnance
ALVESCO 160 aéros doseur 160 mcg 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ALVESCO 80 aéros doseur 80mcg 120dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AMARYL cpr	GLIMEPIRIDE cpr	Générique HL, commander sans ordonnance
AMISULPRIDE cpr 100 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
AMISULPRIDE cpr 200 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
ANDREAFOL 0.4 mg (ac. folique)	ACIDE FOLIQUE Streuli 5 mg ou poursuivre *	La dose est plus élevée, mais le risque de surdosage sur quelques jours n'est pas relevant. * Si femme enceinte, poursuivre Andréafol.
Anexate amp 0,5 mg/5 mL	Flumazénil amp 0,5 mg/5 mL	Générique
ANORO ELLIPTA pdr inh 55mcg/22mcg 30 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ANTRA MUPS 20 mg (oméprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf

ANTRA MUPS 40 mg (oméprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
APRANAX cpr 550 mg	NAPROXENE cpr 500 mg	Générique
APROVEL cpr 150 mg	IRBESARTAN cpr 150 mg	Générique
APROVEL cpr 300 mg	IRBESARTAN cpr 300 mg	Générique
ARCOXIA (étoricoxib)	NAPROXENE 500 mg 2x/j +/- PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch, notamment pour l'ajout d'IPP selon le risque.
ARICEPT cpr 5 mg (donépézil)	Donépézil cpr 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ARICEPT cpr 10 mg (donépézil)	Donépézil cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ARIMIDEX 1 mg (anastrazole)	ANASTRAZOLE 1 mg (anastrazole)	Générique
Aripiprazol cpr	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
Aripiprazol sirop 1 mg/mL	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
ARIXTRA (fondaparinux)	CLEXANE (enoxaparine) ou poursuivre *	* Indications hors infarctus aigü: enoxaparine (posologie selon l'indication). Si infarctus ou contre-indication à HBPM: poursuivre Arixtra.
ARLEVERT cpr 20 / 40 mg (cinnarizine / diménhydrinate) 3 x/j	CINNAGERON cps 75 mg (cinnarizine) 1x/j	
ARNUITY ELLIPTA pdr inh 90mcg 30 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARNUITY ELLIPTA pdr inh 182mcg 30 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AROMASIN 25 mg	EXEMESTAN 25 mg (exemestane)	Générique
ARTEOPTIC LA 2% collyre flac 3ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARTEOPTIC LA UD gtt opht 2% unidose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ARTHROTEC (diclofenac + misoprostol)	NAPROXENE 500 mg 2x/j + PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch
ASACOL cpr pell 800 mg (mésalazine)	2 cpr ASACOL cpr pell 400 mg (mésalazine) *	* ou commander avec une ordonnance HL si le patient a un nombre élevé de comprimés journaliers à prendre cpr gastro-résistant
ASMANEX Twisthaler 400mcg/Dosis 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ASSAN crème	SPORTUSAL gel	
ATACAND 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND 4 mg (candésartan cilexétil)	0,5 cpr IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 16/12,5 mg (candésartan cilexétil/hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 32/12,5 mg (candésartan cilexétil/hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 32/25 mg (candésartan cilexétil/hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN (300 mg irbesartan) + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATACAND plus 8/12,5 mg (candésartan cilexétil/hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ATEDUREX 100/25 mg (atenolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATEDUREX 50/12,5 mg (atenolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATENIL MITE 50 mg	ATENOLOL 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ATENOLOL 50 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ATOZET 10/10 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	
ATOZET 10/20 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + ATORVASTATINE 20 mg	
ATOZET 10/40 mg (ezetimibe/atorvastatine)	EZETIMIBE (10 mg ezetimibe) + ATORVASTATINE 40 mg	
ATOZET 10/80 mg (ezetimibe/atorvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Augmentin cpr 1 g	Co-Amoxi Mepha cpr 1 g	Générique
Augmentin cpr 625 mg	Co-Amoxi Mepha cpr 625 mg	Générique
Augmentin inj 1100 mg	Co-Amoxi Mepha inj 1100 mg	Générique
Augmentin inj 2200 mg	Co-Amoxi Mepha inj 2200 mg	Générique
Augmentin inj 550 mg	Co-Amoxi Mepha PAED inj 550 mg	Générique
AULIN (nimésulide)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch Nimésulide : risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation depuis 2011, max. 15 j de ttt [Swissmedic]
AVASTIN conc perf 100 mg/4 mL	OYAVAS conc perf 100 mg/4 mL	Biosimilaire

AVODART cps 0,5 mg	DUTASTERID cps 0,5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance *NB* : demi-vie de 5 semaines ! Pourrait être suspendu pendant l'hospitalisation
AXOTIDE 50 nébuliseur doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AXURA cpr 10 mg	MEMANTIN cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
AXURA cpr 20 mg	MEMANTIN cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
AZAREK 50 mg (azathioprine)	IMUREK 50 mg (azathioprine)	Médic. princeps, rédiger une ordonnance HL
AZARGA gtt opht 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
AZILECT 1 mg (rasagiline)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
AZOPT 1% (brinzolamide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Bactrim forte cpr 800/160	Nopil forte cpr 800/160 mg	Générique
BECLO Orion Easyhaler pdr inh 0.2mg 200 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BECOTIDE aérosol doseur 100 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BENOCTEN (diphénhydramine)	ATARAX cpr 25 mg (hydroxyzine) ou poursuivre*	Adapter la posologie selon l'indication et la fonction rénale * si la forme 'gouttes' souhaite être poursuivie, rédiger une ordonnance HL
BEPANTHEN ong nasal 5% (dexpanthénol)	Pommade nasale RUEDI	
Bepanthène onguent	Pantothen onguent	Générique
BEROTEC N aéros doseur 100mcg 10ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Betadine pommade	Braunovidon onguent	Générique
Betaserc cpr 16 mg	Bétahistine cpr 16 mg	Générique Les effets sont de faibles niveaux de preuve dans les vertiges (Murdin L, 2016).
Betaserc cpr 24 mg	Bétahistine cpr 24 mg	Générique Les effets sont de faibles niveaux de preuve dans les vertiges (Murdin L, 2016).
BETOPTIC S collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BETOPTIC S single dose gtt opht 0,25ml (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BIKTARVY cpr 50/ 200/ 25 mg (bictégravir, emtricitabine, ténofovir alafénamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
BILAXTEN 20 mg (bilastine)	CETIRIZINE 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
BIOTINE cpr	suspendre pendant l'hospitalisation	
BINOSTO cpr eff 70 mg (alendronate) 1x/sem!	suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécesssaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
BLOPRESS 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS 32 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 16/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 32/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 32/25 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BLOPRESS PLUS 8/12.5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
BONVIVA ser 3 mg/3 mL 1x/3 mois!	IBANDRONAT ser 3 mg/3 mL 1x/3 mois! ou suspendre pendant hospitalisation	Générique HL, commander avec ordonnance Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes.
BRICANYL turbuhaler pdr inh 0.5 mg 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRIDION fio 200mg/2mL (sugammadex)	SUGAMMADEX fio 200mg/2mL	Générique Attention à l'interaction avec la contraception hormonale!
BRIDION fio 500mg/5mL (sugammadex)	SUGAMMADEX fio 500mg/5mL	Générique Attention à l'interaction avec la contraception hormonale!
BRIMONIDINE Mepha gtt opht 0,2% 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX cpr 5 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX cpr 10 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX cpr 20 mg (vortioxétine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BRINTELLIX gttes 20 mg/mL (vortioxétine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
BRIVEX 125 mg (brivudine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Brufen cpr 200 mg	Irfen cpr 200 mg	Générique
Brufen cpr 400 mg	Irfen cpr 400 mg	Générique
Brufen cpr 600 mg	Irfen cpr 600 mg	Générique
Brufen cpr ret 800 mg	Irfen cpr ret 800 mg	Générique
BUDENID Steri Nebs susp inhal 0.5mg/2ml (eo 20)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
BUDESONIDE spray nasal 64 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
Bulboid supp Adulte	Glycerin Elk Pharma supp Adulte	Générique
BYETTA stylo (exénatide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CADUET 10/10 mg (amlodipine /atorvastatine)	AMLODIPINE 10 mg + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	

CADUET 5/10 mg (amlodipine /atorvastatine)	AMLODIPINE 5 mg + 1/2 cpr ATORVASTATINE 20 mg	
CALCORT 6 mg (déflazacort)	PREDNISONE cpr 5 mg	cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
CALPEROS D3 cpr 500 mg / 400 UI (calcium / vit. D3)	CALCIUM SANDOZ D3 pdre 500 mg /440 UI (calcium / vit. D3) ou CALCIMAGON D3 cpr à croquer 500 mg/ 400 UI (calcium / vit. D3)	
CARDIPLANT cpr 450 mg (aubépine)	Suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Efficacité mal établie, propriétés antiagrégantes de l'aubépine et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
Cardura CR cpr ret 4 mg	Doxazosine cpr ret 4 mg	Générique; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, …)
Cardura CR cpr ret 8 mg	Doxazosine cpr ret 8 mg	Générique; vérifier les interactions médicamenteuses (tamsulosine, …)
Casodex cpr 50 mg	Bicalutamide cpr 50 mg	Générique
CEDUR RETARD 400 mg (bézafibrate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Efficacité des fibrates surtout chez les patients avec des triglycérides élevés et des taux de HDL faibles. Peu d'évidence que l'ajout d'un fibrate à une statine réduise la mortalité CV (Feghaly et al. Drugs (2020) 80:353–362). Dans le cas d'un traitement combiné, on préfère le fenofibrate qui semble moins intervenir dans le métabolisme des statines que le gemfibrozil.
CELEBREX (celecoxib)	NAPROXENE 500 mg 2x/j +/- PANTOPRAZOL 20 mg 1x/j	Le naproxène (max 1000 mg/j) et l'ibuprofène (max 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Plus d'informations dans le 'DoloPIC' sur pharmpic.ch, notamment pour l'ajout d'IPP selon le risque.
CELLCEPT (mycophénolate mofétil)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
CELLUVISC unit dose gtt opht 0,4mL	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
CETALLERG 10 mg cpr	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	Générique
CHARBON ACTIF gel Bichsel 15 g/100 mL flc 200 mL	CARBOVIT susp 15 g/100 mL flc 100 mL (charbon actif)	Antidote
CHOLIB (145 mg fenofibrate + 20 mg simvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CIMIFEMINE (extrait de cimcifuga)	Suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Phytothérapie; risque d'hépatotoxicité
CIPRALEX cpr 10 mg (escitalopram)	ESCITALOPRAM cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Sound-alike: risque de confusion avec citalopram ! Chez > 65 ans: 10 mg/j max.
CIPRALEX cpr 20 mg (escitalopram)	ESCITALOPRAM cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Sound-alike: risque de confusion avec citalopram ! Chez > 65 ans: 10 mg/j max.
Ciproxine cpr 250 mg	Ciprofloxacine cpr 250 mg	Générique
Ciproxine cpr 500 mg	Ciprofloxacine cpr 500 mg	Générique
Ciproxine inj 0,2 g	Ciprofloxacine inj 200 mg	Générique
Circadin® cpr ret 2 mg (mélatonine)	Mélatonine cps 3 mg	
CLARITINE 10 mg (loratidine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
CLIMAVITA (extrait de cimcifuga)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Phytothérapie; risque d'hépatotoxicité
CLOPIN ECO cpr (clozapine)	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP1A2, CYP3A4, QT); suivre la formule sanguine (agranulocytose!)
COAPROVEL 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Générique
COAPROVEL 300/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
COAPROVEL 300/25 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide) ou 2 cpr CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan + hydrochlorothiazide)	
CODICONTIN (dihydrocodéine)	A remplacer par un autre antalgique de la liste	
CO-DIOVAN 80/12,5 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	VALSARTAN 80 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Générique valsartan
CO-DIOVAN cpr 160/12,5 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CO-DIOVAN cpr 160/25 mg (valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CO-EPRIL 20/12,5 mg (enalapril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 20/12.5 mg (lisinopril /hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
CO-IRBESARTAN 300/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
CO-IRBESARTAN 300/25 mg (irbesartan + hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	2 cpr CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan + hydrochlorothiazide)
CO-LATANOPROST Pfizer gtt opht 2,5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance

COLCHICINE 1 mg	COLCTAB 1 mg (colchicine)	Rédiger une ordonnance HL en précisant l'indication. Médicament à marge thérapeutique étroite. Adaptation posologique à la fonction rénale et contrôle des interactions médicamenteuses recommandés. Détails sous: https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Points-therapeutiques/Colchicine.pdf
COLCTAB 1 mg (colchicine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL en précisant l'indication. Médicament à marge thérapeutique étroite. Adaptation posologique à la fonction rénale et contrôle des interactions médicamenteuses recommandés. Détails sous: https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Points-therapeutiques/Colchicine.pdf
COLOPHOS (phosphate de sodium)	COLOLYT (macrogol 4000 / Na2SO4 / NaCl / NaHCO3 / KCl)	Risque d'hypocalcémie et d'hyperphosphatémie avec Colophos: attention chez âgé (troubles du rythme décrits), insuffisant rénal
COLOSAN MITE (sterculia)	MUCILAR AVENA poudre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3x/j
COMBIGAN collyre flac 5ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COMPETACT 15 / 850 mg (pioglitazone / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CONCOR 10 mg	2 cpr BISOPROLOL 5 mg	Générique
CONCOR 5 mg	BISOPROLOL 5 mg	Générique
CONCOR PLUS cpr 10 (10 mg bisoprolol + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
CONCOR PLUS cpr 5 (5 mg bisoprolol + 12,5 mg hydrochlorothiazide)	BISOPROLOL 5 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	
CONDROSULF (chondroïtine sulfate sodique)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	utilité discutable et quelques jours de mise en suspens ne prétérite pas le pronostic du patient (Aubry-Rozier, 2012).
CONSTELLA cps 290 microgr. (linaclotide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Cordarone cpr 200 mg	Amiodarone cpr 200 mg	Générique
Cordarone inj 150 mg/ 3 mL	Amiodarone inj 150 mg/ 3 mL	Générique
COSAAR cpr 50 mg (losartan)	LOSARTAN cpr 50 mg	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSAAR cpr 100 mg (losartan)	2 cpr LOSARTAN 50 mg	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSAAR PLUS 50/12,5 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	LOSARTAN cpr 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Générique Losartan est une prodrogue qui doit être être activée par le CYP2C9. Attention si inhibiteurs (amiodarone, valproate, etc)!
COSAAR PLUS 100/12,5 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html * sauf si patient avec goutte/hyperuricémie, poursuivre
COSAAR PLUS 100/25 mg (losartan / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN cpr 150 mg + ESIDREX cpr 25 mg (hydrochlorothiazide) *	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire ! cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html * sauf si patient avec goutte/hyperuricémie, poursuivre
COSOPT gtt opht stérile fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COSOPT S gtt opht monodos 0.2ml (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
COTENOLOL MEPHA NEO MITE 50 / 12,5 mg (aténolol / chlortalidone)	ATENOLOL 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Atenolol générique HL, commander sans ordonnance
COVERAM 5/5 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 10 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 5/10 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 10 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 10/5 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 20 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM 10/10 mg (périndopril / amlodipine)	LISINOPRIL 20 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM PLUS 10/10/2,5 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
COVERAM PLUS 10/5/2,5 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
COVERAM PLUS 5/10/1,25 mg (périndopril /amlodipine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERAM PLUS 5/5/1,25 mg (périndopril / amlodipine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERSUM N 5 mg (périndopril arginine)	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
COVERSUM N COMBI 5 / 1,25 mg (périndopril arginine / indapamide)	CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
CREON 10'000 UI cps (pancréatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Crestor cpr 10 mg	ROSUVASTATINE cpr 10 mg	Générique

Crestor cpr 20 mg	ROSUVASTATINE cpr 20 mg	Générique
Crestor cpr 5 mg	ROSUVASTATINE cpr 5 mg	Générique
Cubicin inj 500 mg	Daptomycin inj 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Cubicin inj 350 mg	Daptomycin inj 350 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
CUTIVATE crème 50 mcg/g (fluticasone)	BETNOVATE crème 1 mg/g (betaméthasone)	Corticoïde topique d'activité forte (classe. III [pharmavista.ch])
CYMBALTA cps 30 mg (duloxétine)	DULOXETINE cps 30 mg	Générique
CYMBALTA cps 60 mg (duloxétine)	DULOXETINE cps 60 mg	Générique
DAFLON (diosmine + hespéridine)	Suspendre durant l'hospitalisation ou poursuivre *	L'utilité est discutable et la mise en suspens durant les quelques jours d'hospitalisation ne prétérite pas le pronostic du patient. Augmentation du risque hémorragique: attention chez les patients sous anticoagulants/ antiagrégants. Vérifier les interactions médicamenteuses (diosmine = inhibiteur faible CYP3A4, CYP2C9). * Pour le traitement des hémorroïdes en phase aiguë (Antje Lechleiter, 2019), le traitement peut être commandé en spécifiant sur l'ordonnance HL ce motif.
Dalacin C cps 300 mg	Clindamycine cps 300 mg	Générique
Dalacin C inj 600 mg/4 mL	Clindamycine inj 600 mg/4 mL	Générique
DALMADORM cpr 30 mg (flurazépam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
DALMADORM MITE cpr 15 mg (flurazépam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
DEANXIT (flupentixol + mélitracène)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DELAMOXYL fio sec 1 g (amoxicilline)	AMOXICILLIN fio sec 1 g	Générique
DEMETRIN 10 mg (prazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
DEMETRIN 20 mg (prazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam) + 1 cpr SERESTA en réserve	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
DENTOHEXINE sol (chlorhexidine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL peut être utilisé pour le trempage des dentiers lors de mycose buccale
DEROXAT cpr 20 mg (paroxétine)	PAROXETINE cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
DE URSIL cps (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DE URSIL RR cps (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DEXAFREE UD 0,1% (dexaméthasone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DEXILANT (dexlansoprazole)	PANTOPRAZOL 20 ou 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
DICETEL (pinavérine)	DUSPATALIN RETARD (mébévérine)	
Diflucan cps 200 mg	Fluconazole cps 200 mg	Générique
Diflucan cps 50 mg	Fluconazole cps 50 mg	Générique
Diflucan inj 200 mg/100 mL	Fluconazole inj 200 mg/100 mL	Générique
Dilatrend cpr 12,5 mg	Carvédilol cpr 12,5 mg	Générique
Dilatrend cpr 6,25 mg	Carvédilol cpr 6,25 mg	Générique
DIOVAN 160 mg (valsartan)	2 cpr VALSARTAN 80 mg	Générique
DIOVAN 80 mg (valsartan)	VALSARTAN 80 mg	Générique
DISTRANEURIN MIXTUR 31.5mg/ml flac 300ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Divigel® gel (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
DONEPEZIL cpr 5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
DONEPEZIL cpr 10 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
DORMIPLANT (valériane, mélisse)	REDORMIN cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
Dospir sol inhal 2,5 mL	Ipramol Steri Nebs 2,5 mL	Générique
DOXIUM (dobésilate)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
DOXYCYCLINE cpr 100 mg	VIBRAMYCINE cpr 100 mg (doxycycline)	Médic. princeps
Dulcolax drg 5 mg	Prontolax drg 5 mg	Générique
Dulcolax supp 10 mg	Prontolax supp 10 mg	Générique
DUODARTcps 0,5/0,4 mg (dutastéride / tamsulosine)	Dutastéride Tamsulosine cps 0,5/0,4 mg	Générique
DUOKOPT gtt opht fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
DUOPLAVIN (75 mg clopidogrel+ 100 mg aspirine)	CLOPIDOGREL 75 mg + ASPIRINE CARDIO 100 mg	
DUOTRAV gtt opht 2,5 ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Duphalac sirop (lactulose)	Rudolac sirop (lactulose)	Générique
DYMISTA spray nasal (azélastine, fluticasone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel du patient ou commander à la PIC avec une ordonnance HL
DYNAMISAN	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Au besoin, remplacer par des vitamines de la liste (Supradyn energy®, Becozyme forte®, …)
EBIXA cpr 10 mg (mémantine)	MEMANTIN cpr 10 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EBIXA cpr 20 mg (mémantine)	MEMANTIN cpr 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
ECOFENAC (diclofenac)	OLFEN (diclofenac)	Générique

EDARBI cpr 40 mg (azilsartan)	IRBESARTAN cpr 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDARBI cpr 80 mg (azilsartan)	IRBESARTAN cpr 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDARBYCLOR cpr 40 / 12,5 mg (azilsartan / chlortalidone)	CO-IRBESARTAN cpr 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDARBYCLOR 40 / 25 mg (azilsartan / chlortalidone)	IRBESARTAN 150 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
EDRONAX cpr 4 mg (réboxétine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Efexor ER cps 150 mg	Venlafaxine ER cps 150 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
Efexor ER cps 37,5 mg	Venlafaxine ER cps 37,5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
Efexor ER cps 75 mg	Venlafaxine ER cps 75 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
EFFORTIL (étiléfrine)	GUTRON (midodrine) 2,5mg 3x/j, puis titrer jusqu'à 10mg 3x/j si nécessaire	L'efficacité de l'étiléfrine n'est pas bien établie. La midodrine semble être efficace dans l'hypotension orthostatique, bien que certaines études récentes ne le confirment pas.
EFIENT cpr 10 mg (prasugrel)	poursuivre	en liste Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l'anamnèse !! Non recommandé si 75 ans et plus, si poids < 60kg
EFIENT cpr 5 mg (prasugrel)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l'anamnèse !! Non recommandé si 75 ans et plus, si poids < 60kg
EKLIRA Genuair pdr inh 60 dos (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ELOCOM crème 1 mg/g (mométasone furoate)	BETNOVATE crème 1 mg/g (betaméthasone)	Corticoïde topique d'activité forte (classe. III [pharmavista.ch])
EMSELEX 15 mg (darifenacine) 1x/j	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
EMSELEX 7,5 mg (darifenacine) 1x/j	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
ENERZAIR breezhaler 150/50/160 mcg (indacatérol/ glycopyrronium/ mométasone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ENTOCORT CIR cpr 3 mg (budésonide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ENTUMINE cpr 40 mg (clotiapine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EPLERENON cpr 25 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone métabolisée par CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses
EPLERENON cpr 50 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone métabolisée par CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses
EPRIL 10 mg (enalapril)	LISINOPRIL 10 mg *	* Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril.
ESCITALOPRAM cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Sound-alike: risque de confusion avec citalopram ! Chez > 65 ans: 10 mg/j max.
Esmeron inj 100 mg/10 mL	Rocuronium inj 100 mg/10 mL	Générique
Esmeron inj 50 mg/5 mL	Rocuronium inj 50 mg/5 mL	Générique
ESOMEPRAZOLE 20 mg	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
ESOMEPRAZOLE 40 mg	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
Estradot patch (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
ESTROFEM N cpr 1 mg (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
ESTROFEM N cpr 2 mg (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
EUTHYROX (lévothyroxine)	ELTROXINE- LF cpr séc. 50 ou 100 mcg (lévothyroxine) ou poursuivre *	* si protocole Chirurgie GHOL (commander sans ordonnance) ou si impossibilité de préparer la dose voulue avec les cpr d'Eltroxine (rédiger une ordonnance HL) LF: lactose free
EVISTA 60 mg (raloxifène)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EXCIPIAL crème grasse	DEXERYL crème	
EXELON cps (rivastigmine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
EXELON patch 4,6 mg/24h (rivastigmine)	RIVASTIGMINE patch 4,6 mg/24h	Générique HL, commander avec ordonnance

EXELON patch 9,5 mg/24h (rivastigmine)	RIVASTIGMINE patch 9,5 mg/24h	Générique HL, commander avec ordonnance
EXFORGE 10/160 mg (amlodipine / valsartan)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE 5/160 mg (amlodipine / valsartan)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE 5/80 mg (amlodipine / valsartan)	AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg	Génériques
EXFORGE HCT 10/160/12,5 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 10/160/25 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 5/160/12,5 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
EXFORGE HCT 5/160/25 mg (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Ezetrol cpr 10 mg (ezetimibe)	Ezetimibe cpr 10 mg	Générique
FAKTU pommade (policresulène, cinchocaïne)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	
FAKTU supp (policresulène, cinchocaïne)	PROCTO-GLYVENOL supp (lidocaïne, tribénoside)	
FASTUM gel 25 mg/g (kétoprofène)	OLFEN gel 10 mg/g (diclofénac)	
FELODIPIN 5 mg (félodipine)	AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
FEMANNOSE (D-mannose)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Pas d'études solides ni sur l'efficacité ni sur l'innocuité de ce traitement enregistré comme dipositif médical.
Femara cpr 2,5 mg (letrozol)	Letrozol cpr 2,5 mg	Générique
Feminelle® (Cimicifuga)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Risque hépatotoxique probable (European Medicines Agency, 2018)
Femoston® (estradiol, dydrogestérone)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
FERRO GRADUMET 105 mg (fer, sulfate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
FERRO SANOL cps 100 mg (fer(II), glycine-sulfate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
FERRUM HAUSMANN 100 mg (fer, fumarate)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
FLAGYL cpr 500 mg (métronidazole)	METRONIDAZOLE cpr 500 mg	Générique Risque de prolongation du QT; effet *Antabus* en présence d'alcool
FLECTOPARIN Tissugel (diclofenac, héparine)	OLFEN patch (diclofenac)	Si besoin, en plus d'Olfen® patch, Hirudoid® crème ou gel (héparinoïde) peut être appliqué.
FLECTOR EP gran 50 mg (diclofenac)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
FLECTOR EP Tissugel (diclofenac)	OLFEN patch (diclofenac)	Générique
FLUCTINE cps 20 mg (fluoxétine)	FLUOXETINE cps 20 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
FLUIDOSE gtt opht 30 monodose 0.4 mL	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
FLUOXETINE cps 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).
FLUTIFORM 50/5 aéros doseur 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FLUTIFORM 125/5 aéros doseur 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FLUTIFORM 250/10 aéros doseur 120 doses	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FOLVITE (1 mg ac.folique)	ACIDE FOLIQUE Streuli 5 mg ou poursuivre *	La dose est plus élevée, mais le risque de surdosage sur quelques jours n'est pas relevant. * Si femme enceinte, poursuivre ttt initial.
FORADIL capsules poudre inhalation 12mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FORXIGA cpr (dapagliflozine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FOSAMAX cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem!	Générique Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécesssaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
FOSAVANCE 70 mg / 2800 UI (alendronate / cholecalciferol) 1x/sem!	Suspendre pendant hospitalisation ou ALENDRON MEPHA cpr 70 mg (alendronate) 1x/sem! Si nécessaire, substituer cholécalciférol par Vi-Dé3 (100 UI/gtte).	Biphosphonate: habituellement stoppé durant l'hospitalisation, car un effet pharmacologique résiduel persiste durant de longues périodes et il est nécesssaire que le patient se tienne en position verticale 30 min après ingestion.
FOSINOPRIL HCT 20 / 12,5 mg (fosinopril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10 / 12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
FOSTER aéros doseur 100/6 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
FRAGMIN® (daltéparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre daltéparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)

FRAXIFORTE (nadroparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre nadroparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)
FRAXIPARINE (nadroparine)	CLEXANE (enoxaparine) *	Adapter la posologie d'enoxaparine à l'indication * ou poursuivre nadroparine si indication particulière (rédiger une ordonnance HL en précisant cette indication)
FUCIDINE crème ou pommade (20 mg/g ac. fusidique)	BACTROBAN pommade (20 mg/g mupirocine)	
FUROATE MOMETASON spray nasal 50 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
FUROSPIR 50 / 20 mg (spironolactone / furosémide)	ALDACTONE 50 mg (spironolactone) + 1/2 cpr LASIX 40 mg (furosémide)	
GALVUMET 50/ 500 mg, 50 / 850 mg, 50 / 1000 mg (vildagliptine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GALVUS (vildagliptine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GANFORT gtt opht 3 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Gincosan® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
GLANATEC gttes opht 5ml (eo 5)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
GLAUPAX cpr 250 mg (acétazolamide)	DIAMOX cpr 250 mg (acétazolamide)	
GLIVEC (imatinib)	IMATINIB	Générique HL, commander avec ordonnance
GLIVEC GIST (imatinib)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL en précisant l'indication et GIST Les indications et les conditions de remboursement sont différentes pour Glivec 'GIST'
GLUCOBAY (acarbose)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Glucophage cpr 1000 mg	Metformin cpr 1000 mg	Générique
Glucophage cpr 500 mg	Metformin cpr 500 mg	Générique
Glucophage cpr 850 mg	Metformin cpr 850 mg	Générique
Grodurex cpr 5/50 mg	Comiloride cpr 5/50 mg	Générique
GYNO-TARDYFERON cpr ret. 80 / 0,35 mg (fer (II) / ac. folique)	DUOFER FOL cpr 69 / 0,4 / 300 mg (fer (II) / ac. folique / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
HALCION cpr 0,25 mg (triazolam)	DORMICUM cpr 7,5 mg (midazolam) ou ZOLPIDEM cpr 10 mg	Important effet amnésiant d'Halcion ! à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
HYLO-COMOD collyre flac 10 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
HYPERICUM MEPHA (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
HYPERIFORCE (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
HYPERIMED (milleprtuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
HYPERVAL (milleprtuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
HYTRIN BPH 5-10 mg (térazosine)	TAMSULOSINE cpr retard 0,4 mg *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
IALUGEN plus crème (hyaluronate de Na 2mg et sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g)	FLAMMAZINE crème (sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g) *	* Poursuivre Ialugen plus si partie du protocole brulûres des Urgences
Ibérogast® teinture (mélange de plantes)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Lésions hépatiques et rénales reportées (Saez-Gonzalez, 2016) (Gerhardt, 2019)
Imodium cpr 2 mg	Loperamide cpr 2 mg	Générique
Imovane cpr 7,5 mg	Zopiclone cpr 7,5 mg	Générique
IMPORTAL (lactitol)	RUDOLAC (lactulose)	En cas d'encéphalopathie hépatique, le lactulose ou le lactitol peuvent être utilisés.
INCRUSE ELLIPTA pdr inh 55mcg 30 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
INDAPAMIDE MEPHA 2,5 mg	FLUDEX SR 1,5 mg (indapamide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
INDOCID RETARD cps 75 mg (indométhacine)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch Indométhacine pour protocole 'menace d'accouchement': utiliser INDOXEN cpr 50 mg importé
INEGY 10/10 mg (ezetimibe / simvastatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance A prendre le soir
INEGY 10/20 mg (ezetimibe / simvastatine)	EZETIMIBE 10 mg + 1/2 cpr SIMCORA 40 mg (simvastatine)	A prendre le soir

INEGY 10/40 mg (ezetimibe / simvastatine)	EZETIMIBE 10 mg + SIMCORA 40 mg (simvastatine)	A prendre le soir
INHIBACE MITE 2,5 mg (cilazapril)	LISINOPRIL 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
INHIBACE PLUS 5 / 12,5 mg (cilazapril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL 10 / 12.5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
INHIXA® (enoxaparine sodique)	CLEXANE (enoxaparine)	
INSIDON 50 mg (opipramol)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
INSPRA cpr 25 mg (éplérénone)	EPLERENON cpr 25 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone métabolisée par CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses
INSPRA cpr 50 mg (éplérénone)	EPLERENON cpr 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance Eplérénone métabolisée par CYP3A4: vérifier les interactions médicamenteuses
INVOKANA cpr (canagliflozine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
IOPIDINE 0,5% collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
IOPIDINE gtt opht 1% 2 monodose 0.25ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ISOCOLAN (2 sachets pour 1L)	COLOLYT (1 sachet pour 1L)	
ISOPTO TEARS 0.5% collyre flac 10 mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
ISOSOURCE ENERGY bag 500 mL	FRESUBIN ENERGY easybag 500 mL	
ISOSOURCE ENERGY FIBRE bag 500 mL	FRESUBIN ENERGY FIBRE easybag 500 mL	
ISOSOURCE PROTEIN bag 500 mL	FRESUBIN HP ENERGY easybag 500 mL	
ISOSOURCE STANDARD bag 500 mL	FRESUBIN ORIGINAL easybag 500 mL	
ISOSOURCE STANDARD FIBRE bag 500 mL	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE easybag 500 mL	
JANUMET cpr 50 / 1000 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 1000 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui qui se prend 2x/j
JANUMET cpr 50 / 500 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 500 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui qui se prend 2x/j
JANUMET cpr 50 / 850 mg (sitagliptine / metformine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr 50 / 850 mg	Générique en liste La posologie s'adapte à la fonction rénale. Attention: comprimé à libération immédiate qui qui se prend 2x/j
JANUMET XR (sitagliptine / metofrmine)	SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr retard	Générique HL, commander sans ordonnance comprimé RETARD ('XR') -> se prend 1x/j La posologie s'adapte à la fonction rénale.
JANUVIA cpr 25 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 25 mg	Générique HL, sans ordonnance La posologie de sitagliptine s'adapte à la fonction rénale.
JANUVIA cpr 50 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 50 mg	Générique La posologie de sitagliptine s'adapte à la fonction rénale.
JANUVIA cpr 100 mg (sitagliptine)	SITAGLIPTINE cpr 100 mg	Générique La posologie de sitagliptine s'adapte à la fonction rénale.
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 1000 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 500 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
JARDIANCE MET (5 mg empagliflozine + 850 mg metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
JARSIN (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuite du ttt	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/1000 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 1000 mg 2x/j	
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/500 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 500 mg 2x/j	
JENTADUETO (2.5 mg linagliptine/850 mg metformine) 2x/j	TRAJENTA cpr 5 mg (linagliptine) 1x/j + METFORMINE 850 mg 2x/j	
KALCIPOS-D3 cpr 500 mg / 800 UI (calcium / vit. D3)	CALCIMAGON D3 citron cpr 500 mg /800 UI (calcium / vit. D3)	
Kefzol inj 1 g	Cefazoline inj 1 g	Générique
Kefzol inj 2 g	Cefazoline inj 2 g	Générique
KENDURAL 105 / 500 mg (fer / vit. C)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
KEPPRA cpr 250 mg	LEVETIRACETAM cpr 250 mg	Générique
KEPPRA cpr 500 mg	LEVETIRACETAM cpr 500 mg	Générique
KEPPRA cpr 1000 mg	LEVETIRACETAM cpr 1000 mg	Générique
KEPPRA sol. orale 100 mg/mL	LEVETIRACETAM sol. orale 100 mg/mL	Générique
Ketalar amp 200 mg/ 20 mL	Kétamine amp 100 mg/ 10 mL	Générique
Ketalar amp 500 mg/ 10 mL	Kétamine amp 100 mg/ 2 mL	Générique
Klacid amp 500 mg	Clarithromycine amp 500 mg	Générique
Klacid cpr 250 mg	Clarithromycine cpr 250 mg	Générique
Klacid cpr 500 mg	Clarithromycine cpr 500 mg	Générique
Klaciped susp 125 mg/ 5 mL	Clarithromycine susp 125 mg/ 5 mL	Générique

KOMBIGLYZE XR (metformine + saxagliptine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LACRIFLUID gtt opht 10 mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
LACRYCON gel ophtalmique monodose	LACRI-VISION gel ophtalmique monodose	composition identique, avec ac. hyaluronique
LACRYVISC gel opht 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
LACRYVISC SE gel ophtalmique monodose	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
LAMICTAL cpr disp 100 mg (lamotrigine)	Lamotrin Mepha cpr disp 100 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMICTAL cpr disp 200 mg (lamotrigine)	Lamotrine Mepha cpr disp 200 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMICTAL cpr disp 25 mg (lamotrigine)	Lamotrine Mepha cpr disp 25 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMICTAL cpr disp 50 mg (lamotrigine)	Lamotrine Mepha cpr disp 50 mg (lamotrigine)	Générique HL, commander avec ordonnance
LAMISIL (terbinafine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
LATANOPROST Mepha gtt opht 50mcg/ml fl 2,5ml (eo1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LAXIPLANT SOFT® (psyllium)	MUCILAR AVENA poudre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3x/j
LECAPON cpr (levodopa / carbidopa / entacapone)	STALEVO cpr (levodopa / carbidopa / entacapone)	Médic. princeps, rédiger une ordonnance HL
LECICARBON supp ad (eo 10)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LEGALON caps (sylimarine)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Phytothérapie (extrait sec titré de fruit de Chardon-Marie)
LEPONEX cpr (clozapine)	CLOPIN ECO cpr (clozapine)	Générique HL, commander avec ordonnance Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP1A2, CYP3A4, QT); suivre la formule sanguine (agranulocytose!)
LEQVIO sol. inj (inclisiran)	poursuivre	Vérifier la date de la dernière injection (fréquence: m0, m3, puis chaque 6 mois) Rédiger une ordonnance HL Attention: remboursement en ambulatoire soumis à limitations
LERCANIDIPINE 10 mg	AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
LESCOL cpr ret 80 mg (fluvastatine)	ROSUVASTATINE cpr 5 mg	cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
LIBRAX 5 / 2,5 mg (chlordiazepoxide / clidinium)	LEXOTANIL 1,5 mg (bromazepam)	La présence de clidinium comme anticholinergique peut être délétère chez certains patients. Si Librax® souhaité (p.ex. dans colon irritable), rédiger une ordonnance HL
LIMBITROL 12,5 / 5 mg (amitriptyline / chlordiazépoxide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
LIPANTHYL (fenofibrate)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Efficacité des fibrates surtout chez les patients avec des triglycérides élevés et des taux de HDL faibles. Peu d'évidence que l'ajout d'un fibrate à une statine réduise la mortalité CV (Feghaly et al. Drugs (2020) 80:353–362). Dans le cas d'un traitement combiné, on préfère le fenofibrate qui semble moins intervenir dans le métabolisme des statines que le gemfibrozil.
LIPOSIC Fluid UD gel opht 0,6 g	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
LIPOSIC gel opht 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
LISITRIL (lisinopril)	LISINOPRIL	Générique
Litalir cps 500 mg	Hydroxycarbamid cps 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance; vérifier la fonction rénale et adapter la posologie si nécessaire
LITHIOFOR (lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
LIVAZO cpr 1 mg (pitavastatine)	1/2 cpr PRAvastatine cpr 40 mg	cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html A prendre le soir
LIVAZO cpr 2 mg (pitavastatine)	ROSUvastatine cpr 5 mg	cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
LIVAZO cpr 4 mg (pitavastatine)	ROSUvastatine cpr 10 mg	cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
LIVIAL 2,5mg (tibolone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
LIXIANA (edoxaban)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LODINE (etodolac)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch
LODOZ 10 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LODOZ 2,5 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LODOZ 5 / 6,25 mg (bisoprolol / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LOGIMAX 5/50 mg (félodipine / métoprolol)	AMLODIPINE 5 mg + BELOC ZOK 50 mg (métoprolol)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
LOMIR SRO 5 mg (isradipine)	AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
LOMIR SRO MITE 2,5 mg (isradipine)	AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
LOPRESOR 50 mg (métoprolol tartrate)	BELOC ZOK 50 mg (métoprolol succinate)	
LORAMET cpr 1 ou 2 mg (lormétazépam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Au besoin, lormétazépam 1 à 2 mg pourrait être remplacé par oxazépam 15 mg le temps de commander la benzodiazépine du patient [www.praxis-suchtmedizin.ch]
L-POLAMIDON 5mg/mL (lévométhadone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Attention risque de confusion avec la méthadone! 10 mg lévomtéhadone = env. 20 mg méthadone

LUCILIUM (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
LUMIGAN gtt opht 0.1 mg/ml 3ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LUMIGAN Unit Dose gtt opht 0.3 mg/ml 0.4ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
LUVIT D3 sol huil. 4000 UI/mL prévention	VI-DE 3 gttes 4500 UI/mL	
Lyrica cps 100 mg	Prégabaline cps 100 mg	Générique
Lyrica cps 150 mg	Prégabaline cps 150 mg	Générique
Lyrica cps 25 mg	Prégabaline cps 25 mg	Générique
Lyrica cps 50 mg	Prégabaline cps 50 mg	Générique
Lyrica cps 75 mg	Prégabaline cps 75 mg	Générique
Mabthera conc perf 100 mg/10 mL	Rixathon conc perf 100 mg/10 mL	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
Mabthera conc perf 500 mg/50 mL	Rixathon conc perf 500 mg/50 mL	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
MAG 2 FORTE 7,5 mmol (magnésium)	MAGNESIOCARD 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
Magnesium Biomed® (magnésium)	MAGNESIOCARD 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
Magnesium Diasporal® (citrate de magnésium)	MAGNESIOCARD 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MALTOFER 100 mg (fer III polymaltose)	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C) ou MALTOFER gtte 50 mg/mL	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
MALTOFER FOL 100/ 0,35 mg (fer III polymaltose/ac. folique)	DUOFER FOL cpr 69 / 0,4 / 300 mg (fer (II) / ac. folique / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
MARCOUMAR (phenprocoumone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MAXALT 5 ou 10 mg (rizatriptan)	ALMOGRAN 12,5 mg (almotriptan)	Risque de syndrome sérotoninergique par les triptans: vérifier les interactions avec les médicaments du patient!
MEDIAVEN (naftazone)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
MEMANTIN cpr 10 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
MEMANTIN cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
Meronem inj 1 g	Meropenem inj 1 g	Générique
METAMUCIL pdre (psyllium)	MUCILAR AVENA poudre (psyllium, avoine)	1 à 2 c. à café, 2 à 3x/j
METHOTREXATE (méthotrexate) 1x/sem!	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Médiament à haut risque ! Contrôler la forme galénique et la dose (à adapter en cas d'IR) et préciser le jour de prise (1x/sem).
METO ZEROK (métoprolol)	BELOC ZOK (métoprolol)	Médicament princeps
MEVALOTIN 20 mg (pravastatine)	1/2 cpr PRAVASTATINE 40 mg	Générique
MEVALOTIN 40 mg (pravastatine)	PRAVASTATINE 40 mg	Générique
MG5 GRANORAL 12 mmol (magnésium)	MAGNESIOCARD gran 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MG5 LONGORAL cpr à croquer 5 mmol (magnésium)	MAGNESIOCARD gran 10 mmol (magnésium)	Adapter le nombre de sachets de Magnesiocard 10 en fonction du nombre de mmol de Mg désiré.
MIANSERINE cpr 30 mg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MICARDIS 40 mg (telmisartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
MICARDIS 80 mg (telmisartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
MICARDIS PLUS 80 / 12,5 mg (telmisartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
MIFLONIDE Breezhaler cps inh 200mcg (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MIFLONIDE Breezhaler cps inh 400mcg (eo 60)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MINALGINE 500 mg (métamizole)	METAMIZOL cpr 500 mg	Générique
MINITRAN TTS (nitroglycérine)	DEPONIT TTS (nitroglycérine)	Respecter un intervalle sans patch d'au moins 8h (sinon risque de tolérance et perte d'efficacité)
MODIGRAF gran (tacrolimus)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
MOGADON 5 mg (nitrazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
MOLAXOLE 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13,125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
MOMETASON spray nasal 50 mcg	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
MONOPROST gtt opht SDU monodoses 0,2ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
MOTILIUM LINGUAL cpr orodisp 10 mg (dompéridone)	Dompéridone cpr orodisp 10 mg	Générique Durée maximale de ttt: 1 sem.
MUCOFOR 300 mg (erdostéine) 2x/j	SOLMUCOL 200 mg (acétylcystéine) 3x/j	
MULTAQ (dronédarone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les contre-indications! Hépatotoxicité
MUXOL N 5 mg (bisacodyl)	PRONTOLAX 5 mg (bisacodyl)	
MYDRIATICUM (tropicamide) 0,5% collyre	TROPICAMIDE 0,5% collyre unidose	Générique

MYFORTIC (mycophénolate sodique)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
NASONEX spray nasal 50 mcg (mométasone)	AVAMYS spray nasal 27,5 mcg (furoate de fluticasone)	
NEBILET 5 mg (nébivolol)	NEBIVOLOL 5 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
NEBIVOLOL 5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
Neulasta ser 6 mg/ 0,6 mL	Pelgraz ser 6 mg/ 0,6 mL	Biosimilaire
NEUPOGEN ser 30 mioU/0,5 mL (filgrastim)	ZARZIO ser 30 mioU/0,5 mL (filgrastim)	Biosimilaire
NEUPOGEN ser 48 mioU/0,5 mL (filgrastim)	ZARZIO ser 48 mioU/0,5 mL (filgrastim)	Biosimilaire
NEURODOL TISSUGEL (lidocaïne)	poursuivre *	Rédiger une ordonnance HL * ou, selon le type de douleurs, OLFEN patch (diclofénac) Dans les douleurs somatiques du dos, les patchs de Neurodol® ne sont pas plus efficaces que le placebo (Palmer, 2017).
Neurontin cpr 600 mg	Gabapentine cpr 600 mg	Générique
Neurontin cps 100 mg	Gabapentine cps 100 mg	Générique
Neurontin cps 300 mg	Gabapentine cps 300 mg	Générique
Neurontin cps 400 mg	Gabapentine cps 400 mg	Générique
NEXIUM MUPS 20 mg (esoméprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
NEXIUM MUPS 40 mg (esoméprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
NICORETTE INVISI patch 10 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 3 léger mat 7 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE INVISI patch 15 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 2 moyen mat 14 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE INVISI patch 25 mg/16h (nicotine)	NICOTINELL patch 1 forte mat 21 mg/24h (nicotine)	
NICORETTE Microtab orig cpr subling 2 mg (nicotine)	NICOTINELL cpr sucer 2 mg (nicotine)	
NICORETTE Mint spray (1 mg nicotine / dose)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
NICORETTE ORIGINAL 2 mg pastille à mâcher (nicotine)	NICOTINELL GUM 2 mg (nicotine)	
NICORETTE ORIGINAL 4 mg pastille à mâcher (nicotine)	NICOTINELL GUM 4 mg (nicotine)	
NILEMDO cpr 180 mg (ac. bempédoïque)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
NISULID (nimésulide)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch Nimésulide : risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation depuis 2011, max. 15 j de ttt [Swissmedic]
NITRODERM TTS (nitroglycérine)	DEPONIT TTS (nitroglycérine)	Respecter un intervalle sans patch d'au moins 8h (sinon risque de tolérance et perte d'efficacité)
Nizoral shampoo 20 mg/g	Terzolin shampoo 10 mg/g	Générique (moins concentré)
NOLVADEX (tamoxifène)	TAMOXIFEN FARMOS (tamoxifène)	Générique Vérifier les interactions avec les médicaments de la patiente (tamoxifène = prodrogue)
NORMISON 20 mg (témazépam)	TEMESTA 1 mg (lorazépam)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
Norvasc cpr 5 mg	Amlodipine cpr 5 mg	Générique
Novalgine amp 1 g/2 mL	Novaminsulfone amp 1 g/2 mL	Générique
NOVALGINE 500 mg (métamizole)	METAMIZOL cpr 500 mg	Générique
NOVORAPID (insuline asparte)	HUMALOG (insuline lispro) ou poursuivre *	* sauf si le patient gère son traitement lui-même ou si d'office 3x/j
NU-GEL lidocaïne préparation magistrale	XYLOCAINE GEL 2% + NU-GEL en application séquentielle	Appliquer Xylocaïne gel 2%, attendre 20 min, puis appliquer le NuGel. Rappel: Le tube de 30 g Xylocaïne gel est destiné à un usage unique! [Swissmedic]
NUSTENDI cpr 180/ 10 mg (ac. bempédoïque / ezétimibe)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses
Nuvaring®	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL.
OCULAC SDU gtt opht 0,4 mL	OCULAC collyre flac 10 mL *	Viscosité faible * sauf si allergie au benzalkonium
OEDEMEX (furosémide)	LASIX (furosémide)	Médic. princeps

Oestrogel® gel (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
OLANZAPINE cpr 15 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
OLANZAPINE ORO cpr orodisp 15 ou 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
OLBETAM 250 mg (acipimox)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Dérivé de l'ac. nicotinique
OLMETEC 10 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
OLMETEC 20 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
OLMETEC 40 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
OMEPRAZOLE 20 mg	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
OMEPRAZOLE 40 mg	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
Omix Ocas cpr ret 0,4 mg (tamsulosine)	Tamsulosine cpr ret 0,4 mg *	Générique * Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
ONBREZ BREEZHALER 0.3mg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ONGLYZA 2,5 mg (saxagliptine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ONGLYZA 5 mg (saxagliptine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Oprane® (Gattilier)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Phytothérapie: Quelques jours de mise en suspens ne prétérite pas le pronostic du patient
OPTAVA Unit Dose gtt opht 5 mg/mL 4mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
OPTIVE gtt opht lubrifiant 10 mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
OPTIVE UD gtt opht lubr. et osmop. 0,4mL	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne
ORFIRIL Long (valproate de Na)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
OSPEN 1000 cpr 1 mioUI (phénoxyméthylpénicilline)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
OSSOPAN (osseine-hydroxyapatite)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
OTRIVIN (xylométazoline)	NASIVINE PUR (oxymétazoline)	
OXIS turbuhaler 12 mcg/dose 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
OXIS turbuhaler pdr inh 6mcg/dose 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
OXYCONTIN cpr retard 5 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 5 mg	Générique
OXYCONTIN cpr retard 10 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 10 mg	Générique
OXYCONTIN cpr retard 20 mg (oxycodone)	OXYCODONE RETARD cpr 20 mg	Générique
OXYNORM cps (oxycodone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL pourrait aussi être substitué par OXYNORM sol. buvabe
OZEMPIC stylo (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/sem!
Pantozol cpr 20 mg	Pantoprazol cpr 20 mg	Générique
Pantozol cpr 40 mg	Pantoprazol cpr 40 mg	Générique
Pantozol inj 40 mg	Pantoprazol inj 40 mg	Générique
PANZYTRAT 25'000 (pancréatine)	CREON 25'000 (pancréatine)	
PARIET 10 mg (rabéprazole)	PANTOPRAZOL 20 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
PARIET 20 mg (rabéprazole)	PANTOPRAZOL 40 mg ou poursuivre *	* si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles) En cas de troubles de la déglutition, SNG ou PEG, privilégier ESOMEP MUPS (esoméprazole) voire OGASTORO cpr orodisp (lansoprazole) (rédiger une ordonnance HL en précisant le motif) cf. https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Recomm-utilisation/Administration-non-inj/IPP-par-voie-orale-et-enterale.pdf
PAROXETINE cpr 20 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient (CYP2D6).

PEMZEK 16 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK 32 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 300 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK 8 mg (candésartan cilexétil)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 16 / 12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 32/12,5 mg (candésartan cilexétil /hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 32/25 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	IRBESARTAN 300 mg + ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PEMZEK plus 8/12,5 mg (candésartan cilexétil / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PENTASA clyst ou supp (mésalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
PENTOXI-Mepha (pentoxifylline)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
PERENTEROL 250 mg caps (Saccharomyces boulardii) *	BIOFLORIN 75 mio caps (Enterococcus faecium)	* Attention: des cas de fongémie sous Perenterol ont été reportés. A éviter lors d'immunosuppression (y compris voisin de chambre) ou de voie centrale.
PERINDOPRIL - INDAPAMID (2,5 mg périndopril + 0,625mg indapamide)	1/2cpr CO-LISINOPRIL 10/12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERINDOPRIL 4 mg	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PERINDOPRIL 8 mg	LISINOPRIL 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
Phénobarbital cpr 100 mg	Aphénylbarbite cpr 100 mg	Générique Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
Phénobarbital cpr 50 mg	Aphénylbarbite cpr 50 mg	Générique Vérifier les interactions médicamenteuses, car inducteur enzymatique!
Pilules contraceptives	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL.
PIROXICAM MEPHA (piroxicam)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch
PK-MERZ cpr 100 mg (amantadine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Plavix cpr 75 mg	Clopidogrel cpr 75 mg	Générique
PLENDIL 5 mg (félodipine)	AMLODIPINE (5mg amlodipine)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
PODOMEXEF cpr 200 mg	CEFPODOXIME cpr 200 mg	Générique
PODOMEXEF susp orale 40 mg/5 mL (cefpodoxime)	CEFPODOXIME susp orale 40 mg/5 mL	Générique importé
PONSTAN cpr 500 mg (ac. méfénamique)	Acide méfénamique cpr 500 mg	Générique
PONSTAN cps 250 mg (ac. méfénamique)	1/2 cpr Acide méfénamique 500 mg	Générique
PRADAXA 110 mg (dabigatran)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PRADAXA 150 mg (dabigatran)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Pradif T cpr ret 0,4 mg	Tamsulosine cpr ret 0,4 mg *	Générique * Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
PREDNISOLONE 5 mg	PREDNISONE 5 mg *	La prednisone est la prodrogue de la prednisolone. * Ne pas subsituter la prednisolone en cas de trouble du métabolisme hépatique. cf. doses équivalentes sur https://pharmpic.ch/Points-therapeutiques/Tableaux-comparatifs.html
Premens® (Gattilier)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Phytothérapie: Quelques jours de mise en suspens ne prétérite pas le pronostic du patient
PRIADEL RETARD (carbonate de lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
PRIMPERAN cpr 10 mg (métoclopramide)	PASPERTIN cpr 10 mg (métoclopramide)	Durée maximale de ttt: 5 j
PRIMPERAN sol inj 10 mg / 2 mL (métoclopramide)	PASPERTIN sol inj 10 mg / 2 mL (métoclopramide)	Durée maximale de ttt: 5 j
PROCORALAN (ivabradine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4!) et les contre-indications (AVC, décomp. cardiaque, …)
PROCTO-GLYVENOL crème (tribénoside, lidocaïne)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	

PROGRAF (tacrolimus)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL: vérifier la forme galénique et la posologie habituelles du patient Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseurs. Médicament à marge thérapeutique étroite: vérifier les interactions médicamenteuses. Si le patient prend un IPP, maintenir sa molécule habituelle et la commander à la pharmacie en indiquant 'non substituable' (co-prescription d'immunosuppresseur).
PROPRANOLOL cpr 10 mg	INDERAL cpr 10 mg (propranolol)	Médic. princeps
PROPRANOLOL cpr 40 mg	INDERAL cpr 40 mg (propranolol)	Médic. princeps
Proscar cpr 5 mg	Finastéride cpr 5 mg	Générique
Prostagutt® (sabal, ortie)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
Prostatonin® (prunier africain, ortie)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012)
PROSTA-URGENINE (sabal)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
PROTAGENT collyre 10 mL	OCULAC collyre flac 10 mL	Viscosité faible
PROTAGENT SE gtt opht 0,4 mL	OCULAC collyre flac 10 mL *	Viscosité faible * sauf si allergie au benzalkonium
PROXEN cpr 500 mg (naproxène)	NAPROXENE cpr 500 mg	Générique
PROTHROMPLEX NF fio 600 UI (complexe prothrombinique humain)	OCTAPLEX fio 500 UI (complexe prothrombinique humain)	Attention dosage différent: adapter la posologie!
PULMICORT 100 turbuhaler 0.1 mg 200 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT 200 turbuhaler 0.2 mg 200 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT 400 Turbuhaler 400mcg 50 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
PULMICORT aéros doseur 0.2mg 120dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
QUILONORM / - retard (lithium)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (ex. AINS), la fonction rénale et adapter la dose si nécessaire (éventuellement TDM).
QVAR AUTOHALER 100mcg dose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
RAMIPRIL 10 mg	LISINOPRIL 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RAMIPRIL 2,5 mg	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RAMIPRIL 5 mg	LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
RANEXA cpr ret 375 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT); suivre la fonction rénale
RANEXA cpr ret 500 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT); suivre la fonction rénale
RANEXA cpr ret 750 mg (ranolazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (CYP3A4, QT); suivre la fonction rénale
RASILEZ 150 ou 300 / 12,5 mg (aliskirène / hydrochlorothiazide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL NB: association contre-indiquée avec IECA ou SARTAN
RASILEZ 150 ou 300 / 25 mg (aliskirène / hydrochlorothiazide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL NB: association contre-indiquée avec IECA ou SARTAN
RASILEZ 150 ou 300 mg (aliskirène)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL NB: association contre-indiquée avec IECA ou SARTAN
REBALANCE (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
RELVAR ELLIPTA pdr inh 92mcg/22mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
RELVAR ELLIPTA pdr inh 184mcg/22mcg	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Remeron cpr 30 mg	Mirtazapine cpr 30 mg	Générique
Remeron SolTab cpr orodisp 15 mg	Mirtazapine cpr orodisp 15 mg	Générique
Remeron SolTab cpr orodisp 30 mg	Mirtazapine cpr orodisp 30 mg	Générique
Remicade inj 100 mg	Inflectra inj 100 mg	Biosimilaire HL, commander avec ordonnance
REMOTIV (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
RENAGEL 800 mg (sevelamer chlorhydrate)	SEVELAMERCARBONATE Salmon cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	Utiliser la même dose en mg d'un sel à l'autre. Avantages du carbonate: moins d'effets secondaires gastro-intestinaux, moins de risque d'acidose métabolique [Barna et al, 2010]
RENNIE cpr à sucer (calcium carbonate, magnésium subcarbonate)	ALUCOL gel (algedrate, hydroxyde de magnésium)	
RENVELA cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	SEVELAMERCARBONATE Salmon cpr 800 mg (sevelamer carbonate)	Générique
RENVELA pdre 2,4 g (sevelamer carbonate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
RESONIUM A (résine - Na)	SORBISTERIT (résine - Ca)	Resonium comporte un risque d'hypernatrémie et de rétention hydrosodée que n'a pas Sorbisterit

REXULTI (brexpiprazole)	poursuivre	HL, commander avec ordonnance se prend 1x/j (longue demi-vie: env. 91h) Dose max. journalière si GFR< 60 mL/min: 3 mg/j Dose max. journalière lors d'agitation dans la démence Alzheimer: 2 mg/j [Lexi-Drugs, Swissmedicinfo.ch, nov. 24]
Rezirkane® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
RHINOVENT spray nasal 0,03% (ipratropium)	NASIPRAL spray nasal 0,03% (ipratropium)	Rhinovent® hors commerce, Nasipral® importé d'Allemgane Rédiger une ordonnance HL
Rimactan cps 150 mg	Rifampicine cps 150 mg	Générique Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
Rimactan cps 300 mg	Rifampicine cps 300 mg	Générique Inducteur enzymatique: vérifier les interactions médicamenteuses!
Rinosedin® (xylométazoline)	Nasivine pur® (oxymétazoline)	
RIOPAN cpr ou gel (magaldrate)	ALUCOL gel (algedrate, hydroxyde de magnésium)	
RIVASTIGMINE patch 4,6 mg/24h	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
RIVASTIGMINE patch 9,5 mg/24h	poursuivre	Générique HL, commander avec ordonnance
Rocaltrol cps 0,25 mcg	Calcitriol cps 0,25 mcg	Générique
Rocaltrol cps 0,5 mcg	Calcitriol cps 0,5 mcg	Générique
Rocephine inj 1 g	Ceftriaxone inj 1 g	Générique
Rocephine inj 2 g	Ceftriaxone inj 2 g	Générique
ROHYPNOL 1 mg (flunitrazépam)	SERESTA 15 mg (oxazépam) *	* Rohypnol est une des BZD à fort degré d'addiction et peut être difficile à rempalcer après des années d'utilisation. A poursuivre selon le contexte clinique
RYBELSUS cpr (sémaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Sabcaps® (sabal)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	utilité discutable (Tacklind J, 2012), propriétés antiagrégantes du sabal et risque de saignement (Natural products database, Lexi-complete, 2022)
SAFLUTAN gtt opht monodos 0.3ml (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SALAMOL AUTOHALER 100mcg 200 dos	VENTOLIN aérosol doseur 100 mcg	
SALAZOPYRIN ou SALAZOPYRIN EN 500 mg (sulfasalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL La pharmacocinétique de 'Salazopyrin' et 'Salazopyrin EN' semblent similaires. La forme 'EN' est proposée en cas d'EI gastro-intestinal et est la seule à avoir l'indication 'polyarthrite rhumatoïde'.
SALBU ORION Easyhaler pdr inh 0,2mg (eo 200)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SALOFALK cpr, gran, lavement ou supp (mésalazine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
SANALEPSI N gttes 10 mg/mL (doxylamine)	ATARAX cpr 25 mg (hydroxyzine) ou poursuivre*	Adapter la posologie selon l'indication et la fonction rénale * si la forme 'gouttes' souhaite être poursuivie, rédiger une ordonnance HL
SANDIMMUN NEORAL (ciclosporine)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur ! Vérifier les interactions médicamenteuses, la fonction rénale et que la bonne forme galénique soit prescrite.
Sandostatine amp 0,05 mg/1 mL	Octreotid amp 0,05 mg/1 mL	Générique
Sandostatine amp 0,1 mg/1 mL	Octreotid amp 0,1 mg/1 mL	Générique
SAXENDA stylo 6 mg/mL (liraglutide)	VICTOZA stylo 6 mg/mL (liraglutide)	
Sedonium® (valériane)	Redormin® cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
SEEBRI breezhaler caps inh 50mcg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SELECTOL 200 mg (céliprolol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE 50 aéros doseur 120dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE 125 aéros doseur 120dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE DISKUS 100 pdr inh 60dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE DISKUS 250 pdr inh 60dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SERETIDE DISKUS 500 pdr inh 60dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SEREVENT DISKUS 50mcg/dose	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Seropram cpr 20 mg	Citalopram cpr 20 mg	Générique
Seroquel cpr 100 mg	Quétiapine cpr 100 mg	Générique
Seroquel cpr 200 mg	Quétiapine cpr 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Seroquel cpr 25 mg	Quétiapine cpr 25 mg	Générique
Seroquel cpr 300 mg	Quétiapine cpr 300 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
SEVIKAR 20/5 mg (olmesartan /amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR 40/10 mg (olmesartan / amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR HCT 20/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
SEVIKAR HCT 40/10/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150/12,5 mg + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !

SEVREDOL cpr 10 ou 20 mg (morphine)	MORPHINE sol. 20 mg/mL ou caps 5 mg	Formes à libération immédiate à adapter à la posologie souhaitée
SICCAFLUID gel opht 0.25 % fl 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
SICCAPROTECT collyre flac 10 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Sifrol cpr 0,125 mg	Pramipexole cpr 0,125 mg	Générique
Sifrol cpr 0,5 mg	Pramipexole cpr 0,5 mg	Générique
SIMBRINZA susp opht fl 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SINEMET (levodopa + carbidopa)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Attention: Malgré la rainure, les comprimés ne sont pas sécables ! Le principe actif n'est pas réparti de manière homogène. Ne pas prescrire de 1/2 cpr.
SINGULAIR cpr 10 mg (montélukast)	MONTELUKAST cpr 10 mg	Générique
SITAGLIPTINE / METFORMINE cpr retard	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance comprimé RETARD (ou 'XR') -> se prend 1x/j La posologie s'adapte à la fonction rénale.
SOLATRAN 30 mg (kétazolam)	LEXOTANIL 6 mg (bromazepam) + 1 cpr en réserve *	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire ! * ou poursuivre selon le contexte clinique
SOLEVITA (millepertuis)	Evaluer si arrêt possible ou poursuite du ttt	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les autres médicaments du patient.
SOLIAN cpr 100 mg (amisulpride)	AMISULPRIDE cpr 100 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
SOLIAN cpr 200 mg (amisulpride)	AMISULPRIDE cpr 200 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
SOLFENACINE cpr 5 mg	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j ou poursuivre	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou : Générique HL, rédiger une ordonnance
SOLFENACINE cpr 10 mg	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j ou poursuivre	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou : Générique HL, rédiger une ordonnance
Sortis cpr 20 mg	Atorvastatine cpr 20 mg	Générique
Sortis cpr 40 mg	Atorvastatine cpr 40 mg	Générique
SPERSADEX MONO 0.1% collyre (dexaméthasone)	PRED FORTE 1% collyre (prednisolone) *	* ou poursuivre selon l'indication (rédiger une ordonnance HL) Vérifier la durée du ttt.
SPERSALLERG collyre (antazoline + tétryzoline)	LIVOSTIN collyre (lévocabastine)	
SPIOLTO Respimat 2.5 mcg/pulv réutilisa 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SPIRIVA Respimat 2.5 mcg/pulv réutilisa 60 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
STALEVO cpr (levodopa / carbidopa / entacapone)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
STARLIX (natéglinide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
STILNOX cpr 10 mg	ZOLPIDEM cpr 10 mg	Générique à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STILNOX CR 12,5 mg (zolpidem)	ZOLPIDEM cpr 10 mg	Intérêt thérapeutique faible de la forme retard 'CR' à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STILNOX CR 6,25 mg (zolpidem)	1/2 cpr ZOLPIDEM 10 mg	Intérêt thérapeutique faible de la forme retard 'CR' à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
STRUCTUM (sulfate de chondroïtine)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
SULGAN-N pommade (lidocaïne, camphre, menthol)	DOXIPROCT pommade (dobésilate, lidocaïne)	
SULGAN-N supp (lidocaïne, camphre, menthol)	PROCTO-GLYVENOL supp (lidocaïne, tribénoside)	
SYMBICORT 100/6 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMBICORT 200/6 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMBICORT 400/12 turbuhaler	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
SYMFONA (gingko biloba)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
TAPTIQOM gtt opht 0,015 / 5 mg/mL (tafluprost / timolol)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/j!
TARDYFERON cpr ret. 80 mg (Fe (II))	DUOFER cpr 69 / 300 mg (fer (II) / vit. C)	La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés. Posologie usuelle : 1 à 2 cpr/j à jeun ou 1j/2 selon (Stoffel, 2017)
TARGIN 20/10 mg (oxycodone /naloxone)	OXYCODONE RETARD cpr 20 mg (oxycodone) + laxatif d'office ou poursuivre *	* La naloxone per os est utilisée pour son effet laxatif sans affecter l'effet antalgique de l'oxycodone. NB: posologie max. journalière de Targin: 160 / 80 mg oxycodone/naloxone. Au-delà, compléter avec Oxycodone retard.
TARGIN cpr 10/5 mg (oxycodone /naloxone)	OXYCODONE RETARD cpr 10 mg (oxycodone) + laxatif d'office ou poursuivre *	* La naloxone per os est utilisée pour son effet laxatif sans affecter l'effet antalgique de l'oxycodone. NB: posologie max. journalière de Targin: 160 / 80 mg oxycodone/naloxone. Au-delà, compléter avec Oxycodone retard.
TARKA cpr ret (180 mg vérapamil + 2 mg trandolapril)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
Tavanic cpr 500 mg	Lévofloxacine cpr 500 mg	Générique
Tavanic inj 500 mg/100 mL	Lévofloxacine inj 500 mg/100 mL	Générique
Tazobac inj 2,25 g	Pipéracilline/ tazobactam inj 2,25 g	Générique
Tazobac inj 4,5 g	Pipéracilline/ tazobactam inj 4,5 g	Générique
TEARS NATURALE collyre flac	CELLUFLUID collyre flac 10 mL	Viscosité moyenne

Tebofortin® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
Tebokan® (Ginkgo biloba)	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Utilité discutable. Des interactions médicamenteuses sont décrites avec les médicaments à base de Ginkgo. Risque hémorragique (Alessandro Di Minno, 2017)
TELFAST 120 mg (fexonfénadine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
TELFAST 180 mg (fexonfénadine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
TENORETIC 100 / 25 mg (aténolol / chlortalidone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TENORETIC MITE 50 / 12,5 mg (aténolol / chlortalidone)	ATENOLOL 50 mg + 1/2 cpr ESIDREX 25 mg (hydrochlorothiazide)	Atenolol générique HL, commander sans ordonnance
Tenormin mite cpr 50 mg	Aténolol cpr 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
TENORMIN SUBMITE 25 mg (aténolol)	1/2 cpr ATENOLOL 50 mg	Générique HL, commander sans ordonnance
TEVETEN 600 mg (eprosartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TEVETEN PLUS 600 / 12,5 mg (eprosartan / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
Tienam inj 500 mg	Imipenem/cilastatine inj 500 mg	Générique
TILUR RETARD (acémétacine)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch
TIMO-COMOD gtt opht 0,5% 5ml (eo 1)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOGEL UD gel opht 0.1 % monodose 0.4g	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC gtt opht 0.25% fl	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC gtt opht 0.5 % fl 5 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMOPTIC-XE gtt opht 0.5 % fl 2.5 ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIMPILO gtt opht 4% 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TIROSINT caps (lévothyroxine)	ELTROXINE- LF cpr séc. 50 ou 100 mcg (lévothyroxine) ou poursuivre *	* commander sans ordonnance HL si impossibilité d'atteindre la dose avec les cpr d'Eltroxine (p.ex. Tirosint 13 mcg, 88 mcg, 112 mcg, 137 mcg, 175 mcg) LF: lactose free
TOPAMAX cpr 50 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 50 mg	Générique
TOPAMAX cpr 100 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 100 mg	Générique
TOPAMAX cpr 200 mg (topiramate)	TOPIRAMATE cpr 200 mg	Générique
TORA DOL cpr (ketorolac)	IRFEN cpr (ibuprofène) ou NAPROXENE cpr	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch NB: Tora-Dol cpr pour une durée maximale de 7 jours
TOREM cpr 2,5 mg	TORASEMID cpr 2,5 mg	Générique
TOREM cpr 5 mg	1/2 cpr TORASEMID 10 mg	Générique
TOREM cpr 10 mg	TORASEMID cpr 10 mg	Générique
TOREM cpr 20 mg	2 cpr TORASEMID 10 mg	Générique
TOREM cpr 200 mg	TORASEMID cpr 200 mg	Générique
TOVIAZ cp ret 4 mg (fesoterodine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
TOVIAZ cp ret 8 mg (fesoterodine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas
Tramal amp 100 mg/2 mL	Tramadol amp 100 mg/2 mL	Générique
Tramal cpr ret 100 mg	Tramadol cpr ret 100 mg	Générique
Tramal cpr ret 150 mg	Tramadol cpr ret 150 mg	Générique
Tramal cpr ret 50 mg	Tramadol cpr ret 50 mg	Générique
Tramal cps 50 mg	Tramadol cps 50 mg	Générique
Tramal gttes 100 mg/mL	Tramadol gttes 100 mg/mL	Générique
TRANSIPEG 4 sachets (macrogol 3350 2.95 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13.125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
TRANSIPEG Forte 2 sachets (macrogol 3350 5.9 g + électrolytes)	MOVICOL 1 sachet (macrogol 3350 13.125 g + électrolytes)	Prendre 1h avant ou 2h après les autres médicaments
Travatan collyre 40 mcg/mL	Travoprost collyre 40 mcg/mL	Générique HL, commander sans ordonnance
TRAVOPROST Mepha gtt opht 40mcg/ml fl 2,5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRAZODONE cpr	TRITTICO cpr (trazodone)	Médic. princeps
TRELEGY ELLIPTA pdr inh 92/55/22mcg (30 dos)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRESIBA (insuline degludec)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRIALIX 5 / 6 mg (ramipril /pirétanide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
TRIATEC cpr 2,5 mg (ramipril)	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIATEC cpr 5 mg (ramipril)	LISINOPRIL cpr 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIATEC COMP cpr 5 / 25 mg (ramipril / hydrochlorothiazide)	LISINOPRIL cpr 10 mg + ESIDREX cpr 25 mg (hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIATEC COMP MITE cpr 2,5 / 12,5 mg (ramipril / hydrochlorothiazide)	CO-LISINOPRIL cpr 10 / 12,5 mg (lisinopril / hydrochlorothiazide)	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
TRIMBOW sol inhal fl 120 dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
TRITTICO cpr ret 150 mg (trazodone)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance cpr sécable en 3 (non écrasable!)

TRULICITY stylo (dulaglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance 1x/sem!
TRUSOPT 2% collyre flac 5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ULTIBRO BREEZHALER 110mcg/50mcg (eo 30)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
UROCIT cpr 10 mEq (potassium citrate)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
UROREC 4 mg (silodosine)	TAMSULOSINE cpr retard 0,4 mg (tamsulosine) *	*NB:* silodosine 4 mg s'utilise en cas de GFR 30-50 mL/min. La tamsulosine ne s'adapte pas lors d'IR. * Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
UROREC 8 mg (silodosine)	TAMSULOSINE cpr retard 0,4 mg (tamsulosine) *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
URSOCHOL cpr (ac. ursodéoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
URSOFALK cpr, cps, susp (ac. ursodésoxycholique)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Vagifem® cpr vag (estradiol)	poursuivre	Utiliser de préférence le médicament personnel de la patiente ou commander le médicament à la PIC avec une ordonnance HL. Pensez à la thromboprophylaxie (score de Padoue) et évaluez l'utilité du ttt.
VALDOXAN 25 mg (agomélatine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance Ce traitement nécessite un suivi de la fonction hépatique. Vérifier les interactions médicamenteuses, en particulier avec les inhibiteurs du CYP1A2 (ciprofloxacine, fluvoxamine, propranolol, …)
Valtrex cpr 500 mg	Valaciclovir cpr 500 mg	Générique
VALVERDE DETENTE NERVEUSE (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	RELAXANE (pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)	
Valverde sommeil® (valériane, houblon)	Redormin® cpr 500 mg (valériane + houblon)	1h avant le coucher
Vancocin amp 1 g	Vancomycine amp 1 g	Générique
VANNAIR 100/6 aéros doseur	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VASCORD 20/ 5 mg (olmesartan / amlodipine)	IRBESARTAN 150 mg + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 20/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/5/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/5/25 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VASCORD HCT 40/10/12,5 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	CO-IRBESARTAN 150 / 12,5 mg (irbesartan / hydrochlorothiazide) + AMLODIPINE 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VASCORD HCT 40/10/25 mg (olmesartan / amlodipine / hydrochlorothiazide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Venlafaxine ER cps 150 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
Venlafaxine ER cps 37,5 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
Venlafaxine ER cps 75 mg	poursuivre	Générique HL, commander sans ordonnance
VENORUTON (oxérutine)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
VENTOLIN DISKUS multidos pdr inhal 200mcg 60dos	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VENTOLIN sirop 2mg/5ml s sucre 150ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VESICARE cpr 5 mg (solifénacine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j ou poursuivre : SOLFENACINE cpr 5 mg	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou : Générique HL, rédiger une ordonnance
VESICARE cpr 10 mg (solifénacine)	SPASMO-URGENINE NEO 20 mg (trospium) 2x/j ou poursuivre : SOLFENACINE cpr 10 mg	Avantage: ne passe pas la barrière hémato-encéphalique; à prendre en dehors de repas ou : Générique HL, rédiger une ordonnance
Vfend cpr 200 mg	Voriconazol cpr 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Vfend inj 200 mg	Voriconazol inj 200 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Vibrocil® (phényléphrine)	Nasivine pur® (oxymétazoline)	
VIFEROL amp buv 100'000 UI (cholécalciférol)	1/3 amp VITAMINE D3 Streuli 300'000 UI (cholécalciférol)	Rédiger une ordonnance HL L'amp de Vitamine D3 Streuli peut être bue. Il est à noter que certaines études ont montré que l'administration d'une dose mensuelle de vitamine D3 supérieure à 60'000 UI a été associée à un risque de chutes augmenté chez les patients âgés (Cantista et al, 2021).
VIMOVO 500 /20 mg (naproxène / esoméprazole) 2x/j	NAPROXENE 500 mg 2x/j + PANTOPRAZOL* 40 mg 1x/j	Le naproxène (≤ 1000 mg/j) et l'ibuprofène (≤ 1200 mg/j) sont considérés comme les AINS ayant le meilleur profil de sécurité cardiovasculaire et thrombotique. Pour plus d'information, consulter le document « Le DoloPIC : Quelques points à connaître au sujet des antalgiques » disponible sur pharmpic.ch * si co-prescription d'immunosuppresseur (p.ex. mycophénolate, tacrolimus) ou autre interaction médicamenteuse significative (ex. azoles), poursuivre IPP habituel du patient.
VIMPAT cpr 50 mg	LACOSAMID cpr 50 mg	Générique
VIMPAT cpr 100 mg	LACOSAMID cpr 100 mg	Générique

VIMPAT cpr 150 mg	LACOSAMID cpr 150 mg	Générique
VIMPAT sirop 10 mg/mL	LACOSAMID sirop 10 mg/mL	Générique HL, commander avec ordonnance
VISCOTEARS gel opht 10 g	LACRINORM gel opht 10 g	Viscosité haute
VISCOTEARS SDU gel opht 0,6 g	LACRINORM F UD gtt opht unidos 0,6 mL	Viscosité haute
VISMED LIGHT gtt opht fl gtt 15 mL	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VISTAGAN LIQUIFILM collyre unidose 0.5	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Vitalux plus®	Suspendre le traitement durant l'hospitalisation	Au besoin, remplacer par des vitamines de la liste (Supradyn energy®, Becozyme forte®, …)
VITAMINE D3 Streuli sol inj 300'000 UI (cholécalciférol)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL L'amp de Vitamine D3 Streuli peut être bue. Il est à noter que certaines études ont montré que l'administration d'une dose mensuelle de vitamine D3 supérieure à 60'000 UI a été associée à un risque de chutes augmenté chez les patients âgés (Cantista et al, 2021).
VOKANAMET cpr (canagliflozine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
VOLTARENE drg 25 mg	OLFEN cpr 25 mg	Générique
VOLTARENE drg 50 mg	OLFEN cpr 50 mg	Générique
VOLTARENE Emulgel 1%	OLFEN gel 1%	Générique
VOLTARENE RETARD cpr (diclofenac)	OLFEN cpr 25 ou 50 mg (diclofenac)	Générique Adapter la répartition quotidienne de diclofénac avec les cpr à libération immédiate
VOTUM 10 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VOTUM 20 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
VOTUM 40 mg (olmesartan)	IRBESARTAN 150 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
WELLBUTRIN XR cpr (bupropion)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
XALACOM collyre flacon 2,5ml	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
Xalatan collyre 50 mcg/mL	Latanoprost collyre 50 mcg/mL	Générique HL, commander sans ordonnance Attention: 1x/j!
XANAX RETARD cpr ret 0,5 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 1 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 2 mg (alprazolam)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XANAX RETARD cpr ret 3 mg (alprazolam)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL
XATRAL UNO cpr ret 10 mg (alfuzosine)	TAMSULOSINE cpr ret 0,4 mg (tamsulosine) *	* Si une administration par SNG nécessaire, remplacer par Xatral cpr 2,5mg 2-3x/j qui peut être écrasé. Rédiger une ordonnance HL
XARELTO cpr (rivaroxaban)	RIVAROXABAN cpr	Générique
XARELTO VASCULAR cpr 2,5 mg (rivaroxaban)	RIVAROXABAN VASC cpr 2,5 mg	Générique
XELODA 150 mg (capecitabine)	CAPECITABINE 150 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
XELODA 500 mg (capecitabine)	CAPECITABINE 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
XENICAL (orlistat)	suspendre le traitement durant l'hospiatlisation	
XIGDUO XR cpr (dapagliflozine / metformine)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XULTOPHY stylo (insuline degludec / liraglutide)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
XYZAL 5 mg (levocétirizine)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
YELLOX collyre 0,9 mg/mL (bromfenac)	poursuivre	HL, commander sans ordonnance
ZADITEN 1 mg (kétotifène)	CETIRIZINE cpr 10 mg ou CETALLERG® gtte 10 mg/mL (cétirizine)	
ZADITEN collyre 0,25 mg/mL (kétotifène)	LIVOSTIN collyre 0,5mg/mL (lévocabastine)	
ZALDIAR 37,5 / 325 mg (tramadol / paracétamol)	TRAMADOL gttes 37,5 mg (tramadol) + DAFALGAN 500 mg (paracétamol)	Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
ZANIDIP 10 mg (lercanidipine)	AMLODIPINE 5 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ZANIPRESS 10/10 mg (lercanidipine / enalapril)	AMLODIPINE 5 mg + LISINOPRIL 10 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
ZANIPRESS 10/20 mg (lercanidipine / enalapril)	AMLODIPINE 5 mg + LISINOPRIL 20 mg	Suivre la TA et adapter le traitement si nécessaire !
Zinacef inj 1500 mg	Cefuroxime inj 1500 mg	Générique
Zinacef inj 750 mg	Cefuroxime inj 750 mg	Générique
Zinat cpr 250 mg	Cefuroxime cpr 250 mg	Générique
Zinat cpr 500 mg	Cefuroxime cpr 500 mg	Générique
Zithromax cpr 250 mg	Azithromycine cpr 250 mg	Générique
Zithromax cpr 500 mg	Azithromycine cpr 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Zithromax susp 200 mg/5 mL	Azithromycine susp 200 mg/5 mL	Générique
Zofran cpr orodisp 4 mg	Ondansetron cpr orodisp 4 mg	Générique
Zofran cpr orodisp 8 mg	Ondansetron cpr orodisp 8 mg	Générique
Zofran inj 4 mg/2 mL	Ondansetron inj 4 mg/2 mL	Générique
Zofran inj 8 mg/4 mL	Ondansetron inj 8 mg/4 mL	Générique
ZOLDORM cpr 10 mg (zolpidem)	ZOLPIDEM cpr 10 mg	Générique à 65 ans et plus: zolpidem 5 mg/j !
Zoloft cpr 50 mg	Sertraline cpr 50 mg	Générique
Zometa amp 4 mg/5 mL	Zoledronat amp 4 mg/5 mL	Générique
ZOMIG 2,5 ou 5 mg (zolmitriptan)	ALMOGRAN 12,5 mg (almotriptan)	Risque de syndrome sérotoninergique par les triptans: vérifier les interactions avec les médicaments du patient!

ZOVIRAX amp 250 mg (aciclovir)	ACICLOVIR amp 250 mg	Générique
ZOVIRAX cpr (aciclovir)	VALACICLOVIR cpr (valaciclovir)	Traitement de l'herpes et du zona: le valaciclovir a l'avantage d'être pris 2-3x/j contrairement à l'aciclovir qui doit être pris 4-5x/j Adapter la posologie à la fonction rénale dans les 2 cas!
ZOVIRAX Lip crème 2 g (aciclovir)	AVIRAL crème 2 g (aciclovir)	Générique
ZOVIRAX 30 mg/g pommade opht. (aciclovir)	VIRUPOS 30 mg/g pommade opht. (aciclovir)	Zovirax® pommade opht. hors commerce
ZYBAN cpr ret 150 mg (bupropion)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions médicamenteuses (inhibiteur CYP2D6) Adaptation posologique à la fonction rénale
Zyloric cpr 100 mg	Allopurinol cpr 100 mg	Générique
Zyloric cpr 300 mg	Allopurinol cpr 300 mg	Générique
ZYPREXA cpr 2,5 , 5 ou 10 mg (olanzapine)	OLANZAPINE cpr 2,5 , 5 ou 10 mg	Générique
ZYPREXA cpr 15 mg (olanzapine)	OLANZAPINE cpr 15 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
ZYPREXA VELOTAB cpr orodisp 5 ou 10 mg (olanzapine)	OLANZAPINE ORO cpr orodisp 5 ou 10 mg	Générique
ZYPREXA VELOTAB cpr orodisp 15 ou 20 mg (olanzapine)	OLANZAPINE ORO cpr orodisp 15 ou 20 mg	Générique HL, commander avec ordonnance
Zyrtec cpr 10 mg	Cétirizine cpr 10 mg	Générique
Zyrtec gttes 10 mg/mL	Cetallerg gttes 10 mg/mL	Générique
Zytiga cpr 500 mg	Abiratérone cpr 500 mg	Générique HL, commander avec ordonnance Vérifier la présence d'une coprescription de prednisone!
ZYVOXID (linezolide)	poursuivre	Rédiger une ordonnance HL Vérifier les interactions avec les médicaments du patient (p.ex. risque de syndrome sérotoninergique)

Abréviations

amp ampoule; conc perf concentré pour perfusion; cpr comprimé; cps capsule; disp dispersible; drg dragée; flac flacon; gran granulé; gtt opht gouttes opthalmiques; **HL hors liste**; inj injectable; mat matriciel; orodisp orodispersible; pdr poudre; PEG gastrostomie percutanée; PIC Pharmacie Interhospitalière de la

Références

Adrion C, C. S. (2015, novembre 2). Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere's disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial (BEMED trial). BMJ, pp. 1-16. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.h6816
Alessandro Di Minno, B. F. (2017). Old and new oral anticoagulants: Food, herbal medicines and drug interactions. Blood Reviews, 31(4), 193-203. Récupéré sur https://doi.org/10.1016/j.blre.2017.02.001.
Antje Lechleiter, P. S. (2019, novembre 20). Hémorroïdes – où en sommes nous aujourd'hui ? Forum médical suisse, 47-48, pp. 766–774. Récupéré sur https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2019.08359
Aubry-Rozier, B. (2012, mars 14). Place des antiarthrosiques symptomatiques d'action lente dans l'arthrose (sulfate de chondroïtine, glucosamine, acide hyaluronique). Revue médicale suisse, pp. 571-576.
European Medicines Agency. (2018). Opinion of the HMPC on a European Union herbal monograph on Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma. European Medicines Agency. Récupéré sur https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-opinion/final-opinion-hmpc-european-union-herbal-monograph-cimicifuga-
Gerhardt, F. B. (2019). Iberogast-Induced Acute Liver Failure-Reexposure and In Vitro Assay Support Causality. American Journal of Gastroenterology, 114, 1358-1359. Récupéré sur https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000300
Murdin L, H. K. (2016, juin 21). Betahistine for symptoms of vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews , 6(4). doi:https://doi.org//10.1002/14651858.CD010696.pub2
Palmer. (2017). Lidocaine Patches Are No Better Than Placebo for Somatic Back Pain. American family physician, 96(10).
https://www.praxis-suchtmedizin.ch, Tableau d'équivalence des benzodiazépines, 2021, consulté le 24.1.2023
Saez-Gonzalez, E. C.-J. (2016). Iberogast-Induced Severe Hepatotoxicity Leading to Liver Transplantation. American Journal of Gastroenterology, 111, 1364-1365. Récupéré sur https://doi.org/10.1038/ajg.2016.260
Stoffel, N. U. (2017, octobre 9). 1.Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. The Lancet Haematology, 4(11), pp. 524 - 533. Récupéré sur
Swissmedic. (2020). Information sur le médicament. Récupéré sur Swissmedicinfo: https://www.swissmedicinfo.ch/
Tacklind J, M. R. (2012). Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews (Issue 12.). doi:10.1002/14651858.CD001423.pub3
Wegner I, H. D. (2018). Betahistine for tinnitus Issue 12. Art. No.: CD013093. DOI: 10.1002/14651858.CD013093.pub2. Cochrane Database of Systematic Reviews, 12.