








Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

MÉMO produits topiques cutanés utilisés sur les sites C de l'EHC





- ✓ Hormis pour l'effleurage, appliquer avec des gants.
- ✓ Pour la conservation après ouverture, consulter <http://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Conservation-medicaments.html>).
En règle générale, les tubes se conservent 1 an après ouverture et les pots 3 mois.
- ✓ Attention à la nécessité d'un ordre médical pour la plupart des produits ci-dessous.

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	Hydrocortisone crème 2,5% (PM) <i>(remplace Alfacortone crème)</i>	OUI	Corticoïde de puissance faible (hydrocortisone)	Dermatoses non infectées inflammatoires ou allergiques (eczéma), piqûres d'insectes, coups de soleil	L	Oui
	AVIRAL crème	OUI	Antiviral (acyclovir)	Herpès 5x/j pendant 4-10 j	L	Non
	ANTIDRY lotion	NON	Acide lactique + huile d'amandes	Hydratation de la peau Selon besoin plusieurs x/j A UTILISER EN 1^{ère} intention, Si non efficace passer à l'excipient en 2^{ème} intention	L	Oui (avec limitation : 2 grands emballages ou 3 petits par trimestre) ! si consommation + importante → à la charge du résident)






Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	ANTIDRY-CALM lotion	NON	Acide lactique + huile d'amandes + polidocanol	Hydratation de la peau + antiprurigineux (démangeaisons) Selon besoin plusieurs x/j durant max 3 semaines	L	Oui (avec limitation : 2 grands emballages ou 3 petits par trimestre) ! si consommation + importante → à la charge du résident)
	BETADINE Pommade	NON	Povidone iodée	Désinfectant Appliquer selon besoins En 1^{ère} intention d'une nécrose sèche	HL	oui
	BETNOVATE crème et onguent	OUI	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétamétasone)	Dermatoses inflammatoires non infectées (eczéma)	L	Oui
	CAVILON spray et bâtonnets applicateurs	NON	Hydroxymethylsiloxane	Protecteur cutané (protège la peau de la macération)	L	Non







Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	COLD-CREME KA refrigerans ⚠️ FRIGO	OUI	Huile d'arachide + huile de ricin + cire blanche ⚠️ Préparation de la PIC si ajout de polydocanol ou acide salicylique. Remplir formulaire PIC pour la commande : https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Fabrication/Formulaire-PM-EMS.pdf	Prurit généralisé : à utiliser en base + ajout polydocanol ou acide salicylique	L	Oui
	COMFEEL crème protectrice (« crème-barrière »)	NON	Silicone + glycérol	Crème protectrice (urines et selles) et hydratante Remplacer par Cavilon en cas de macération	L	Non
	DEXERYL crème	NON	Glycerol, Vaseline, Paraffine	Hydratation de la peau dans certaines dermatoses (de type démangeaisons) 2 fois/j	HL	Oui (avec limitation : 2 conditionnements de 250g par trimestre ! si consommation + importante → à la charge du résident)
	DIPROGENTA crème et pommade	OUI	Antibiotique (gentamicine) + corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone)	Dermatoses inflammatoires avec infection bactérienne	L	Oui





Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	DIPROSALIC pommade	OUI si 1 ^{er} diagnostic / pas d'OM si contexte de poussée connue	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone) + acide salicylique)	Psoriasis, dermatite séborrhéique	L	Oui
	EXCIPIAL LIPOLOTION	NON	Lipides + urée	Hydratation de la peau 2-3 fois/j A utiliser en 2^{ème} intention après Antidry lotion	L	Oui
	FLAMMAZINE crème	NON	Argent ⚠ <i>ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement</i>	Brûlures et infections superficielles (Dermabrasion)	L	Oui
	HIRUDOID crème ou gel	NON	Héparine	Hématomes 2-3 fois/j	L	Oui
	IALUGEN crème	NON	Acide hyaluronique	Cicatrisation 2-3 fois/j	HL	Oui

Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	IALUGEN PLUS crème	NON	Argent + acide hyaluronique ⚠ ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement	Brûlures et infections superficielles (Dermabrasion)	HL	Oui
	ICHTHOLAN 10% pommade	NON	Ammonium sulfobituminate (ichtyol)	Inflammations cutanées, maturation de furoncles 1x/j	L	Non
	IMAZOL pâte	OUI si 1 ^{er} diagnostic / pas d'OM si contexte connu	Antifongique (clotrimazole)	Mycoses (bonne adhérence sur les mycoses humides) Durée de traitement : minimum 15 jours	L	Oui
	NIZORAL crème	OUI	Antifongique (kétoconazole)	Mycose, dermatite séborrhéique Durée de traitement : minimum 15 jours	L	Oui
	OLFEN gel	NON	Anti-inflammatoire (diclofénac)	Douleurs, inflammations des muscles et articulations, rhumatismes 3-4x/j	L	Oui
	PANTOTHEN pommade	NON	Dexpanthénol	Peau sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation (souvent utilisé sur les lésions « croûteuses » et les plaies fermées) 1 à plusieurs x/j	L	Oui (avec limitation : 3 tubes de 100 g par trimestre ! si consommation + importante → à la charge du résident)

Rédacteur	N- Marcoz, Nicole Gabioud	PIC-DPC52bis Version 0.1 Date 11.2020
Vérificateur	Pôle Plaies, V. Meunier	
Approbateur	N. Schaad, T. Bizzozzero	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Prescription médicale</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	PEVARYL crème/ spray / poudre	OUI	Antifongique (éconazole)	Mycose Si humidité, utiliser la poudre 1-2 x/j	L	Oui
	PEVISONNE crème	OUI	Antifongique (éconazole) + corticoïde de puissance modérée (triamcinolone)	Dermatoses inflammatoires avec infection fongique	L	Oui
	UNGUENTOLAN onguent	OUI	Huile de foie de morue + rétinol	Graisse la peau très sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation	L	Non
	VASELINE SALICYLÉE 5 ou 10% (PM)	OUI	Vaseline + acide salicylique ⚠ <i>Préparation de la PIC : remplir formulaire PIC pour la commande :</i> https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Fabrication/Formulaire-PM-EMS.pdf	Hyperkératoses (épaississement de la peau) Exemple de l'hyperkératose des pieds diabétiques	L	Oui

Références :

www.listedesspecialites.ch

www.swissmedicinfo.ch

<https://pharmavista.ch>

<https://pharmpic.ch>