



















MÉMO produits topiques cutanés












- ✓ Hormis pour l'effleurage, appliquer avec des gants.
- ✓ Pour la conservation après ouverture, consulter <http://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Conservation-medicaments.html>).
En règle générale, les tubes se conservent 1 an après ouverture et les pots 3 mois.
- ✓ Attention à la nécessité d'un ordre médical pour la plupart des produits ci-dessous.








<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste (L) / hors-liste (HL)</u>
	ALFACORTONE crème	Corticoïde de puissance faible (hydrocortisone)	Dermatoses non infectées inflammatoires ou allergiques, piqûres d'insectes, coups de soleil	L
	ALPENFLOR gel	Arnica	Piqûres d'insectes, contusions, jambes lourdes Plusieurs fois/j en couche mince	L
	AVIRAL crème	Antiviral (acyclovir)	Herpès 5×/j pendant 4-10 j	L
	ANTIDRY lotion	Acide lactique + huile d'amandes	Hydratation de la peau Selon besoin plusieurs ×/j	L

Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud	PIC-DPC52 Version 0.2 Date 04.2019
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

	ANTIDRY-CALM lotion	Acide lactique + huile d'amandes + polidocanol	Hydratation de la peau + antiprurigineux Selon besoin plusieurs x/j durant max 3 semaines	L
	BEPANTHENE PLUS crème	Dexpanthénol + chlorhexidine	Cicatrisant et désinfectant 1 à plusieurs x/j	HL
	BETNOVATE crème et onguent	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétamétasone)	Dermatoses inflammatoires non infectées	L
	BRAUNOVIDON 10% pommade	Polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)	Désinfectant Appliquer selon besoins	L
	CAVILON spray et bâtonnets applicateurs	Hydroxymethylsiloxane	Protecteur cutané (protège la peau de la macération)	L
	COLD-CREME KA ⚠️ FRIGO	Huile d'arachide + huile de ricin + cire blanche ⚠️ Préparation de la PIC	Hydratation de la peau + effet froid Selon besoin plusieurs x/j	L

	COMFEEL crème protectrice (« crème-barrière »)	Silicone + glycérol	Crème protectrice (urines et selles) et hydratante Remplacer par Cavilon en cas de macération	L
	DIPROGENTA crème et pommade	Antibiotique (gentamicine) + corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone)	Dermatoses inflammatoires avec infection bactérienne	L
	DIPROSALIC pommade	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone) + acide salicylique	Psoriasis, dermatite séborrhéique	L
	EXCIPIAL LIPOLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L
	EXCIPIAL HYDROLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau (moins gras qu'Excipial Lipolotion) 2-3 fois/j	HL
	EXCIPIAL crème	Lipides	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L
	FLAMMAZINE crème	Argent ⚠ ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement	Brûlures et infections superficielles	L
	FORTALIS pommade	Acide salicylique + salicylate de méthyle + camphre + acide formique + ol. spicae	Douleurs musculaires et articulaires	L

	HIRUDOID crème ou gel	Héparine	Hématomes 2-3 fois/j	L
	IALUGEN crème	Acide hyaluronique	Cicatrisation 2-3 fois/j	HL
	IALUGEN PLUS crème	Argent + acide hyaluronique ⚠ ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement	Brûlures et infections superficielles	HL
	ICHTHOLAN 10% pommade	Ammonium sulfobituminate (ichtyol)	Inflammations cutanées, maturation de furoncles 1x/j	L
	IMAZOL pâte	Antifongique (clotrimazole)	Mycoses (bonne adhérence sur les mycoses humides)	L
	NIZORAL crème	Antifongique (kétoconazole)	Mycose, dermatite séborrhéique	L
	OLFEN gel	Anti-inflammatoire (diclofénac)	Douleurs, inflammations des muscles et articulations, rhumatismes 3-4x/j	L
	OXYPLASTINE pâte	Oxyde de zinc + cire blanche + essences	Protection de la peau contre l'humidité 1 à plusieurs x/j	L
	PANTOTHEN pommade	Dexpanthénol	Peau sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation (souvent utilisé sur les lésions « croûteuses » et les plaies fermées) 1 à plusieurs x/j	L
	PEVARYL crème, poudre ou spray	Antifongique (éconazole)	Mycose Si humidité, utiliser la poudre 1-2 x/j	L
	PEVISONNE crème	Antifongique (éconazole) + corticoïde de puissance modérée (triamcinolone)	Dermatoses inflammatoires avec infection fongique	L

	PURELAN 100	Lanoline	Soins de la poitrine et des mamelons	L
	SPORTUSAL gel et emgel	Salicylate d'hydroxyéthyle + héparine + DMSO	Douleurs musculaires et articulaires, contusions 1 à plusieurs x/j	L
 	STOMAHESIVE pâte 30 g	⚠ <i>Utiliser le tube de 30g (Eviter le tube de 60g qui contient de l'alcool !)</i>	Pâte protectrice pour appareillage des stomies parfois utilisée pour escarres si Cavilon insuffisant	HL
	UNGUENTOLAN ointment	Huile de foie de morue + rétinol	Graisse la peau très sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation	L
	VASELINE	<i>Avantage : pas d'allergies !</i>	Graisse la peau	L
	VASELINE SALICYLÉE 5 ou 10%	Vaseline + acide salicylique ⚠ <i>Préparation de la PIC</i>	Hyperkératoses (épaississement de la peau)	L