










Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

MÉMO produits topiques cutanés







- ✓ Hormis pour l'effleurage, appliquer avec des gants.
- ✓ Pour la conservation après ouverture, consulter <http://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Conservation-medicaments.html>.
En règle générale, les tubes se conservent 1 an après ouverture et les pots 3 mois.
- ✓ Attention à la nécessité d'un ordre médical pour la plupart des produits ci-dessous.
- ✓

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	Hydrocortisone crème 2,5% (PM) <i>(remplace Alfacortone crème)</i>	Corticoïde de puissance faible (hydrocortisone)	Dermatoses non infectées inflammatoires ou allergiques, piqûres d'insectes, coups de soleil	L	Oui
	ALPENAFLO gel	Arnica	Piqûres d'insectes, contusions, jambes lourdes Plusieurs fois/j en couche mince	L	Non
	AVIRAL crème	Antiviral (acyclovir)	Herpès 5x/j pendant 4-10 j	L	Non
	ANTIDRY lotion	Acide lactique + huile d'amandes	Hydratation de la peau Selon besoin plusieurs x/j	L	Oui (avec limitation)







Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	ANTIDRY-CALM lotion	Acide lactique + huile d'amandes + polidocanol	Hydratation de la peau + antiprurigineux Selon besoin plusieurs x/j durant max 3 semaines	L	Oui (avec limitation)
	BEPANTHENE PLUS crème	Dexpanthénol + chlorhexidine	Cicatrisant et désinfectant 1 à plusieurs x/j	HL	Non
	BETADINE pommade	Povidone iodée	Désinfectant Appliquer selon besoins	HL	oui
	BETNOVATE crème et onguent	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétamétasone)	Dermatoses inflammatoires non infectées	L	Oui
	BRAUNOVIDON 10% pommade	Polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)	Désinfectant Appliquer selon besoins	L	Non











Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	CAVILON spray et bâtonnets applicateurs	Hydroxymethylsiloxane	Protecteur cutané (protège la peau de la macération)	L	Non
	COLD-CREME KA ⚠️ FRIGO	Huile d'arachide + huile de ricin + cire blanche ⚠️ <i>Préparation de la PIC</i>	Hydratation de la peau + effet froid Selon besoin plusieurs x/j	L	Oui
	COMFEEL crème protectrice (« crème-barrière »)	Silicone + glycérol	Crème protectrice (urines et selles) et hydratante Remplacer par Cavilon en cas de macération	L	Non
	DEXERYL crème	Glycerol, Vaseline, Paraffine	Hydratation de la peau dans certaines dermatoses 2 fois/j	HL	Oui (avec limitation)
	DIPROGENTA crème et pommade	Antibiotique (gentamicine) + corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone)	Dermatoses inflammatoires avec infection bactérienne	L	Oui
	DIPROSALIC pommade	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone) + acide salicylique)	Psoriasis, dermatite séborrhéique	L	Oui







Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	EXCIPIAL LIPOLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L	Oui
	EXCIPIAL HYDROLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau (moins gras qu'Excipial Lipolotion) 2-3 fois/j	HL	Oui
	EXCIPIAL crème grasse	Lipides, Paraffine, huile de ricin, cire d'abeille, polysorbate 20, triclosan,	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L	Oui
	FLAMMAZINE crème	Argent ⚠ <i>ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement</i>	Brûlures et infections superficielles	L	Oui
	FORTALIS pommade	Acide salicylique + salicylate de méthyle + camphre + acide formique + ol. spicae	Douleurs musculaires et articulaires	L	Non
	HIRUDOID crème ou gel	Héparine	Hématomes 2-3 fois/j	L	Oui

Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	IALUGEN crème	Acide hyaluronique	Cicatrisation 2-3 fois/j	HL	Oui
	IALUGEN PLUS crème	Argent + acide hyaluronique ⚠ ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement	Brûlures et infections superficielles	HL	Oui
	ICHTHOLAN 10% pommade	Ammonium sulfobutimate (ichtyol)	Inflammations cutanées, maturation de furoncles 1x/j	L	Non
	IMAZOL pâte	Antifongique (clotrimazole)	Mycoses (bonne adhérence sur les mycoses humides)	L	Oui
	NIZORAL crème	Antifongique (kétoconazole)	Mycose, dermatite séborrhéique	L	Oui
	OLFEN gel	Anti-inflammatoire (diclofénac)	Douleurs, inflammations des muscles et articulations, rhumatismes 3-4x/j	L	Oui
	OXYPLASTINE pâte	Oxyde de zinc + cire blanche + essences	Protection de la peau contre l'humidité 1 à plusieurs x/j	L	Non
	PANTOTHEN pommade	Dexpanthénol	Peau sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation (souvent utilisé sur les lésions « croûteuses » et les plaies fermées) 1 à plusieurs x/j	L	Oui (avec limitation)
	PEVARYL crème, poudre ou spray	Antifongique (éconazole)	Mycose Si humidité, utiliser la poudre 1-2 x/j	L	Oui
	PEVISONNE crème	Antifongique (éconazole) + corticoïde de puissance modérée (triamcinolone)	Dermatoses inflammatoires avec infection fongique	L	Oui

Rédacteur	C. Grandjean, Nicole Gabioud, N. Marcoz	PIC-DPC52 Version 0.4 Date 02.2022
Vérificateur	Pôle Plaies	
Approbateur	N. Schaad	

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste PIC (L) / hors-liste (HL)</u>	<u>Remboursé par l'assurance de base ?</u>
	PURELAN 100	Lanoline	Soins de la poitrine et des mamelons	L	Non
	SPORTUSAL gel et emgel	Salicylate d'hydroxyéthyle + héparine + DMSO	Douleurs musculaires et articulaires, contusions 1 à plusieurs x/j	L	Oui
	STOMAHESIVE pâte 30 g	⚠ <i>Utiliser le tube de 30g (Eviter le tube de 60g qui contient de l'alcool !)</i>	Pâte protectrice pour appareillage des stomies parfois utilisée pour escarres si Cavilon insuffisant	HL	Non
	UNGUENTOLAN onguent	Huile de foie de morue + rétinol	Graisse la peau très sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation	L	Non
	VASELINE	<i>Avantage : pas d'allergies !</i>	Graisse la peau	L	Non
	VASELINE SALICYLÉE 5 ou 10% (PM)	Vaseline + acide salicylique ⚠ <i>Préparation de la PIC</i>	Hyperkératoses (épaississement de la peau)	L	Oui