











Rédacteur	C. Grandjean Nicole Gabioud	PIC-DPC 52 Version 0.1 Date 03.2017
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

MEMO produits topiques cutanés









- ✓ Hormis pour l'effleurage, appliquer avec des gants.
- ✓ Pour la conservation après ouverture, consulter <http://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Conservation-medicaments.html>.
En règle générale, les tubes se conservent 1 an après ouverture et les pots 3 mois.
- ✓ Attention à la nécessité d'un ordre médical pour la plupart des produits ci-dessous.

<u>Image</u>	<u>Nom</u>	<u>Composés principaux</u>	<u>Indications (non exhaustif)</u>	<u>En liste (L) / hors-liste (HL)</u>
	ALFACORTONE crème	Corticoïde de puissance faible (hydrocortisone)	Dermatoses non infectées inflammatoires ou allergiques, piqûres d'insectes, coups de soleil	L
	ALPENAFLO gel	Arnica	Piqûres d'insectes, contusions, jambes lourdes Plusieurs fois/j en couche mince	L
	AVIRAL crème	Antiviral (acyclovir)	Herpès 5×/j pendant 4-10 j	L
	ANTIDRY lotion	Acide lactique + huile d'amandes	Hydratation de la peau Selon besoin plusieurs ×/j	L













Rédacteur	C. Grandjean Nicole Gabioud	PIC-DPC 52 Version 0.1 Date 03.2017
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

	ANTIDRY-CALM lotion	Acide lactique + huile d'amandes + polidocanol	Hydratation de la peau + antiprurigineux Selon besoin plusieurs x/j durant max 3 semaines	L
	BEPANTHENE PLUS crème	Dexpanthénol + chlorhexidine	Cicatrisant et désinfectant 1 à plusieurs x/j	HL
	BETNOVATE crème et onguent	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétamétasone)	Dermatoses inflammatoires non infectées	L
	BRAUNOVIDON 10% pommade	Polyvinylpyrrolidone-iode (PVP-iode)	Désinfectant Appliquer selon besoins	L
	CAVILON spray et bâtonnets applicateurs	Hydroxymethylsiloxane	Protecteur cutané (protège la peau de la macération)	L
	COLD-CREME KA ⚠️ FRIGO	Huile d'arachide + huile de ricin + cire blanche ⚠️ Préparation de la PIC	Hydratation de la peau + effet froid Selon besoin plusieurs x/j	L







Rédacteur	C. Grandjean Nicole Gabioud	PIC-DPC 52 Version 0.1 Date 03.2017
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

	COMFEEL crème protectrice (« crème-barrière »)	Silicone + glycérol	Crème protectrice (urines et selles) et hydratante Remplacer par Cavilon en cas de macération	L
	DIPROGENTA crème et pommade	Antibiotique (gentamicine) + corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone)	Dermatoses inflammatoires avec infection bactérienne	L
	DIPROSALIC pommade	Corticoïde de puissance intermédiaire (bétaméthasone) + acide salicylique	Psoriasis, dermatite séborrhéique	L
	EXCIPIAL LIPOLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L
	EXCIPIAL HYDROLOTION	Lipides + urée	Hydratation de la peau (moins gras qu'Excipial Lipolotion) 2-3 fois/j	HL
	EXCIPIAL crème	Lipides	Hydratation de la peau 2-3 fois/j	L
	FLAMMAZINE crème	Argent ⚠ <i>ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement</i>	Brûlures et infections superficielles	L
	FORTALIS pommade	Acide salicylique + salicylate de méthyle + camphre + acide formique + ol. spicae	Douleurs musculaires et articulaires	L

Rédacteur	C. Grandjean Nicole Gabioud	PIC-DPC 52 Version 0.1 Date 03.2017
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

	HEMERAN crème ou gel	Héparine	Hématomes 2-3 fois/j	L
	IALUGEN crème	Acide hyaluronique	Cicatrisation 2-3 fois/j	HL
	IALUGEN PLUS crème	Argent + acide hyaluronique ⚠ ne pas exposer à la lumière du jour → couvrir avec un pansement	Brûlures et infections superficielles	HL
	ICHTHOLAN 10% pommade	Ammonium sulfobituminate (ichtyol)	Inflammations cutanées, maturation de furoncles 1x/j	L
	IMAZOL pâte	Antifongique (clotrimazole)	Mycoses (bonne adhérence sur les mycoses humides)	L
	NIZORAL crème	Antifongique (kétoconazole)	Mycose, dermatite séborrhéique	L
	OLFEN gel	Anti-inflammatoire (diclofénac)	Douleurs, inflammations des muscles et articulations, rhumatismes 3-4x/j	L
	OXYPLASTINE pâte	Oxyde de zinc + cire blanche + essences	Protection de la peau contre l'humidité 1 à plusieurs x/j	L
	PANTOTHEN pommade	Dexpanthénol	Peau sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation (souvent utilisé sur les lésions « croûteuses » et les plaies fermées) 1 à plusieurs x/j	L
	PEVARYL crème, poudre ou spray	Antifongique (éconazole)	Mycose Si humidité, utiliser la poudre 1-2 x/j	L
	PEVISONE crème	Antifongique (éconazole) + corticoïde de puissance modérée (triamcinolone)	Dermatoses inflammatoires avec infection fongique	L
	PURELAN 100	Lanoline	Soins de la poitrine et des mamelons	L

Rédacteur	C. Grandjean Nicole Gabioud	PIC-DPC 52 Version 0.1 Date 03.2017
Vérificateur	P. Currat	
Approbateur	N. Schaad	

	SPORTUSAL gel et emgel	Salicylate d'hydroxyéthyle + héparine + DMSO	Douleurs musculaires et articulaires, contusions 1 à plusieurs x/j	L
 	STOMAHESIVE pâte 30 g	⚠ Utiliser le tube de 30g (Eviter le tube de 60g qui contient de l'alcool !)	Pâte protectrice pour appareillage des stomies parfois utilisée pour escarres si Cavilon insuffisant	HL
	UNGUENTOLAN onguent	Huile de foie de morue + rétinol	Graisse la peau très sèche et rugueuse, favorise la cicatrisation	L
	VASELINE	Avantage : pas d'allergies !	Graisse la peau	L
	VASELINE SALICYLÉE 5 ou 10%	Vaseline + acide salicylique ⚠ Préparation de la PIC	Hyperkératoses (épaississement de la peau)	L

Source image : photo PIC