Pharmacie Interhospitalière de la Côte

CATALOGUE D' ETIQUETTES

d'identification des médicaments en seringues, perfusions et gobelets

Table des matières

1. Généralités 2
   1.1. Etiquettes pour injectables 2
   1.2. Code couleur des étiquettes des médicaments injectables 4
   1.3. Autres étiquettes 5
2. Catalogue 6
   2.1. Etiquettes pour médicaments injectables 6
   2.2. Etiquettes diverses (hors Praxikett®) 32
   2.3. Etiquettes *per os* pour gobelets (hors Praxikett®) 34
   2.4. Etiquettes pour l'oncologie/hématologie 36
   2.5. Etiquettes en rouleaux (Anesthésie) 40

Version 5-0, 25.09.2024

Mise à jour :

Ajout étiquette Péridurale N°14659

1. Généralités

La majorité des étiquettes pour injectables est éditée grâce au logiciel PraxiKett Designer® [1]. Le code couleur choisi assure une sécurité supplémentaire (cf. p. 4).

Dans le présent catalogue, les étiquettes pour les injectables ont été classées par ordre alphabétique. Elles sont suivies des étiquettes pour les gobelets *per os* et des étiquettes diverses.

Les étiquettes sont **à commander à la PIC** à l'aide du cahier de commande relatif qui mentionne le numéro de l'étiquette. Veuillez toujours télécharger la dernière version du cahier de commande des étiquettes qui se trouve sur notre site internet :

https ://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Medicaments-injectables/Etiquettes.html

En cas de question, nous vous prions de contacter l'assistance pharmaceutique au 021 804 21 46.

1.1. Etiquettes pour injectables

Le contenu de l'étiquette permet de valider rapidement après lecture :



- la classe thérapeutique (avec le code couleur) [1]
- le nom commercial du médicament [2]
- la dénomination commune internationale [3]
- le débit ou la concentration [4]
- la dilution à préparer [5]
- la stabilité
- la voie d'administration
- la date et l'heure de préparation du médicament [6]
- la signature de la personne qui a préparé le médicament [7]
- l'étiquette d'identification de la ligne de perfusion [8]

Le nom du médicament peut contenir des **lettres majuscules** et minuscules. Ce lettrage, nommé *tall man letters*, est recommandé par la FDA et l'Institute for Safe Medication Practices, afin de différencier les médicaments de nom similaire (*sound-alike*) et de diminuer le risque de confusion. [2-4]

Exemples : nitroGLYCERINE – nitroPRUSSIATE, NORAdrénaline – ADRENALINE

Dans la grande majorité des cas, les dilutions et débits notés sur les étiquettes font référence aux recommandations du Manuel des Médicaments Injectables pour adultes (MMI) disponible sur pharmpic.ch :

https ://pharmpic.ch/Recommandations-dutilisation/Medicaments-injectables/Protocoles-injectables/MMI.html

En ce qui concerne les étiquettes des soins intensifs, la majorité de celles-ci ont été créées selon les recommandations du **SIPHAROM** (groupe de travail romand d'infirmiers, médecins et pharmaciens des soins intensifs).

Les étiquettes pour injectables sont à coller selon le modèle ci-dessous afin d'assurer une lisibilité maximale et d'éviter que l'étiquette ne se décolle.





1.2. Code couleur des étiquettes des médicaments injectables

Le code couleur choisi pour les étiquettes à apposer sur les seringues et perfusions des médicaments préparés est commun à tous les services.

Il se base en grande partie sur la **codification internationale** de la norme ISO 26825 : 2020 pour les médicaments d'anesthésie [4]. Une couleur est attribuée par **classe thérapeutique**, comme le résume le tableau ci-après.

Classes thérapeutiques	**Code couleur**	**Exemples d'étiquettes PIC**
Antiémétiques		PASPERTIN - métoclopramide 10 mg (1x 2mL) + 8 mL NaCl 0,9% IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....
Anticholinergiques		ATROPINE PUR 1 mL = 0,5 mg Date:.....H:.....Visa:.....
Benzodiazépines		DORMICUM - midazolam PUR 1 mL = 1 mg Date:.....H:.....Visa:.....
Antagoniste des benzodiazépines		FLUMAZENIL PUR 1 mL = 0,1 mg Date:.....H:.....Visa:.....
Induction		PROPOFOL 1% 1 mL/h = 10 mg/h PUR 500 mg (50 mL) stable 8h Date:.....H:.....Visa:..... PROPOFOL 1%
Anesthésiques locaux		BUPIvacaïne ..... % Date:.....H:.....Visa:.....
Héparine		HEPARINE 1 mL/h = 10'000 UI / 24h 20'000 UI (48 mL) prête à l'emploi stable 24h Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:.....
Protamine		PROTamine PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....
Suxamethonium		Suxamethonium Ped. 1 mL = 5 mg IVD 50 mg (5 mL) + 5 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:.....
Myorelaxants		NIMbex - cisatracurium PUR 1 mL = 2 mg Date:.....H:.....Visa:.....
Opiacés		FentaNYL PCA 1 mL = 20 microgr. Pur, prêt à l'emploi, stable 72 h Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Fentanyl PCA 20mcg/mL

Antagoniste des opiacés		NALOXONE 5 mL/h = 0,2 mg/h 1,6 mg (4 x 1 mL) + 36 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Naloxone 1,6mg/40mL
Adrénaline		ADRENALINE ..... mg = 1 mL Date:.....H:.....Visa:.....
Sympathomimétiques, vasopresseurs		NORAdrénaline A) 1 mg (1 mL) + 19 mL G5% B) 1 mL A + 9 mL G5% 1 mL = 5 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....
Hypotenseurs / vasodilatateurs		ADALAT - nifédipine 1 ml/h = 0,1 mg/h PUR 5 mg (50 mL) *seringue opaque, stable 12h* Date:.....H:.....Visa:..... Adalat 5 mg/50mL

1.3. Autres étiquettes

Pour les résidents d'EMS, la PIC a créé pour quelques médicaments préparés à l'avance (max. 24 h) par les infirmier·ère·s des étiquettes à coller sur les seringues pour voie s.c ou sur les godets de médicaments.

Exemples Préparation d'une seringue de morphine pour injection sous-cutanée	**Morphine amp. 10 mg/mL** ..... mg = ... mL Résident: ..... Voie s.c .Abri lumière. Stable 24h T° amb. Date: ..... H :..... Visa :.....
Préparation du godet avec de la solution de morphine	**Morphine sol. 1 mg/mL** ..... mg = ... mL Patient: ..... Date: ..... H :..... Visa :..... Voie orale. A utiliser dans les 24h

Le catalogue contient aussi des étiquettes pour aider à gérer les dates de péremption (art. n° 7797, n° 8557) ou encore à signaler l'allergie d'un patient (art. n° 8556, n° 5990).

Références :

[1] https ://www.diagramma.ch/fileadmin/downloads/produkte/de/PraxiKett%20Designer.pdf

[2]https ://www.fda.gov/drugs/medication-errors-related-cder-regulated-drug-products/fda-name-differentiation-project

[3] https ://www.ismp.org/sites/default/files/attachments/2017-11/tallmanletters.pdf

[4] Norme ISO 26825 :2020 'Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire : étiquettes apposées par l'utilisateur sur les seringues contenant des médicaments utilisés pendant l'anesthésie – couleurs, aspect et propriétés, https ://www.iso.org/

2. Catalogue

2.1. Etiquettes pour médicaments injectables

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
ETIQUETTES POUR INJECTABLES			
9177	Acide Tranexamique (Tranexamic®)	**ACIDE TRANEXAMIQUE** **à perfuser en 30 min.** ..... mg (dose prescrite) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ac. tranexamique	Perfusion par gravité
7455	Actrapid 50 UI/50mL	**ACTRAPID** - rH insuline **1 mL/h = 1 UI/ h** 50 UI (0,5 mL) + 49,5 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... ACTRAPID 1 UI/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
13622	Actrapid 100 UI/50mL	**ACTRAPID concentré** - rH insuline **1 mL/h = 2 UI/ h** 100 UI (1 mL) + 49 mL G5% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... ACTRAPID 2 UI/mL	Pousse-seringue (Soins intensifs)
12742	Actilyse 1mg/mL	**ACTILYSE** - altéplase ADNr **1 mL/h = 1 mg/h** **PUR 1 mg = 1 mL** Date:.....H:.....Visa:..... ACTILYSE 1 mg/mL	Pompe volumétrique
11294	Adénosine intracoronaire 1mg/1mL	**ADENOSINE intraCOROnaire** 10 mg (1x 2 mL) + 8 mL NaCl 0,9% **1 mL = 1 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue intraCOROnaire FFR
8410	Adrénaline conc. 15 mg/50mL	**ADRENALINE 15 mg** **1 mL/h = 5 microgr./ min** 15 mg (1,5x 10mL) + 35 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Adré 15 mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
8409	Adrénaline 6 mg/50mL	**ADRENALINE 6 mg** **1 mL/h = 2 microgr./ min** 6 mg (6 x 1mL) + 44 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Adré 6 mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
9920	Adrénaline 3mg/50 mL	**ADRENALINE 3 mg** **1 mL/h = 1 microgr./ min** 3 mg (3x 1mL) + 47 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Adré 3 mg/50mL	Pousse-seringue
7456	Adrénaline pur 1 mg/1mL	**ADRENALINE 1 mg** **PUR 1 mg = 1 mL** *IM, IVD, aérosol* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7457	Adrénaline 100 microgr./1mL	**ADRENALINE 100 mcg** 1 mL = 100 microgr. **1 mg (1 mL) + 9 mL NaCl 0,9%** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12584	Adrénaline 10 microgr./1mL	**ADRENALINE 10 mcg** **1 mL = 10 microgr.** **A)** 1 mg (1 mL) + 9 mL NaCl 0,9% B) 0,1 mg (1 mL de A) + 9 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9027	Adrénaline Ped. PS … mg / 50mL	**ADRENALINE Ped.** **..... mL/h = ... microgr./ kg/ min** 1 mg/ 1mL = 1000 microgr./ 1mL *à diluer selon ordre médical à:* ..... mL ad 50 mL G5% Date:.....H:.....Visa:..... Adrénaline Ped.	Pédiatrie Pousse-seringue
7115	Adrénaline …..mg/1mL	**ADRENALINE** **..... mg = 1 mL** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7460	Aggrastat 12,5 mg/250mL	**AGGRASTAT** - tirofiban **1 mL/h = 50 microgr./h** **PUR** 12,5 mg / 250 mL dose de charge en 30 min. puis schéma *stable 48 h* Date:.....H:.....Visa:..... Aggrastat pur	Pompe volumétrique *Sipharom*
10212	Amiodarone Réa pur 50 mg/1mL	**AMIODARONE Réa.** **PUR 1 mL = 50 mg** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue, réanimation adulte
8523	Amiodarone 150 mg/100mL	**AMIODARONE** **Dose de charge SI. A passer en 30 min.** 150 mg (1 x 3 mL) + 100 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Amiodarone 150mg/100mL	Pompe volumétrique, dose de charge SI
8524	Amiodarone 300 mg/100mL	**AMIODARONE** **Dose de charge SI. A passer en 30 min.** 300 mg (2 x 3 mL) + 100 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Amiodarone 300mg/100mL	Perfusion, dose de charge SI

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7467	Amiodarone 600 mg/48mL	**AMIODARONE** **2 mL/h = 600 mg/24h** 600 mg (4 x 3 mL) + 36 mL **G5%** **voie centrale** Date:.....H:.....Visa:..... Amiodarone 600mg/48mL	Pousse-seringue *Sipharom*
13373	Amiodarone 600 mg/250mL	**AMIODARONE** **11 mL/h = 600 mg/24h** 600 mg (4 x 3 mL) + 250 mL **G5%** Date:.....H:.....Visa:..... Amiodarone 600 mg/250 mL	Pompe volumétrique Dose entretien SI
13665	Ampres 30 mg/mL	**AMPRES 3%** - chloroprocaïne **PUR 1 mL = 30 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
13623	Argatra 250 mg/250 mL	**ARGATRA** - argatroban **1 mL/h = 1 mg/h** 250 mg (1x 2,5 mL) + 250 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% *stable 48 h* Date:.....H:.....Visa:..... Argatra 1mg/mL	Pompe volumétrique
7462	Aspégic IVD 500 mg/5mL	**ASPEGIC - "aspirine"** 500 mg + 5 mL eau ppi IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
11296	Atépodin intraveineuse perf. 100mg/100mL	**ATEPodine (adénosine) intraVEINeuse** **1 mL/h = 17 microgr./min** 100 mg + 100 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Atépodine 100 mg/100mL	Pompe volumétrique
7463	Atropine pure 0,5 mg/1mL	**ATROPINE** **PUR 1 mL = 0,5 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7464	Atropine conc. 1 mg/1mL	**ATROPINE conc** **PUR 1 mL = 1 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue, SMUR
7238	Atropine Ped. 250 microgr./1mL	**ATROPINE Ped.** PUR 1 mL = 0,25 mg = 250 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie
11865	Beloc 50mg/50mL	**BELOC** - métoprolol **1 mL/h = 1 mg/h** **PUR** 50 mg (10 x 5 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Beloc 50mg/50mL	Pousse-seringue SI
13664	Benerva 1mg/1mL	**BENERVA - thiamine** 100 mg = 1 mL IVD lent / i.m Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8522	Brevibloc pur 10mg/1mL	**BREVIBLOC - esmolol** **PUR 1 mL = 10 mg** IVD Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10793	Brevibloc PS 500 mg/ 50 mL	**BREVIBLOC - esmolol** **1 mL/h = 10 mg/h** **PUR** 500 mg (5 x 10 mL) **stable 24h** Date:.....H:.....Visa:..... Brevibloc 500 mg/50mL	Pousse-seringue SI
7117	Bupivacaïne …%	**BUPIvacaïne** ..... % Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8922	Buscopan 20 mg/1mL IVD	**BUSCOPAN IVDL** **PUR 1 mL = 20 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10213	Calcium Bichsel pur 1 g/ 10mL	**CALCIUM Bichsel 9 mg/mL IVD** **PUR 10 mL = 1 g gluconate Ca** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pour IVD adultes
10188	Calcium Bichsel 9 mg/mL Ped, IVD	**CALCIUM Bichsel Ped.** IVD lent sur 5-10 min. ....mL calcium + ...mL NaCl 0,9% → Cmax VVP 20mg/mL Ca2+ gluconate Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pour IVD pédiatrie
10189	Calcium Bichsel 9 mg/mL Ped, perf.	**CALCIUM BICHSEL Ped.** Perfusion i.v continue .....mL Calcium + ... mL NaCl 0,9% → Cmax VVP 20 mg/mL Ca2+ gluconate Date:.....H:.....Visa:..... Calcium Ped perf.	Perfusion continue pédiatrie
8419	Catapresan 300 microgr./24mL	**CATApresan** - clonidine **1 mL/h = 300 microgr./24h** 300 microgr. (2 x 1mL) + 22 mL **NaCl 0,9%** Date:.....H:.....Visa:..... Catapresan 12,5mcg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7119	Catapresan 15 microgr./1mL	**CATApresan** - clonidine IVD lent 150 mcg (1x 1mL) + 9 mL NaCl 0,9% **1 mL = 15 mcg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8689	Céfazolin 1 g/50mL	**CeFAZolin 1g** Perfuser en 30 min. 1 g (1x 10 mL) + 50 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Cefazolin 1 g	Perfusion par gravité
7465	Céfazolin 2 g/100mL	**CeFAZolin 2g** Perfuser en 30 min. 2 g (1x 10 mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Cefazolin 2 g	Perfusion par gravité

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
12843	Ceftriaxone 1g IVD	**Ceftriaxone 1g** 1 g + 10 mL eau ppi IVD lent	Seringue
12844	Ceftriaxone 2g/100 mL	**CeFTRIaxone 2g** Perfuser en 30 min. 2 g + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ceftriaxone 2 g	Perfusion par gravité
8484	Chlorure de calcium, dialyse	**Chlorure de Calcium** Ca^{2+}: 0,5 mmol/mL PUR 7,35 g (100 mL) uniquement par voie centrale! vitesse réglée par la machine d'hémodialyse date: ..... h: ..... visa:	Hémodialyse *(Pas dans Praxikett®)*
11385	Cleviprex 25mg/ 50 mL	**CLEVIPREX** - clévidipine 2 mL/h = 1 mg/h PUR 25 mg (1x 50mL) Stable 12h Date:.....H:.....Visa:..... Cleviprex 25mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
12840	Co-Amoxicilline 1,2 g IVD	**Co - Amoxicilline** 1,2 g + 20 mL eau ppi IVD lent	Seringue
12842	Co-Amoxicilline 2,2 g/100 mL	**Co-aMOXy 2,2g** - co-amoxicilline Perfuser en 30 min. 2,2 g + 100 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Co-Amoxy 2,2 g	Perfusion par gravité
13764	Co-Amoxicilline pédiatrie	**Co-aMOXy Pédiatrie** - co-amoxicilline Perfuser en 30 min. ☐ 550 mg + 10 mL NaCl 0,9% ☐ 1,1 g + 10 mL NaCl 0,9% ☐ 1,2 g + 10 mL NaCl 0,9% .....mg amoxi = ...mL àdiluer dans .....mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Amoxi ..... mg	Perfusion par gravité Pédiatrie
8420	Corotrop 10 mg/40mL	**COROTROP** - milrinone 6 mL/h = 25 microgr./min 10 mg (1 x 10mL) + 30 mL NaCl 0,9% voie centrale Date:.....H:.....Visa:..... Corotrop 10mg/40mL	Pousse-seringue *Sipharom*
12849	Daptomycine 350 mg IVD	**Daptomycine** 350 mg + 7 mL NaCl 0,9% IVD lent	Seringue
12850	Daptomycine 500 mg IVD	**Daptomycine** 500 mg + 10 mL NaCl 0,9% IVD lent	Seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
12839	Delamoxyl 500 mg IVD	**DELAmoxyl** - amoxicilline IVDL 500 mg + 10 mL NaCL 0,9% ..... mg = ...mL Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8710	Delamoxyl 1 g perf	**DELAmoxyl 1 g** - amoxicilline ☐ 1 g + 100 mL NaCl 0,9% en 20-30 min ☐ 1 g + 100 mL G5% en 20 min Date:.....H:.....Visa:..... DELAmoxyl 1 g	Perfusion par gravité
7466	Delamoxyl 2g perf	**DELAmoxyl 2 g** - amoxicilline ☐ 2 g + 100 mL NaCl 0,9% en 20 -30 min ☐ 2 g + 100 mL G5% en 20 min Date:.....H:.....Visa:..... DELAmoxyl 2 g	Perfusion par gravité
8421	Depakine 2400 mg/48mL	**DEPAKINE** - valproate Na **1 mL/h = 50 mg/h** 2400 mg (6 x 4 mL) + 24 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Depakine 2,4g/48mL	Pousse-seringue *Sipharom*
9760	Dexdor 400 microgr./ 40 mL	**DEXDOR** - dexmédétomidine **1 mL/h = 10 microgr./h** 400 microgr. (2 x 2 mL) + 36 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Dexdor 10 mcg/mL	Pousse-seringue **Anesthésie EHC**
12869	Dexdor 200 microgr./ 50 mL	**DEXDOR** - dexmédétomidine **1 mL/h = 4 microgr./h** ..... microgr. (..... x 2 mL) + ... mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Dexdor 4 mcg/mL	Pousse-seringue
11748	Dexdor 200 microgr./ 20 mL	**DEXDOR** - dexmédétomidine **1 mL/h = 10 microgr./h** 200 microgr. (1 x 2 mL) + 18 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Dexdor 10 mcg/mL	Pousse-seringue **Anesthésie GHOL**
7468	Digoxine 12,5 microgr./1mL	**DIGOXINE - IVD lent** 0,25 mg (1mL) + 19 mL G5% **1 mL = 12,5 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7469	Digoxine 25 microgr./1mL	**DIGOXINE - IVD lent** 0,5 mg (2mL) + 18 mL G5% **1 mL = 25 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8422	Diltiazem 50 mg/50mL	**DILTIAZEM** **1 mL/h = 1 mg/h** 50 mg (2 x 5 mL) + 40 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Diltiazem 50mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7471	Dobutrex pur 250 mg/50mL	**DOBUTrex** - dobutamine **1,2 mL/h = 100 microgr./ min** **PUR** 250 mg (1x 50 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Dobu 250mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
8530	Dobutrex Ped.	**DOBUTrex Ped.** - dobutamine **..... mL/h = ... microgr./ min** 250 mg/ 50 mL = 5 mg/ 1mL *àdiluer selon ordre médical à:* .....mg (..... mL) ad 50 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Dobutrex Ped.	Pousse-seringue pédiatrie
7472	Dopamine 250 mg/50mL	**DOPamine** **1,2 mL/h = 100 microgr./ min** 250 mg (5x 5 mL) + 25 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Dopa 250mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
8531	Dopamin Ped.	**DOPamin Ped.** - dopamine **..... mL/h = ... microgr./ min** 50 mg / 5 mL = 10 mg/ 1mL *à diluer selon ordre médical à:* ..... mg (..... mL) ad 50 mL Glucose 10 % Date:.....H:.....Visa:..... Dopamine Ped.	Pousse-seringue pédiatrie
13374	Dormicum 30 mg/30mL	**DORMICUM** - midazolam **1 mL/h = 1 mg/h** 30 mg (2x 3 mL) + 24 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Dormicum 30 mg/30mL	Pousse-seringue
8423	Dormicum 50 mg/50mL	**DORMICUM** - midazolam **1 mL/h = 1 mg/h** 50 mg (1x 10 mL) + 40 mL ☐ G5% ☐ NaCl 0,9% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Dormicum 50mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
13376	Dormicum 100 mg/ 50mL	**DORMICUM** - midazolam **1 mL/h = 2 mg/h** 100 mg (2x 10 mL) + 30 mL ☐ G5% ☐ NaCl 0,9% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Dormicum 100 mg/50 mL	Pousse-seringue SI, SP
13378	Dormicum PUR 250 mg/ 50mL	**DORMICUM** - midazolam **1 mL/h = 5 mg/h** **PUR** 250 mg (5 x 10 mL) Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Dormicum PUR	Pousse-seringue SI

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7473	Dormicum 1 mg/1mL	DORMICUM - midazolam PUR 1 mL = 1 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7474	Dormicum conc. 5 mg/1mL	DORMICUM conc.- midazolam PUR 1 mL = 5 mg IVD lent / intra-nasal Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue SMUR, SP
8630	Dormicum néonat. 0,5 mg/1mL	DORMICUM Néonat. - midazolam 5 mg (1mL) + 9mL NaCl 0,9% 1 mL = 0,5 mg IVD, sc Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue néonatologie
10210	Dormicum Ped, IVD 1 mg/1mL	DORMICUM Péd. - midazolam 5 mg (1mL) + 4 mL NaCl 0,9% 1 mL = 1 mg IVD, intra-nasal Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie
13445	Dormicum 10 mg/10mL	DORMICUM - midazolam 10 mg (2x1mL) + 8 mL NaCl 0,9% 1 mL = 1 mg IVD, sc Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10190	Dormicum Ped. Pousse-seringue	DORMICUM Ped. - midazolam ..... mL/h = ... microgr./ kg/ h 5 mg/ 1mL *àdiluer selon ordre médical à:* ..... mL ad 50 mL □ NaCl 0,9% □ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Dormicum	Pousse-seringue pédiatrie
12011	Ebrantil IVD 5mg/1mL	EBRANTIL - urapidil IVD lent PUR 1 mL = 5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12012	Ebrantil 100mg/50mL	EBRANTIL - urapidil 1 mL/h = 2 mg/h 100 mg (2x10 mL) + 30 mL □ NaCl 0,9% □ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ebrantil 100 mg/50mL	Pousse-seringue SI
11108	Empressin 40 UI/ 50 mL	EMPRESSIN - argipressine 0,75 mL/h = 0,6 UI/h = 0,01 UI/min 40 UI (1 x 2 mL) + 48 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Empressin 40UI/50mL	Pousse-seringue SI
7124	Ephedrine 50 mg/10 mL	EPHEDRINE PUR 1 mL = 5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7124 bis	Ephedrine 50 mg/5 mL à diluer !	ePHEDrine 50 mg (1x 5 mL) + 5 mL NaCl 0.9% 1 mL = 5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8537	Etiquette vierge grd modèle	Date:.....H:.....Visa:.....	
8536	Etiquette vierge petit modèle	Date:.....H:.....Visa:.....	
7126	Etomidate 2 mg/1mL	**ETOMIDATE** **PUR 1 mL = 2 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8438	Fentanyl pur ……. Microgr./……mL	**FentaNYL** **1 mL/h = 50 microgr./h** PUR .....microgr. (= ..... x 10 mL) Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Fentanyl 50 mcg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7579	Fentanyl 500 microgr. / 50mL	**FentaNYL** **1 mL/h = 10 microgr./h** 500 microgr. (1 x 10 mL) + 40 mL NaCl 0,9% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Fentanyl 0,5mg/50mL	Pousse-seringue
13298	Fentanyl PCA 20 mcg/mL prêt à l'emploi	**FentaNYL PCA** **1 mL = 20 microgr.** Pur, prêt àl'emploi, stable 72 h Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Fentanyl PCA 20mcg/mL	PCA (antalgie aigue)
9004	Ferinject	**FERINJECT** ☐ Dose entre 100 et 200 mg : …….mg, + 50 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. ☐ Dose entre 201 et 500 mg : …. mg, + 100 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. ☐ Dose entre 501 et 1000mg: ….mg, + 250 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. date :…….. h :……. visa :…….	Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
7461	Flumazénil pur 0,1 mg/1mL	**FLUMAZENIL** **PUR 1 mL = 0,1 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
11867	Flumazénil 1 mg/50mL	**FLUMAZENIL** **2 mL/h = 40 microgr./h** 1 mg (2x 5 mL) + 40 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Flumazenil 1mg/50mL	Pousse-seringue SI

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
13763	Gentamicine pédiatrie 40mg/40mL	**Gentamicine pédiatrie** Perfuser en 30 min. 40 mg (1x 1 mL) + 39 mL NaCl 0,9% **.....mg = ...mL** Date:.....H:.....Visa:..... Gentamicine .....mg	Pousse-seringue Pédiatrie
7695	Glucose Ped. 10%	**GLUCOSE 10% Ped.** **1 mL = 100 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie
7478	Glucose 40%	**GLUCOSE 40%** **10 mL = 4 g** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8588	Gynipral 100 microgr./500mL	**GYNipral** - hexoprénaline 100 microgr. (4x 5 mL) + 500 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **1 mL = 0,2 microgr.** date :..... h:..... visa :.....	Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
8589	Gynipral 200 microgr./500mL	**GYNipral** - hexoprénaline 200 microgr. (8x 5 mL) + 500 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **1 mL = 0,4 microgr.** date :..... h:..... visa :.....	Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
7678	Gynipral 0,5 microgr./1mL	**GYNipral** - hexoprénaline 10 microgr. (2mL) + 18 mL NaCl 0,9% **1 mL = 0,5 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7479	Haldol 5 mg/1mL	**HALDOL** - halopéridol **PUR 1 mL = 5 mg** *im / sc* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10120	Héparine 20 000UI/ 48mL	**HEPARINE** **1 mL/h = 10'000 UI / 24h** 20'000 UI (48 mL) prête à l'emploi **stable 24h** Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Héparine 20'000UI/48mL	Pousse-seringue *Sipharom*
8576	Héparine Ped. 5 UI/1mL	**HEPARINE Ped.** 50 UI (1mL) + 9 mL NaCl 0,9% **1 mL = 5 UI** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8905	Hydromorphone 20mg/40 mL	**HYDROmorphone** **1 mL/h = 0,5 mg/h** 20 mg (10 x 1mL) + 30 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Hydromo 20mg/40mL	Pousse-seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8563	Hydromorphone pur 2 mg/ 1ml sc	**HYDROmorphone 2 mg/mL** **…… mg = …… mL** **Résident: ……..** **Voie s.c. Abri lumière. Stable 24h T° amb.** **Date: …….. H :…… Visa :…...**	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*
8904	Hydromorphone pur 20 mg/ 1ml sc	**HYDROmorphone 20 mg/mL** **…… mg = …… mL** **Résident: ……..** **Voie s.c. Abri lumière. Stable 24h T° amb.** **Date: …….. H :…… Visa :…...**	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*
14568	Infracyanine 25 mg	**INFRACYANINE** - vert d'indocyanine 25 mg (1 flac.) + 10 mL solvant **1 mL = 2,5 mg** Date:……H:……Visa:……	Seringue
7481	Isuprel IVD 20 microgr./1mL	**IsuPREL** - isoprénaline 0,2 mg (1mL) + 9 mL NaCl 0,9% **1 mL = 20 microgr.** Date:……H:……Visa:……	Seringue
8540	Isuprel 0,2 mg/ 50 mL	**IsuPREL** - isoprénaline **15 mL/h = 1 microgr./ min** 0,2 mg (1 x 1mL) + 49 mL □ NaCl 0,9% □ G5% **Seringue opaque** Date:……H:……Visa:…… Isuprel 4 mcg/mL	Pousse-seringue
11539	Isuprel concentré 2 mg/ 50mL	**IsuPREL conc.** - isoprénaline **1,5 mL/h = 1 microgr./ min** 2 mg (10 x 1mL) + 40 mL □ NaCl 0,9% □ G5% **Seringue opaque** Date:……H:……Visa:…… Isuprel **40** mcg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
13379	Ivemend + Mephaméson	*Prémédication oncologie* 150 mg **Ivemend®** + …… mg **Méphameson® ad** 150 mL NaCl 0,9% A perfuser en 20 min. Date:……H:……Visa:…… Ivemend + Mephameson	Perfusion prémédication oncologie
7128	Ivracaïne 0,5%	**IVRAcaïne 0,5%** - chlorprocaïne **PUR 1 mL = 5 mg** Date:……H:……Visa:……	Seringue
8424	KCl concentré pur 100 mmol/ 50mL	**KCl Pur**- Potassium chlorure **1 mL/h = 2 mmol/h = 2mEq/h** **PUR** 100 mmol (5 x 10 mL à14,9%) **voie centrale, stable 24h** Date:……H:……Visa:…… KCl conc. 2mmol/mL	Pousse-seringue *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8425	KCl 60 mmol/60 mL	**KCl** - Potassium chlorure **1 mL/h = 1 mmol/h = 1 mEq/h** 60 mmol (3 x 10 mL à14,9%) + 30 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... KCl 1 mmol/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
14647	Kengrexal IVD	**Kengrexal 50 mg** **1 mL = 200 mcg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
14648	Kengrexal 50 mg	**Kengrexal-** Cangrelor 200 mcg/min = 60 mL/h 50 mg (1 x 5 mL) + 250 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Kengrexal 50 mg	Pompe volumétrique
14374	Kefzol 2g/100 mL	**Kefzol -** Céfazoline Perfuser en 30 min. 2 g (1x 10 mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Kefzol 2 g	Perfusion par gravité
11868	Kétamine 500 mg/50 mL	**KETamine** **1 mL/h = 10 mg/h** **PUR** 500 mg (5 x 10 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Ketamine 500 mg/50mL	Pousse-seringue
13443	Kétamine 100 mg/50 mL	**KETamine** **1 mL/h = 2 mg/h** 100 mg (1 x 2 mL) + 48 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Ketamine 100 mg/48mL	Pousse-seringue
8432	K-Phos 20mmol/48mL	**K-Phos** - Potassium phosphate **1 mL/h = 10 mmol/ 24h** 20 mmol (2 x 10 mL à13,6%) + 28 mL NaCl 0,9% **voie centrale, stable 24h** Date:.....H:.....Visa:..... K-Phos 20mmol/48mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7246	Krénosine pure 3 mg/1mL	**KRENosine** - adénosine **PUR 1 mL = 3 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7504	Lasix 40 mg/40mL	**LASIX** - furosémide **1 mL/h = 1 mg/h** 40 mg (2x 2 mL) + 36 mL **NaCl 0,9%** ***seringue opaque, stable 24h*** Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Lasix 1 mg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
8426	Lasix conc. 250 mg/50mL	**LASIX concentré** - furosémide **1 mL/h = 5 mg/h** 250 mg (1x 25mL) + 25 mL **NaCl 0,9%** ***seringue opaque, stable 24h*** Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... LASIX 5 mg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7247	Lasix 1 mg/1mL	**LASIX** - furosémide **20 mg (1x 2mL) + 18 mL NaCl 0,9%** **1 mg = 1 mL** *max. 4 mg/min.* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8906	Lévomépromazine sc 12,5 mg	**LEVOMEPROMAZIN** **PUR 12,5 mg = 0,5 mL** **6,25 mg = 0,25 mL** **Voie s.c. Abri lumière. Stable 12h** **Date: ..... H :..... Visa :.....**	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*
11529	L.I.A (Local infiltration anesthesia)	**L.I.A** (**L**ocal **I**nfiltration **A**nesthesia) Ropivacaïne 2 mg/mL .... mL = ... mg Toradol 30 mg/mL 1 mL = 30 mg Morphine 10 mg/mL 0,3 mL = 3 mg Adrénaline 1 mg/mL 0,3 mL = 0,3 mg Date:.....H:.....Visa:..... L.I.A	Pousse-seringue
10999	Lidocaïne CO_2 2% + sufenta + adrénaline pour péridurale	Ajouter à la péridurale : 1 flacon (20 mL) de **Lidocaïne CO_2 2%** **10 mcg** (2 mL) de **SUFENTA** 10 mcg / 2mL **100 mcg** (0,1 mL) d'**ADRENALINE** 1 mg/ml sans disulfite Date: ..... h : ..... Visa : ..... **Délai d'utilisation: 24 h** **Pour 1 seule patiente !** **PERIDURALE**	*(Pas dans Praxikett®)*
8482	Liquémine prophyl., dialyse continue SI	**! Dialyse continue SI !** **LIQUEMINE prophylactique** 2'500 UI (0,5 mL) + 49,5 mL NaCl 0,9% soit: **1 mL = 50 UI stable 24h** date: ..... h: ..... visa:	Pousse-seringue Dialyse continue Soins Intensifs *(Pas dans Praxikett®)*
8481	Liquémine thérapeut., dialyse continue SI	**! Dialyse continue SI !** **LIQUEMINE thérapeutique** 5'000 UI (1 mL) + 49 mL NaCl 0,9% soit: **1 mL = 100 UI stable 24h** date: ..... h: ..... visa:	Pousse-seringue Dialyse continue Soins Intensifs *(Pas dans Praxikett®)*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
9366	Liquémine coro 5 000 UI/500mL	**LIQUEMINE** - héparine rinçage coronographie 5'000 UI (1 mL) + 500 mL NaCl 0,9% **1 mL = 10 UI** *stable 24 h* Date:.....H:.....Visa:..... Liquemine 5000 UI coro	Pompe volumétrique, rinçage coronographie
9367	Liquémine coro 10 000 UI/1000mL	**LIQUEMINE** - héparine rinçage coronographie 10'000 UI (2 mL) + 1000 mL NaCl 0,9% **1 mL = 10 UI** *stable 24 h* Date:.....H:.....Visa:..... Liquemine 10000 UI coro	Pompe volumétrique, rinçage coronographie
11697	Liquémine prophyl. 5000 UI/20 mL, Hémodialyse	**! Hémodialyse !** **LIQUEMINE prophylactique** 5000 UI (1mL) + 19 mL NaCl 0,9% **1 mL = 250 UI** *stable 24h* Date:.....H:.....Visa:..... Liquemine proph. dialyse	Pousse-seringue hémodialyse
7248	Magnésium sulfate 10% **charge** pré-éclampsie	**Magnesium sulfate** A perfuser en 20 min. 4 g **PUR** *dose de charge prééclampsie* Date:.....H:.....Visa:..... Magnesium sulfate	Pousse-seringue, Dose charge pré-éclampsie
12276	Magnésium sulfate prêt à l'emploi **entretien** pré-éclampsie	Magnesium sulfate CHUV 48 mg/mL **21 mL/h = 1 g/h** **PUR** 24 g (1 x 500 mL) *dose d'entretien prééclampsie* Date:.....H:.....Visa:..... Magnesium sulf. 24g	Perfusion prête à l'emploi, Dose entretien pré-éclampsie
12109	Magnésium sulfate 20% hypomagnésémie perfusion	Magnesium sulfate **Perfuser 1 g/h** ☐ 1 g + 100 mL NaCl 0,9% ☐ 2 g + 100 mL NaCl 0,9% ☐ 4 g + 250 mL NaCl 0,9% *hypomagnésémie* Date:.....H:.....Visa:..... Magnesium sulfate	Pompe volumétrique, hypomagnésémie
13444	Magnésium sulfate 20% hypomagnésémie Pousse-seringue	**Magnesium sulfate** **24 mL/h = 1 g/h** **2 mL/h = 2g/24h** 2 g ad 48 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Magnesium sulfate	Pousse-seringue
10211	Magnésium sulfate 20% adulte IVD	**Magnesium sulf. 20%** **PUR 1 mL = 200 mg** *IVD lent 10-15 min.* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue adulte
10191	Magnésium sulfate 10% Ped. IVD	**Magnésium sulf. 10% Ped.** IVD lent 10-30 min. 2g / 20 mL = 100 mg / 1 mL PUR *Eventuellement ad 10-20 mL G5%* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7132	Méphamésone pur 4 mg/1mL	MEPHAMESONE déxaméthasone phosp.disodique PUR 1 mL = 4 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12845	Méropénem 1g IVD	Meropenem 1 g 1 g + 20 mL eau ppi IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12846	Méropénem 2g/100 mL dialyse	Meropenem 2g - *dialyse* Perfuser en 15 - 30 min. 2 g + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Meropenem 2 g	Perfusion par gravité
9451	Mivacron pur 10 mg/5mL	MIVAcron - mivacurium PUR 5 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7511	Morphine 40 mg/40mL (i.v)	Morphine 1 mL/h = 1 mg/h 40 mg (4 x 1 mL) + 36 mL NaCl 0,9% *i.v continu* Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Morphine 40mg/40mL	Pousse-seringue i.v *Sipharom*
11904	Morphine 50 mg/25mL (s.c)	Morphine 1 mL/h = 2 mg/h 50 mg (5 x 1 mL) + 20 mL NaCl 0,9% *perfusion s.c continue* Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Morphine 50mg/25mL	Pousse-seringue **s.c**
13297	Morphine sulfate PCA 1mg/mL	Morphine sulfate PCA 1 mL = 1 mg PUR, prête àl'emploi, stable 72h ☐ i.v ☐ s.c Date:..... h:..... visa 1:..... visa 2:..... Morphine sulf. PCA 1mg/mL	PCA
7133 bis	Morphine 1 mg/1mL IVD	Morphine IVD lent 10 mg (1mL) + 9 mL NaCl 0,9% 1 mL = 1 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7249	Morphine pure 10 mg/1mL i.m/ s.c	Morphine im / sc PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8562	Morphine sc 10 mg/1mL	Morphine amp. 10 mg/mL ..... mg = ... mL Patient: ..... Sc / i.v Abri lumière. Stable 24h T° amb. Date: ..... H :..... Visa :.....	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8903	Morphine sc 20 mg/1mL	**Morphine amp. 20 mg/mL** **..... mg = ... mL** **Patient: .....** s.c/ i.v . Abri lumière. Stable 24h T° amb. **Date: ..... H :..... Visa :.....**	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*
10192	Morphine Ped, pousse-seringue	**Morphine Ped.** **1 mL/h = 20 microgr./ kg/ h** 10 mg/ 1mL à diluer: **1 mg/kg (0,1 mL/ kg)** soit: .....**mL** ad 50 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Morphine Ped.	Pousse-seringue pédiatrie
7250	NaCl 0,9 %	**NaCl 0,9%** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9167	Nalador 500 mcg/ 250mL (EHC)	**NALADOR** - sulprostone **250 mL/h = 500 microgr./h** 500 microgr. + 250 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Nalador 500 mcg	Pompe volumétrique selon **protocole EHC**
11492	Nalador 500 mcg/ 50mL (GHOL)	**NALADOR** - sulprostone **50 mL/h = 500 microgr./h** 500 microgr. + 50 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Nalador 500 mcg	Pousse-seringue selon **protocole GHOL**
7251	Naloxone pur, IM, SC 0,4 mg/1mL	**NALOXONE IM, SC** **PUR 1 mL = 0,4 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10193	Naloxone dilué, IVD 0,04 mg/1mL	**NALOXONE IVD** 0,4 mg (1 mL) + 9 mL NaCl 0,9% 1 mL = 0,04 mg = 40 mcg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
11869	Naloxone 1,6 mg/40 mL	**NALOXONE** **5 mL/h = 0,2 mg/h** 1,6 mg (4 x 1 mL) + 36 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Naloxone 1,6mg/40mL	Pousse-seringue SI
7516	Nepresol 25 mg/500 mL	**NEPRESOL** - dihydralazine **20 mL/h = 1 mg/h** 25 mg (1x2 mL) + 500 mL **NaCl 0,9%** *Tubulure sans PVC* Date:.....H:.....Visa:..... Nepresol 25mg/500mL	Pompe-volumétrique *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
11540	Nepresol 50 mg/50 mL	NEPRESOL - dihydralazine 1 mL/h = 1 mg/h 50 mg (2 x 2 mL) + 46 mL NaCl 0,9% Prolongateur sans PVC Date:.....H:.....Visa:..... Nepresol 50mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
14211	Nicardipine pur 50 mg/50 mL	NICARDIPINE 1 mL/h = 1 mg/h 50 mg (5 x 10 mL) PUR Seringue opaque, stable 24h Date:.....H:.....Visa:..... NICARDIPINE 1 mg/mL	Pousse-seringue
14212	Nicardipine 10 mg/50 mL	NICARDIPINE 1 mL/h = 0,2 mg/h 10 mg (1 x 10 mL) + 40 mL ☐ NaCl 0,9% ou ☐ G5% Seringue opaque, stable 24h Date:.....H:.....Visa:..... NICARDIPINE 10 mg/50mL	Pousse-seringue
14213	Nicardipine pur 1 mg/1 mL	NICARDIPINE PUR 1 mL = 1 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7144	Nimbex pur 2 mg/1mL	NIMbex - cisatracurium PUR 1 mL = 2 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12602	Nimbex continu 100 mg/50 mL	NIMBEX - cisatracurium 1 mL/h = 2 mg/h PUR 100 mg (50 mL) stable 24h Date:.....H:.....Visa:..... Nimbex 100mg/50mL	Pousse-seringue
7518	Nitroglycérine pure 50 mg /50 mL	nitroGLYCERINE 1 mL/h = 1 mg/h PUR 50 mg (50mL) Date:.....H:.....Visa:..... nitroGLYCERINE PUR	Pousse-seringue *Sipharom*
10373bis	Nitroglycérine 0,1 mg/ 1mL (Perlinganit à diluer)	nitroGLYCERINE 100 mcg 1 mg (1 mL) + 9 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
14086	Nipruss 15 mg/50mL	NIPRUSS - Nitroprussiate sodique 1 mL/h = 5 microgr./min 15 mg (1 mL) + 49 mL G5% seringue et tubulure opaques Date:.....H:.....Visa:..... NIPRUSS 15mg/50mL	Pousse-seringue SI

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
14087	Nipruss 30 mg/50mL	NIPRUSS - Nitroprussiate sodique 1 mL/h = 10 microgr./min 30 mg (2 mL) + 48 mL G5% seringue et tubulure opaques Date:.....H:.....Visa:..... NIPRUSS 30mg/50mL	Pousse-seringue SI
14088	Nipruss 60 mg/50mL	NIPRUSS - Nitroprussiate sodique 1 mL/h = 20 microgr./min 60 mg (4 mL) + 46 mL G5% seringue et tubulure opaques Date:.....H:.....Visa:..... NIPRUSS 60mg/50mL	Pousse-seringue SI
9349	Noradrénaline 3 mg/50mL	NORAdrénaline 3 mg 1 mL/h = 1 microgr./min 3 mg (3 x 1 mL) + 47 mL G5% Date:.....H:.....Visa:..... Noradrénaline 3 mg/50 mL	Pousse-seringue SI
8430	Noradrénaline 6 mg/50mL	NORAdrénaline 6 mg 1 mL/h = 2 microgr./min 6 mg (6 x 1 mL) + 44 mL G5% Date:.....H:.....Visa:..... Noradrénaline 6 mg/50 mL	Pousse-seringue SI
8498	Noradrénaline conc. 15 mg/50mL	NORAdrénaline 15 mg 1 mL/h = 5 microgr./min 15 mg (1,5 x 10 mL) + 35 mL G5% Date:.....H:.....Visa:..... Noradrénaline 15 mg/50 mL	Pousse-seringue SI
7142	Noradrénaline 5 microgr./1mL	NORAdrénaline A) 1 mg (1 mL) + 19 mL G5% B) 1 mL A + 9 mL G5% 1 mL = 5 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10194	Noradrénaline Ped. PS	NORAdrénaline Ped. 2 mL/h = 0,1 microgr./ kg/ min 1 mg/1 mL *à diluer selon ordre médical à:* **0,15 mg/kg (0,15 mL/kg)** soit: **.....mL** ad 50 mL G5% Date:.....H:.....Visa:..... Noradrénaline Ped.	Pousse-seringue pédiatrie
8437	Octreotid 0,5 mg/50mL	OCTREOTID 1 mL/h = 10 microgr./h 0,5 mg (5 x 1 mL) + 45 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Octreotid 0,5mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
11116	Ondansétron 4 mg/ 50mL	**ONDANsétron 4 mg** Perfuser en 15 min. 4 mg (1x 2 mL) + 50 mL □ NaCl 0,9% □ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ondansétron 4mg/50mL	Perfusion par gravité
11117	Ondansétron 8 mg/ 100mL	**ONDANsétron 8 mg** Perfuser en 15 min. 8 mg (1x 4 mL) + 100 mL □ NaCl 0,9% □ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ondansétron 8mg/100mL	Perfusion par gravité
13380	Ondansétron + Mephamésone	*Prémédication oncologie* ..... mg **Ondansetron®** + ... mg **Méphameson®** + 100 mL NaCl 0,9% A perfuser en 15 min. Date:.....H:.....Visa:..... Ondenstron + Mephameson	Perfusion, prémédication Oncologie
10766 bis	Ondansétron 2mg/1mL (feuille)	**ONDANsétron** **PUR 1 mL = 2 mg** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pour CSU (ambulances)
11617	Pabal 1 microgr./ 1mL	**PABAL** - carbétocine **PUR 1 mL = 100 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8431	Pantoprazol 80 mg/40mL	**PANTOPRAZOL** **4 mL/h = 8 mg/h** 80 mg (2 x 10 mL reconstitués) + 20 mL □ NaCl 0,9% □ G5% **stable 12h** Date:.....H:.....Visa:..... Pantoprazol 80mg/40mL	Pousse-seringue *Sipharom*
14005	Pantoprazol perfusion 80 mg/100mL	**PANTOPRAZOL** **10 mL/h = 8 mg/h** 80 mg (2 x 10 mL reconstitués) + 80 mL □ NaCl 0,9% □ G5% **stable 12h** Date:.....H:.....Visa:..... Pantoprazol 80mg/100mL	Pompe volumétrique
8907	Paspertin dilué 1mg/mL	**PASPERTIN** - métodopramide 10 mg (1x 2mL) + 8 mL NaCl 0,9% *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue IVDL
9549	Penicilline G, 2,5 mio UI / 50 mL	**PENICILLINE G - 2,5 mio UI** benzylpenicilline 2,5 mio UI + 50 mL NaCl 0,9% *dose d'entretien* Perfuser en 30 min. Date:.....H:.....Visa:..... Penicilline G 2,5 mio UI	Perfusion par gravité

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
9550	Pénicilline G, 5 mio UI / 50 mL	**PENICILLINE G - 5 mio UI** benzylpenicilline 5 mio UI + 50 mL NaCl 0,9% *dose de charge* Perfuser en 30 min. Date:.....H:.....Visa:..... Penicilline G 5 mio UI	Perfusion par gravité
14659	Péridurale	**PERIDURALE** **uniquement** Date:.....H:.....Visa:..... **Peridurale uniquement**	Pompe volumétrique
10401	Péthidine 5 mg/1mL	**PETHIDINE IVD lent** 25 mg (0,5 mL) + 4,5 mL NaCl 0,9% **1 mL = 5 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7521	Péthidine 10 mg/1mL	**PETHIDINE IVD lent** 100 mg (2mL) + 8 mL NaCl 0,9% **1 mL = 10 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7522	Phenhydan 50 mg/1mL	**PhenHYDAN** - phénytoïne **PUR 1 mL = 50 mg** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7139	PhenYLEPHRINE	**PhenYLEPHRINE** **PUR 1 mL = 100 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	
10197	Phénobarbital Ped. IVD	**PhenOBARBITAL Ped.** **IVD lent sur 20 min.** 200 mg (2 mL) + 18 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **1 mL = 10 mg** Date:.....H:.....Visa:..... Phenobarbital Ped.	Pousse-seringue pédiatrie
7152	Phentolamine 1mg/ 1mL	**PhenTOLAMINE** 10 mg (1mL) + mL NaCl 0,9% **1 mL = 1 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
13906	Piperacilline/tazobactam perf.	**Pipéracilline / Tazobactam** Perfuser en 30 min. ☐ 2,25 g (10 mL) + 50 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% ☐ 2,25 g (10 mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% ☐ 4,5 g (20 mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Piper / tazobactam	Perfusion gravité
12110	Pousse-Amines	**POUSSE-AMINES** ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% ☐ Plasma Lyte Date:.....H:.....Visa:..... **! POUSSE AMINES !**	Pousse-seringue SI

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8499	Prismasol 4, hémodialyse	**PrismaSOL 4** !! contient **4 mmol/L** de **potassium** !! soit: 20 mmol K^+/ poche 5L Stable 24h Date: ..... h:..... visa:	Hémodialyse *(Pas dans Praxikett®)*
8500	Prismocal B22, hémodialyse	**PrismoCAL B22** Stable 24h Date: ..... h:..... visa:	Hémodialyse *(Pas dans Praxikett®)*
8501	Prismocitrate 18/0, hémodialyse	**PrismoCITRATE 18/0** Stable 24h Date: ..... h:..... visa:	Hémodialyse *(Pas dans Praxikett®)*
8433	Propofol 1 % pur 500 mg/50mL	**PROPOFOL 1%** **1 mL/h = 10 mg/h** **PUR** 500 mg (50 mL) **stable 8h** Date:.....H:.....Visa:..... PROPOFOL 1%	Pousse-seringue *Sipharom*
8472	Propofol 2 % concentré	**PROPOFOL 2%** **1 mL/h = 20 mg/h** **PUR** 1000 mg (50 mL) **stable 8h** Date:.....H:.....Visa:..... PROPOFOL 2%	Pousse-seringue *Sipharom* *(utilisation exceptionnelle, préférer le 1%)*
10198	Prostin VR perf.	**PROSTIN VR** - alprostadil **..... mL/h = ... microgr./min** ..... mL (..... microgr.) ad 50 mL ☐ G5% ☐ NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Prostin VR	Pompe-volumétrique, néonatologie
7149	Protamine pure 10 mg/1mL	**PROTamine** **PUR 1 mL = 10 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8551	Rapidocaïne cardio 10 %	**RapiDOCAINE cardio**- lidocaïne **1 mL/h = 10 mg/h** 500 mg (1 x 5 mL) + 45 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Rapido cardio 1%	Pousse-seringue, Usage cardiologique

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7150	Rapidocaïne cardio pure 2 %	RapiDOCAINE cardio 2% - lidocaïne PUR 1 mL = 20 mg usage cardio; max 50 mg/min Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue, usage cardio
10998	Rapidocaïne 2% Pousse-seringue (antalgique)	RapiDOCAINE 2% - lidocaïne 1 mL/h = 20 mg/h PUR: 800 mg (2 x 20 mL) Usage antalgique Date:.....H:.....Visa:..... Rapidocaïne 2%	Pousse-seringue, Usage antalgique
7151	Rapifen 100 microgr./1mL	RapiFEN - alfentanil 1 mg (1x 2 mL) + 8 mL NaCl 0,9% 1 mL = 100 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8434	Rivotril 2 mg/48mL	RIVOTRIL - clonazépam 1 mL/h = 1 mg/24h 2 mg (2 x 1 mL) + 46 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Rivotril 2mg/48mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7527	Rivotril 0,5 mg/1mL	RIVOTRIL - clonazépam 1 mg (1 mL) + 1 mL eau ppi 1 mL = 0,5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8923	Robinul sc 0,2 mg/1mL	ROBINUL 0,2 mg/mL ..... mg = ... mL Résident: ..... Stable 12h T° amb. Voie s.c Date: ..... H :..... Visa :.....	Préparation des seringues s.c *(Pas dans Praxikett®)*
12743	Rocuronium 10 mg/mL	ROCuronium 1 mL/h = 10 mg/h PUR ..... mg (= .....x 10 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Rocuronium 10mg/mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7136	Ropivacaïne 0,2 %	ROPIvacaïne 0,2% PUR 1 mL = 2 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7137	Ropivacaïne 0,5 %	ROPIvacaïne 0,5% PUR 1 mL = 5mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8435	Sandimmum 50mg/50 mL	SANDIMMUM - ciclosporine 1 mL/h = 1 mg/ h 50 mg (1x 1 mL) + 49 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Sandimmum	Pousse-seringue *Sipharom*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
7698	Sodium bicarbonate Ped. 4,2 %	**Na Bicarbonate Ped.** 10 mL Na Bic. 8,4% + 10 mL eau ppi **1 mL = 0,5 mmol** Date:.....H:.....Visa:..... Na bic. Ped.	Seringue
14274	Solu-cortef 200 mg/50 mL	**SOLU-CORTEF**- hydrocortisone **2 mL/h = 8 mg/h** 200 mg (2x 2mL) + 46 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ Glucose 5% Date:.....H:.....Visa:..... Solu-Cortef 200 mg/50 mL	Pousse-seringue
10199	Solu-Moderin 40 mg	**SOLU-MODERIN** methylprednisolone sodium succinate Reconstitué 1 mL = 40 mg *à diluer ad 5 - 10 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5%* IV lent sur 5 - 10 min Date:.....H:.....Visa:..... Solu-Moderin 40mg	Seringue
10200	Solu-Moderin 62,5 mg	**SOLU-MODERIN** methylprednisolone sodium succinate Reconstitué 1 mL = 62,5 mg *à diluer ad 5 - 10 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5%* IV lent sur 5 - 10 min Date:.....H:.....Visa:..... Solu-Moderin 62,5 mg	Seringue
11870	Sufenta ……. mcg/……. mL	**SUFenta**- sufentanil **1 mL/h = 5 microgr./h** PUR ..... microgr. (=..... x 10 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Sufenta 5 mcg/mL	Pousse-seringue SI
14614	Suxamethonium Ped. 5 mg/1 mL	**Suxamethonium Ped.** **1 mL = 5 mg IVD** 50 mg (5 mL) + 5 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8690	Syntocinon 5 UI/ 500mL	**SyntoCINON** - oxytocine **5 UI** (1 x 1 mL) + 500 mL ☐ **NaCl 0,9%** ☐ G5% ☐ RL **1 mL = 10 milli UI** date :..... h:..... visa :.....	Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
8553	Syntocinon 5 UI/ 100mL	**SyntoCINON** - oxytocine **5 UI** (1x 1 mL) + 100 mL ☐ **NaCl 0,9%** ☐ G5% ☐ RL **1 mL = 50 milli UI** date :..... h:..... visa :.....	Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8554	Syntocinon 10 UI/ 500mL (EHC)	**SyntoCINON** - oxytocine **10 UI** (2x 1 mL) + 500 mL ☐ **NaCl 0,9%** ☐ G5% ☐ RL **1 mL = 20 milli UI** date :..... h:..... visa :.....	EHC Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
9179	Syntocinon 20 UI/ 500mL (GHOL)	**SyntoCINON** - oxytocine **20 UI** (4 x 1 mL) + 500 mL ☐ **NaCl 0,9%** ☐ G5% ☐ RL **1 mL = 40 milli UI** date :..... h:..... visa :.....	GHOL Pompe volumétrique *(Pas dans Praxikett®)*
8439	Tambocor 300 mg/30 mL	**TAMBOCOR** - flécaïnide **1 mL/h = 10 mg/h** **PUR** 300 mg (2 x 15 mL) *stable 24h* Date:.....H:.....Visa:..... Tambocor PUR	Pousse-seringue *Sipharom*
7257	Tavegyl pur 1 mg/1mL	**TAVEGYL** - clémastine **PUR 1 mL = 1 mg** IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10202	Tavegyl Ped.0,2 mg/ 1mL	**TAVEGYL Ped.** - clémastine 2 mg (2mL) + 8 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **1 mL = 0,2 mg** IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie
10203	Temesta Ped.0,4 mg/ 1mL	**TEMESTA Ped. - lorazépam** 4 mg (1mL) + 9 ml **G5%** **1 mL = 0,4 mg** IVD lent Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue pédiatrie
7146	Thiopental 25 mg/1mL	**THIOPENTAL** 0,5 g + 20 mL eau ppi **1 mL = 25 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9830	Thiosulfate sodium 400 mg	**Thiosulfate de sodium** **PUR 400 mg = 1,6 mL** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9831	Thiosulfate sodium 800 mg	**Thiosulfate de sodium** **PUR 800 mg = 3,2 mL** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9832	Thiosulfate sodium 1200 mg	**Thiosulfate de sodium** **PUR 1200 mg = 4,8 mL** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
9833	Thiosulfate sodium 1600 mg	**Thiosulfate de sodium** **PUR 1600 mg = 6,4 mL** *IVD lent* Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
7159	Tracrium pur 10 mg/1mL	**TRACrium** - atracurium **PUR 1 mL = 10 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8691	Tractocile	**TRACTOCILE** – atosiban 2 ampoules de 37,5 mg/5mL + 90 mL NaCl 0,9% date :..... h:..... visa :..... date :..... h:..... visa :.....	*(Pas dans Praxikett®)*
8440	Trandate pur 200 mg/40mL	**TRANDATE** - labétolol **1 mL/h = 5 mg/h** **PUR** 200 mg (2 x 20 mL) Date:.....H:.....Visa:..... Trandate PUR	Pousse-seringue *Sipharom*
7258	Trandate pur 5 mg/1mL	**TRANDATE** - labétalol **PUR 1 mL = 5 mg** IVD, max. 50 mg/min Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
11871	Ultiva 2 mg/35mL	**ULTIVA** - rémifentanil **1 mL/h = 1 microgr./min** 2 mg (1 x 2 mL) + 33 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Ultiva 2mg/35 mL	Pousse-seringue
7532	Valium 1 mg/1mL	**VALIUM** - diazépam 10 mg (1x 2mL) + 8 mL **G5%** **1 mL = 1 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8586	Valium pur 5 mg/1mL	**VALIUM** - diazépam **PUR 1 mL = 5 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12585	Vancomycin 500 mg/48mL	**VANCOMYCIN continue 500 mg** 2 mL/h = 500 mg/24h 500 mg (1x 10 mL) + 38 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **Voie veineuse centrale** Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 500 mg	Pousse-seringue
12586	Vancomycin 1 g/48mL	**VANCOMYCIN continue 1g** 2 mL/h = 1g /24h 1 g (1x 20mL) + 28 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% **Voie veineuse centrale** Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 1 g	Pousse-seringue
12853	Vancomycin 500 mg/100 mL	**VANCOMYCIN 500 mg** A perfuser en min. 1h 500 mg (1x 10mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 500 mg	Perfusion par gravité

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
13630	Vancomycin 750 mg/100 mL	**VANCOMYCIN 750 mg** A perfuser en min. 1h30 750 mg (1x 15mL) + 150 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5 Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 750 mg	Perfusion par gravité
12854	Vancomycin 1 g/250 mL	**VANCOMYCIN 1 g** A perfuser en min. 2h 1g (1x 20mL) + 250 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 1 g	Perfusion par gravité
12855	Vancomycin 1,5 g/250 mL	**VANCOMYCIN 1,5 g** A perfuser en min. 2h30 1,5 g (1x 30mL) + 250 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Vancomycin 1,5 g	Perfusion par gravité
12501	Veklury = Remdesivir	**VEKLURY - remdesivir** Perfuser en 30 min. à 2h ☐ 200 mg (2x 20 mL) ad 250 mL NaCl 0,9% ☐ 100 mg (1x 20 mL) ad 250 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Veklury_remdesivir	Pompe volumétrique
7160	Ventolin IVD 50 mcg/1mL	**VENTOLIN** - salbutamol 0, 5 mg (1x1 mL) + 9 mL eau ppi **1 mL = 50 microgr.** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
8441	Ventolin 5 mg/50mL	**VENTOLIN** - salbutamol **3 mL/h = 5 microgr./min** 5 mg (1 x 5 mL) + 45 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Ventolin 5mg/50mL	Pousse-seringue *Sipharom*
7534	Ventolin 5 mg/500mL	**VENTOLIN** - salbutamol A perfuser en ..... min. 5 mg (1x 5mL) + 500 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% Date:.....H:.....Visa:..... Ventolin 5 mg/500 mL	Pompe volumétrique
10204	Ventolin Ped. im, sc 0,5 mg/ 1mL	**VENTOLIN Ped.** - salbutamol IM, SC **PUR 1 mL = 0,5 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
10205	Ventolin Ped. pousse-seringue	**VENTOLIN Ped.** - salbutamol **1 mL/h = 0,01 microgr./ kg/ min** 5 mg/ 5 mL = 1 mg / 1 mL à diluer selon ordre médical à: .....mL ad 50 mL NaCl 0,9% Date:.....H:.....Visa:..... Ventolin Ped.	Pousse-seringue, pédiatrie

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8539	Verapamil 50mg/50mL	VERAPAMIL concentré 1 mL/h = 1 mg/h 50 mg (10 x 2mL) + 30 mL □ NaCl 0,9% □ G5% stable 8h Date:.....H:.....Visa:..... Vérapamil 50mg/50mL	Pousse-seringue
10870	Verdye 25 mg	VERDYE - vert d'indocyanine 25 mg (1 fiole) + 10 mL eau ppi 1 mL = 2,5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
14325	Vitamin B1 Hevert	VITAMIN B1 - thiamine 100 mg = 1 mL IVD lent / i.m Date:.....H:.....Visa:.....	Seringue
12296	Voie proximale VVC	VOIE PROXIMALE VVC VOIE PROXIMALE	Pour identification des voies d'une VVC
12297	Voie médiane VVC	VOIE MEDIANE VVC VOIE MEDIANE	Pour identification des voies d'une VVC
12298	Voie distale VVC	VOIE DISTALE VVC VOIE DISTALE	Pour identification des voies d'une VVC

2.2. Etiquettes diverses (hors Praxikett®)

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8556	Allergie petite étiquette	! ALLERGIE ! M/Mme ..... Allergie à	
5990	Allergie grande étiquette	! ALLERGIE ! M / Mme ..... est allergique ou présente une intolérance à : .... Réaction observée :	

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8557	AMSure® (= eau stérile pour inhalation)	**AMSure®** Eau stérile pour inhalation Ouvert le: ..... A utiliser dans les 30 jours (excep. nouveau-né prématuré: 1 semaine) jusqu'au: ..... VISA:	
14388	AQUAPAK® (= eau stérile pour inhalation)	**AQUAPAK®** Eau stérile pour inhalation Ouvert le: ..... A utiliser dans les 30 jours (excep. nouveau-né prématuré: 1 semaine) jusqu'au: ..... VISA:	
7797	Stabilité après ouverture	Ouvert le : ..... Ne pas utiliser après le :	
13678	Identification des anesthésiques locaux	ANESTHESIQUES LOCAUX NE PAS INJECTER PAR VOIE I.V	Pour la SdR (EHC)

2.3. Etiquettes *per os* pour gobelets (hors Praxikett®)

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
11164	Distraneurin capsule 192 mg	DISTRANEURIN capsule 192 mg clométhiazole (= 300 mg édésilate clométhiazole) Résident: …….. Date: …….. H :…… Visa :……	
11165	Distraneurin sirop 125 mg	DISTRANEURIN sirop (clométhiazole édisilate) 2,5 mL = 125 mg Résident: …….. Date: …….. H :…… Visa :……	
11166	Distraneurin sirop 250 mg	DISTRANEURIN sirop (clométhiazole édisilate) 5 mL = 250 mg Résident: …….. Date: …….. H :…… Visa :……	
11167	Etiquette vierge EMS	Médicament : Résident: …….. Date: …….. H :…… Visa :……	
11168	Haldol gouttes	HALDOL gouttes …….. gouttes = ……. mg Résident: …….. Date: …….. H :…… Visa :……	
8569	Hydromorphone sol. 1 mg/mL	HYDROmorphone 1 mg/mL …… mg = …… mL Patient: …….. Date: …….. H :….. Visa :…… Voie orale. A utiliser dans les 24h	
8570	Hydromorphone sol. 5 mg/mL	HYDROmorphone sol. 5 mg/mL …… mg = …… mL Patient: …….. Date: …….. H :….. Visa :…… Voie orale. A utiliser dans les 24h	
8567	Méthadone sol. 10 mg/mL	Méthadone sol. 10 mg/mL …… mg = …… mL Patient: …….. Date: …….. H :….. Visa :…… Voie orale. A utiliser dans les 24h	
8566	Morphine sol. 1 mg/mL	Morphine sol. 1 mg/mL …… mg = …… mL Patient: …….. Date: …….. H :….. Visa :…… Voie orale. A utiliser dans les 24h	

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
8565	Morphine sol. 20 mg/mL	Morphine sol. 20 mg/mL ..... mg = ... mL Patient: ..... Date: ..... H :..... Visa :..... Voie orale. A utiliser dans les 24h	
13679	Morphine caps 1 mg	MORPHINE 1 mg Résident: ..... Capsule. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
13680	Morphine caps 2 mg	MORPHINE 2 mg Résident: ..... Capsule. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
8571	MST continus cp 10 mg	MST continus 10 mg Résident: ..... Comprimé. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
11163	MST continus sachets 20 mg	MST cont. 20 mg sachets Résident: ..... Sachet. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
8572	Oxycodone cp 5 mg	OxyCODONE 5 mg Résident: ..... Comprimé. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
8573	Oxycodone cp 10 mg	OxyCODONE 10 mg Résident: ..... Comprimé. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
8900	Oxycodone cp 20 mg	OxyCODONE 20 mg Résident: ..... Comprimé. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
9116	Oxynorm caps 5mg	OxyNORM 5 mg Résident: ..... Capsule. Voie orale Date: ..... H :..... Visa :.....	
8568	Oxynorm sol. 10 mg/mL	OxyNORM sol. 10 mg/mL ..... mg = ... mL Patient: ..... Date: ..... H :..... Visa :..... Voie orale. A utiliser dans les 24h	

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
10166	Targin cp 5/2,5 mg	TARGIN 5/ 2,5 mg Résident: …….. Comprimé. Voie orale Date: …….. H :…… Visa :……	
9972	Targin cp 10/5 mg	TARGIN 10/5 mg Résident: …….. Comprimé. Voie orale Date: …….. H :…… Visa :……	
8901	Temgesic cp subl. 0,2 mg	TEMGESIC 0,2 mg Résident: …….. Comprimé sublingual Date: …….. H :…… Visa :……	
8902	Temgesic cp subl. 0,4 mg	TEMGESIC 0,4 mg Résident: …….. Comprimé sublingual Date: …….. H :…… Visa :……	

* 8 étiquettes / feuille pour grand modèle * 60 étiquettes / feuille pour petit modèle * 40 étiquettes / feuille pour modèle Stupéfiants oraux

2.4. Etiquettes pour l'oncologie/hématologie

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
		Perfusions	
9004	**FERINJECT**	**FERINJECT** ☐ Dose entre 100 et 200 mg : ____mg, + 50 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. ☐ Dose entre 201 et 500 mg : …. mg, + 100 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. ☐ Dose entre 501 et 1000mg: ___mg, + 250 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. date :…….. h :……. visa :…….	
9512	**FERINJECT**	Nom du patient : …… **FERINJECT** ☐ Dose < **500 mg** : …….. mg, ad 100 mL NaCl 0,9% A perfuser en min.30 min. ☐ Dose < **1000 mg** :……mg, ad 250 mL NaCl 0,9% perfuser en min.30 min. date :…….. h :……. visa :…….	

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
13379	**IVEMEND + MEPHAMESON**	*Prémédication oncologie* 150 mg **Ivemend**® + ... mg **Méphameson**® **ad** 150 mL NaCl 0,9% A perfuser en 20 min. Date:.....H:.....Visa:..... Ivemend + Mephameson	
13380	**ONDANSETRON + MEPHAMESON**	*Prémédication oncologie* ..... mg **Ondansetron**® + ... mg **Méphameson**® **+** 100 mL NaCl 0,9% A perfuser en 15 min. Date:.....H:.....Visa:..... Ondenstron + Mephameson	
9513	**MEPHAMESONE 50 – 100 mL NaCl 0,9%** Dexamethasone phosphate disodique	Nom du patient : ..... **MEPHAMESONE** *dexaméthasone phos. disodique* ..... mg (.....ml) + 50 -100 ml NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min**.. date : .....h : .....visa :	Couleur verte pâle pour corticoïdes
9513b	**MEPHAMESONE 100 mL NaCl 0,9%** Dexamethasone phosphate disodique	Nom du patient : ..... **MEPHAMESON®** *Dexaméthasone phosphate sodique* ..... mg (.....mL) dans 100 mL NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min**. date : .....h : .....visa :	Couleur verte pâle pour corticoïdes
9516	**ONDANSETRON 100 mL NaCl 0,9%**	Nom du patient : ..... **ONDANSETRON** *ondansetron* ..... mg (..... ml) 100 ml NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min**. date : .....h : .....visa :	Couleur rose pour système gastro-intestinal

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
9516b	**ONDANSETRON 50 – 100 mL NaCl 0,9%**	Nom du patient : ..... **ONDANSETRON** *ondansetron* ..... mg (..... ml) + 50 -100 ml NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min.** date : .....h : .....visa :	
9517	**PANTOPRAZOLE**	Nom du patient : ..... **PANTOPRAZOL** *pantoprazol* 40 mg (10 ml reconst.) + 50 -100 ml NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min.** date : .....h : .....visa :	
9518	**TAVEGYL** Clémastine	Nom du patient : ..... **TAVEGYL** *clémastine* ..... mg (.....ml) 100 ml NaCl 0,9% **Perfuser en 15 min.** date : .....h : .....visa :	
Seringues			
9520	**ALOXI**	Patient :..... **ALOXI – IVD** **PUR 5 mL = 0,25 mg** injecter en 30 s. Date: ..... H :..... Visa :..... Patient :.....	
7463	**ATROPINE**	**ATROPINE** **PUR 1 mL = 0,5 mg** Date:.....H:.....Visa:.....	Couleur verte du code couleur international pour les anticholinergiques
9521	**ATROPINE**	Patient :..... **ATROPINE – s.c** **PUR 1 mL = 0,5 mg** Date: ..... H :..... Visa :..... Patient :.....	Couleur verte du code couleur international pour les anticholinergiques

N° art.	Désignation	Etiquette	Remarque
9522	**LASIX**	Patient :…… **LASIX** – IVD lent **PUR 1 mL = 10 mg** max. 4 mg/min Date: …….. H :…… Visa :…… Patient :……	
9523	**LEUCOVORIN** Acide folinique	Patient :… … … … … … … .. **LEUCOVORIN** - IVD lent **PUR 10 mL = 30 mg** Date: …….. H :…… Visa :……	
9520b	**PALONOSETRON**	Patient :…… **PALONOSETRON** – IVD **PUR 5 mL = 0,25 mg** injecter en 30 s. Date: …….. H :…… Visa :……	Couleur rose pour système gastro-intestinal
9525b	**SOLU-MODERIN** Methylprednisolone succ. sodique	Patient :…… **SOLU- MODERIN** - IVD lent **PUR**…… **mL** = …… **mg** Date: …….. H :…… Visa :……	
7257	**TAVEGYL**	**TAVEGYL** - clémastine **PUR 1 mL = 1 mg** *IVD lent* Date:……H:……Visa:……	
Divers *per os*			
10584	**DEXAMETHASONE**	Nom du patient : **DEXAMETHASONE** **20 mg** Avaler……cps après un repas Le …… à …… Le …… à …… Le …… à …… Le …… à …… n° lot : Date exp :	Générique du Fortecortin®

2.5. Etiquettes en rouleaux (Anesthésie)

0N° art.	Désignation	Etiquettes	Nombre rouleaux *(minimum 5)*
13665	Ampres 3% PUR 1 mL = 30 mg	AMPRES 3% - chloroprocaine PUR 1 mL = 30 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
11612	Bridion 100 mg/1mL (EHC)	BRIDION PUR 1 mL = 100 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
14015	CATApresan - Clonidine à diluer 1mL = 15 mcg	CATApresan - clonidine IVD lent A diluer: 1 mL = 15 mcg Date:.....H:.....Visa:.....	
11748	Dexdor 200 microgr./ 20 mL	DEXDOR - dexmédétomidine 1 mL/h = 10 microgr./h 200 microgr. (1 x 2 mL) + 18 mL ☐NaCl 0,9% ☐G5% Date:.....H:.....Visa:.....	
7123	Dropéridol 0,5 mg/1mL	DROperidol PUR 1 mL = 0,5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7124	Ephédrine 5 mg/1mL	ePHEDrine PUR 1 mL = 5 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
13919	Etiquette vierge	Date:.....H:.....Visa:.....	
7156	Fentanyl pur 50 microgr./ 1mL (GHOL)	FentaNYL PUR 1 mL = 50 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	
7129	Kétamine pure 10mg/ 1mL	KETamine PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7130	Lidocaïne …% (EHC)	LIDOcaïne .....% Date:.....H:.....Visa:.....	
7131	Lidocaïne CO_2 2% pure	LIDOcaïne CO2 2% PUR 1 mL = 20 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
9005	Méphamésone pur IVD 8 mg/2mL	MEPHAMESONE PUR 2 mL = 8 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7133	Morphine 1 mg/1mL IVD	Morphine IVD lent 1 mL = 1 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
10766	Ondansétron 2 mg/ 1mL	ONDANsétron IVD lent PUR 1 mL = 2 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7139	Phényléphrine 100 microgr./1mL	PHENYLEPHRINE PUR 1 mL = 100 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	

0N° art.	Désignation	Etiquettes	Nombre rouleaux *(minimum 5)*
7148	Propofol 1 % pur 10 mg/1mL	**PROPOFOL 1%** PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
13920	Rapidocaïne pure 1%	**RapiDOCAÏNE 1%** PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
8632	Rapidocaïne pure 2 %	**RapiDOCAÏNE 2%** PUR 1 mL = 20 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
7153	Robinul-Néostigmine pur	**Robinul / Neostigmine** PUR 1 mL = 0,5 mg + 2,5 mg Date:_____H:_____Visa:_____	
7759	Rocuronium pur 10 mg/1mL	**ROCuronium** PUR 1 mL = 10 mg Date:.....H:.....Visa:.....	
10481	Sufenta 5 microgr./ 1mL	**SUFenta** PUR 1 mL = 5 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	
13921	Syntocinon 5 UI / 100 mL	**SyntoCINON** - oxytocine 5 UI (1x 1 mL) + 100 mL ☐ NaCl 0,9% ☐ G5% ☐ RL 1 mL = 50 milli UI Date:.....H:.....Visa:.....	
9511	Ultiva 60 microgr./1mL (EHC)	**ULTIVA** 1 mL = 60 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	
11581	Ultiva 20 microgr./1mL (GHOL)	**ULTIVA** 1 mL = 20 microgr. Date:.....H:.....Visa:.....	