


**AKINETON (bipéridène lactate)**

Antiparkinsonien

<b>Présentation</b>	Ampoule 5 mg / 1mL	
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>
<b>IM :</b> <i>Administration</i> : Sans dilution supplémentaire. <sup>1</sup>	<b>pH :</b> 4,8- 5,8	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> 260-270 mOsm/kg
	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -	<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b>
	<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de la lumière <sup>2</sup>	<b>ATTENTION :</b> Sauf en cas d'urgence, éviter tout arrêt brusque du médicament → réduire la posologie lentement et progressivement. <sup>2</sup>
		
	<b>Stabilité après ouverture :</b> <u>Sol. mère</u> : 12h à T amb. <sup>0</sup>	<b>Principaux risques / EI :</b> Tachycardie, hypoTA, <sup>1</sup> fatigue, vertige, céphalée, obnubilation, sécheresse buccale, troubles de l'accommodation, ↓ transpiration, constipation, troubles gastriques, ↑ FC, à fortes doses : agitation, anxiété, état confusionnel, délire. <sup>2</sup>
<b>IVD lent :</b> <i>Administration</i> : Sans dilution supplémentaire. <sup>1</sup> <i>Durée</i> : Injecter lentement sur 3 à 5 minutes <sup>60</sup>		<b>Surveillance :</b> FC, TA
		<b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b> Ne pas mélanger avec d'autres médicaments. <sup>2</sup>