


**BENZETACIL (benzylpénicilline benzathine = pénicilline G benzathine)****Anti-infectieux (pénicillines)**

<b>Présentation</b>	Ampoule sèche 1,2 million (mio) d'unités internationales (UI) (= « 1,2 Mega ») + solvant (eau ppi) 4 mL Ampoule sèche 2,4 million (mio) d'unités internationales (UI) (= « 2,4 Mega ») + solvant (eau ppi) 6 mL									
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>								
<b>IM :</b>  <u>Reconstitution :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1,2 mio UI + 4 mL eau ppi fournie</b> <sup>125</sup> → ≈ 300 000 UI/ mL</li> <li>• <b>2, 4 mio UI + 6 mL eau ppi fournie</b> <sup>125</sup> → ≈ 400 000 UI/ mL</li> </ul> <u>Administration :</u> <b>sans dilution</b> supplémentaire <sup>125</sup>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="913 316 1093 435"><b>pH :</b> ND</td> <td data-bbox="1093 316 1426 435"><b>Osmolarité/ osmolalité :</b> ND</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="913 435 1426 627"><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b>  Utilisez impérativement des aiguilles de diamètre 0,9 mm (20 G) minimum pour prélever la solution reconstituée. <sup>125</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="913 627 1426 715"><b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25 °C). <sup>125</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="913 715 1426 1394"><b>Stabilité après ouverture :</b>  <u>Sol. mère :</u> utilisation immédiate. <sup>125</sup></td> </tr> </table>	<b>pH :</b> ND	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> ND	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b>  Utilisez impérativement des aiguilles de diamètre 0,9 mm (20 G) minimum pour prélever la solution reconstituée. <sup>125</sup>		<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25 °C). <sup>125</sup>		<b>Stabilité après ouverture :</b>  <u>Sol. mère :</u> utilisation immédiate. <sup>125</sup>		<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b>  <b>ATTENTION :</b> - Vérifier que le patient ne soit pas allergique aux pénicillines.   - Médicament sound-alike: attention <b>Ne pas confondre avec Pénicilline Grünenthal !!</b>  - Médicament étranger remplaçant le Penadur® - <b>Ne jamais injecter en i.v ni en s.c !</b> <sup>126</sup>  <b>Principaux risques / EI :</b> Réaction anaphylactique, réaction, douleur et induration au site d'injection, diarrhée  <b>Surveillance :</b>  site d'injection, signe d'intolérance  <b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b>  Ne pas mélanger avec d'autres médicaments
<b>pH :</b> ND	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> ND									
<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b>  Utilisez impérativement des aiguilles de diamètre 0,9 mm (20 G) minimum pour prélever la solution reconstituée. <sup>125</sup>										
<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25 °C). <sup>125</sup>										
<b>Stabilité après ouverture :</b>  <u>Sol. mère :</u> utilisation immédiate. <sup>125</sup>										