



**BUSCOPAN INJECT (scopolamine butylbromure)****Spasmolytique anticholinergique**

<b>Présentation</b>	Ampoule 20 mg / 1 mL	
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>
<b>IVD lent : voie principale</b>  <i>Administration</i> : Sans dilution. <sup>1</sup>  étiquette n° 8922  <i>Durée</i> : en 2 min. minimum <sup>1</sup>	<b>pH</b> : 3, 7 – 5,5 <b>Osmolarité/ osmolalité</b> : 247-312 mosmol/kg	<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres</b> : -
<b>PI</b> :  <i>Dilution</i> : dose prescrite dans 50 à 100 mL de NaCl 0,9% ou G5% <sup>1</sup>  <i>Administration</i> : par gravité, par voie centrale ou périphérique <sup>1</sup>  <i>Durée</i> : en 15 min. <sup>1</sup>	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...)</b> : -	<b>ATTENTION</b> : S'assurer de l'absence d'altérations des fonctions cognitives, d'agitation ou d'hallucinations avant de renouveler l'injection. <sup>4</sup>
<b>SC</b> :  <i>Administration</i> : Sans dilution. <sup>1</sup>  étiquette n° 8922	<b>Mode de conservation</b> : Température ambiante (15-25 °C). <sup>2</sup>	<b>Principaux risques / EI</b> : Tachycardie, épaissement des sécrétions bronchiques, constipation, sécheresse buccale, diminution de la sécrétion lacrymale, confusion mentale, rétention urinaire, troubles intestinaux, hypotension. <sup>4, 1</sup>
<b>IM</b> :  <i>Administration</i> : Sans dilution. <sup>1</sup> Dans un large muscle <sup>86</sup>	<b>Stabilité après ouverture</b> :  <i>Sol. mère</i> : utilisation immédiate <sup>1</sup>	<b>Surveillance</b> :  <b>Principales incompatibilités (mélange + Y)</b> : Co-amoxicilline, diclofenac. Pour floxapen, furosémide et tramadol : attention vérifier compatibilité selon concentration. <sup>70</sup>