

CALCIPARINE (héparine calcique) (= CALCIPARINA)**Anticoagulant**

Présentation	Seringue prête à l'emploi 5000 UI / 0,2 mL		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités
SC : <i>Administration:</i> Sans dilution. ¹¹² Injecter dans le tissu sous-cutané dans la face antérieure de la cuisse, alternativement du côté droit et du côté gauche. Ne pas masser après l'injection. (extrapolation de 91) <u>Durée</u> : très lentement en min. 30 sec. (extrapolation de 91)	pH : 5 – 7,5 ⁶⁰	Osmolarité/ osmolalité : ND	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : -
	Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -		ATTENTION : - Antidote si surdosage = Protamine - Pour les détails Cf. document « HEPARINE NON FRACTIONNEE » : Rappels pour la prescription, préparation et administration chez l'adulte, en annexe à la fin du MMI
	Mode de conservation : Température ambiante (15-25°C) ¹¹²		Principaux risques / EI : Thrombopénie, ⁴ hémorragie, allergie, ² nécrose cutanée possible, ⁸⁵ hématome au site d'injection ¹¹²
	Stabilité après ouverture : Utilisation immédiate ¹¹²		
		Principales incompatibilités (mélange + Y) : -	