


**CELESTAN SOLUBLE (bétaméthasone phosphate disodique)**

Glucocorticoïde

<b>Présentation</b>	Ampoule 4 mg / 1 mL	
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>
<b>IM :</b>  <i>Administration</i> : sans dilution <sup>4</sup>	<b>pH :</b> ND	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> ND
<b>IVD :</b>  <i>Administration</i> : Sans dilution. <sup>4</sup>  <i>Durée</i> : en 1 min. <sup>57</sup>  Max 20 mg (5 mL) en une dose. <sup>57</sup>	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -	<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b> -
<b>PI :</b>  <i>Dilution</i> : diluer la dose prescrite dans 100 mL de NaCl 0,9%  <i>Administration</i> : Par gravité par voie périphérique  <i>Durée</i> : 15 à 30 min. <sup>86</sup>	<b>Mode de conservation :</b>  Température ambiante (15-25°C) <sup>2</sup> et à l'abri de la lumière. <sup>56</sup>  	<b>ATTENTION :</b>  - Remplace le Celestène®  - <u>Equivalences</u> : 1 mg bétaméthasone = 1,25 mg dexaméthasone = 6,5 mg triamcinolone ou méthylprednisolone = 8,5 mg prednisone ou prednisolone = 35 mg hydrocortisone = 40 mg cortisone <sup>2</sup>
<b>Intra / péri-articulaire, parties molles, intra-lésionelle, péri-oculaire :</b>  <i>Administration</i> : Sans dilution. <sup>4, 86</sup>	<b>Stabilité après ouverture :</b>  <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate <sup>56</sup>	<b>Principaux risques / EI :</b>  Tbles du rythme si injection IV trop rapide rash cutané, urticaire... <sup>4</sup>  <b>Surveillance :</b>
		<b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b>