CLARITHROMYCINE (clarithromycine lactobionate)

Anti-infectieux (macrolides)

Présentation Ampoule 500 mg

Reconstitution / Dilution / Administration

PI :

Reconstitution : 500 mg + 10 mL **eau ppi** → 50 mg / mL [2]

Dilution : dans NaCl 0,9% ou G5%

- 500 mg (10 mL) + 250 mL → ~ 2 mg / mL[2]
- 500 mg (10 mL) + 100 mL → ~ 5 mg / mL *(VVC uniquement)*

Concentrations max : VVP = 2 mg / mL [1, 85]
VVC = 5 mg / mL [1, 85, 86]

Administration: **par pompe,** par voie centrale ou périphérique [1]

Durée : 60 minutes [1]

Informations techniques

pH :
4 - 6

Osmolarité/ osmolalité :
134-137 mOsmol/kg

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):
-

Mode de conservation :
Température ambiante (15-25°C) [2] et à l'abri de la lumière. [2]

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : 24h au frigo [164]

Sol. diluée : 6h à T amb[112]
ou 24h au frigo [164]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :

ATTENTION :

- Générique du Klacid®
- Reconstituer uniquement avec de l'eau stérile (sinon précipitation)! [2]
- Ne pas injecter directement la solution mère! [2]
  Ne jamais injecter non dilué !
- Si perfusion trop rapide : risque d'arythmies cardiaques [1]
- Risque de dommages tissulaires graves si extravasation. ➔ Pharmpic.ch

Principaux risques / EI :

Céphalée, modification du goût et de l'odorat, insomnie, asthénie, prurit, troubles gastro-intestinaux, irritation et douleur au site d'injection, phlébite, réactions allergiques, arythmies, confusion, hallucinations [2]

Surveillance :
Trajet veineux, site d'injection, signes d'intolérance

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Se référer au tableau de compatibilités en Y de la PIC.