

CYMEVENE (ganciclovir)

Antiviral

Présentation Ampoule sèche 500 mg

Reconstitution / Dilution / Administration

PI :

Reconstitution :

500 mg (secs) + 10 mL eau ppi uniquement et agiter vigoureusement → 50 mg/mL ¹¹²

Dilution : avec NaCl 0,9%, G5%, RL

500 mg (1x10 mL) + 100 mL → 4,5 mg/mL ¹¹²

C_{max} : 10 mg/mL ^{112, 6}

Administration : par **Pompe**, sur voie centrale ou veine périphérique de gros calibre ⁶

Durée : 1h ⁶⁰

Tourner la page svp

Informations techniques

pH :
11 ⁸⁵

Osmolarité/ osmolalité :
314 mOsmol/kg
(sol. reconstituée) ⁸⁵

Matériel spécial (filtres/ tubulures...) :

-

Mode de conservation :

Température ambiante (15-25 °C) ¹¹²

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :

-



ATTENTION :

- Ne pas injecter en bolus !
- Pendant les heures d'ouvertures de la PIC, la solution est normalement préparée par la PIC.
- Si la solution ne peut pas être reconstituée par la PIC : veuillez porter des gants en nitrile, un masque FFP2, des lunettes de protection et une surblouse à manches longues. Faire les manipulations sur une surface absorbante (ex : alèse)



- Pour l'EHC : veuillez-vous référer à la procédure institutionnelle pour la préparation du Cymevene®
- Une infirmière enceinte ou qui allaite ne doit pas manipuler ni administrer Le Cymevene®.
- Le ganciclovir ne doit pas être mis au contact de la peau ou des muqueuses. En cas de contamination, les zones touchées doivent être immédiatement rincées avec une quantité suffisante d'eau. ²
- Eliminer les perfusions vides dans une poubelle bleue à cytostatiques. En l'absence de celle-ci : éliminer la perfusion dans la poubelle jaune de la filière des infectieux.
- Eliminer les gants violets dans une poubelle jaune de la filière des infectieux, puis se laver les mains à l'eau et au savon.



		- Risque de dommages tissulaires graves si extravasation. 85
	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : 12h à T° amb. 112 Ne pas réfrigérer	Principaux risques / EI : Phlébites, Nausées, diarrhées, vomissements, confusion, vertiges, réactions d'hypersensibilité, dermatite, fièvre, réactions au site d'injection, ... 112, 6, 86
		Surveillance : Point de ponction, réactions d'hypersensibilité
	<u>Sol. diluée</u> : 24h au frigo 112 	Principales incompatibilités (mélange + Y) : Parabènes Ne pas mélanger avec d'autres médicaments.