




**DEPAKINE (valproate de sodium)**

Antiépileptique

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Présentation</b>  | Fiole sèche 400 mg (+ solvant 4 mL = eau ppi)  |   |
| <b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>  | <b>Informations techniques</b>   | <b>Particularités</b>   |
| <b>IVD lent:</b><br><u>Reconstitution</u> : 400 mg + 4 mL eau ppi → c = 95 mg/mL <sup>1</sup><br><u>Administration</u> : Sans dilution. <sup>1</sup><br><u>Durée</u> : Injecter en 3 - 5 min. <sup>1</sup>   | <p><b>pH</b> : 6,8 – 8,5</p> <p><b>Osmolarité/ osmolalité</b> : ND</p>   | <p><b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres</b> :</p> <p>1 ampoule contient 2,4 mmol de Na<sup>+</sup></p>  |
| <b>PSSC : voie non officielle utilisée en Soins palliatifs</b><br><u>Reconstitution</u> : 400 mg + 4 mL eau ppi → c = 95 mg/mL <sup>1</sup><br><u>Dilution</u> : avec NaCl 0,9% (volume à définir) (case report <sup>149</sup> )   | <p><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...)</b> :</p> <p>-</p> <p><b>Mode de conservation</b> :</p> <p>Température ambiante (15-25°C)<sup>2</sup></p>   | <p><b>ATTENTION</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le volume du lyophilisat reconstitué est de 4,2 mL ce qui donne une concentration de 95 mg/mL</li> </ul> <p>- <b>Risque de dommages tissulaires graves si extravasation.</b></p>    |
| <b>PI / PC:</b><br><u>Reconstitution</u> : 400 mg + 4 mL eau ppi → c = 95 mg/mL <sup>1</sup><br><b>Par pompe :</b><br><u>Dilution</u> : 400 mg (4,2 ml) + 100 mL NaCl 0,9% ou G5% <sup>1,6</sup><br><u>Administration</u> : par voie centrale ou périphérique <sup>1</sup><br><u>Durée</u> : 400 mg en 1h <sup>1,4</sup><br><u>Débit max.</u> = 20 mg/min <sup>1,85</sup><br>Le débit de perfusion peut varier selon status épileptique. <sup>2</sup><br><b>Par PS :</b><br><u>Dilution</u> : 2400 mg (6x 4,2 mL) + 24 mL NaCl 0,9% <sup>66: SIPHAROM</sup><br>→ ≈ 50 mg/mL<br> étiquette n° 8421<br><u>Administration</u> : par voie centrale ou périphérique <sup>1</sup> | <p><b>Stabilité après ouverture</b> :</p> <p><u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate<sup>1</sup></p> <p><u>Sol. diluée</u> : 24h au frigo.<sup>2</sup></p>  | <p><b>Principaux risques / EI</b> :</p> <p>Réaction allergique,<sup>2</sup> rash cutané, N&amp;V, vertige, somnolence<sup>4</sup>, confusion, réaction et brûlure au site d'injection<sup>6,1</sup></p> <p><b>Surveillance</b> :</p> <p>Site d'injection, trajet veineux, signe d'intolérance, TA...</p> <p><b>Principales incompatibilités (mélange + Y)</b> :</p> <p>Ne pas mélanger avec d'autres médicaments<sup>85</sup></p> |