


**DICYNONE (étamsylate)****Hémostatique**

<b>Présentation</b>	Ampoule 250 mg / 2 mL → 125 mg/mL	
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>
<b>IM :</b>  <u>Administration:</u> Sans dilution <sup>4</sup>	<b>pH :</b> 6 – 6,5	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> ND
	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -	<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b> Contient des <b>sulfites</b> (E 223) <sup>4</sup> → risque d' <b>allergie</b> + choc anaphylactique chez des asthmatiques ou personnes hypersensibles aux sulfites.
	<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25°C) <sup>2</sup> et à l' <b>abri de la lumière.</b> <sup>2</sup>  	
	<b>Stabilité après ouverture :</b>  <u>Sol. mère :</u> utilisation immédiate <sup>53</sup>	<b>ATTENTION :</b> - IV : prudence chez les patients hypotendus, en raison du risque de baisse de TA. <sup>2</sup>  - Ne pas utiliser les ampoules Dicynone 250 si la solution est colorée. <sup>2</sup>
<b>IVD lent:</b>  <u>Administration:</u> Sans dilution <sup>4</sup>  <u>Durée :</u> Injecter en <b>3 à 5 minutes</b> <sup>53</sup>	<b>Principaux risques / EI :</b> N&V, diarrhées, céphalée, fièvre, éruptions cutanées, <sup>4</sup> hypoTA, hypotonie <sup>1</sup>	
	<b>Surveillance :</b> Signe d'intolérance, TA	
		<b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b>  La thiamine (vit. B1) est inactivée par le sulfite contenu dans Dicynone. Si une perfusion de dextran est nécessaire, Dicynone doit être injectée auparavant