

DILTIAZEM 50 mg (diltiazem HCl) importé du JAPON
Inhibiteur calcique

Présentation		Ampoule sèche 50 mg	
Reconstitution / Dilution / Administration		Informations techniques	Particularités
IVD : (Urgences) <u>Reconstitution</u> : 50 mg + 10 mL NaCl 0,9% → 5 mg/mL Att ! la fiole a une capacité maximale de 5 mL <u>Administration</u> : Sans dilution supplémentaire <u>Durée</u> : Injecter en 2 min. ^{1, 99, 160} Dose selon OM. Si une deuxième injection est nécessaire, attendre 15 min. ¹⁶⁰		pH : 5,1 Osmolarité/ osmolalité : ND	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : -
PC (SI adultes, Urgences): <u>Reconstitution</u> : 50 mg + 5 mL NaCl 0,9% ou G5% → 10 mg/mL <u>Dilution</u> : à 1 mg/mL avec NaCl 0,9% ou G5% : ^{1, 160} 100 mg (2 x 5 mL) + 90 mL → 1 mg/mL 250 mg (5 x 5 mL) + 225 mL → 1 mg/mL <u>Administration</u> : par pompe , par voie centrale ou périphérique <u>Débit</u> : selon OM, compris entre 5 - 15 mg / h ^{99, 160} 1 mL/ h = 1 mg / h ¹		Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -	ATTENTION : Médicament japonais remplaçant Diltiazem inj 50 mg/10 mL importé des US
PC (SI adultes, Urgences): <u>Reconstitution</u> : 50 mg + 5 mL NaCl 0,9% → 10 mg/mL <u>Dilution</u> : 50 mg (1 x 5 mL) + 45 mL NaCl 0,9% → 1 mg / mL ^{66: SIPHAROM}  étiquette n°15078 <u>Administration</u> : par PS par voie centrale ou périphérique ¹ <u>Débit</u> : selon OM, compris entre 5 - 15 mg / h ^{99, 160} 1 mL/ h = 1 mg / h ¹		Mode de conservation : Température ambiante (15-25°C)	
		Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate <u>Sol. diluée</u> : 24 h à T° amb. ¹⁶⁴	Principaux risques / EI : HypoTA, bradycardie, bloc AV, ⁴ vertiges, céphalée, fatigue ¹
			Surveillance : TA, monitoring cardiaque
			Principales incompatibilités (mélange + Y) : Bicarbonate de sodium, acyclovir, ampicilline, insuline, furosémide, méthylprednisone sod. succinate, phénytoïne, rifampicine....