

DOXYCYCLIN-Piramal (doxycycline hyclate)

Anti-infectieux (tétracyclines)

Présentation		Ampoule sèche 100 mg			
Reconstitution / Dilution / Administration		Informations techniques		Particularités	
PI : (voie de préférence) <u>Reconstitution</u> : avec eau PPI, NaCl 0,9% ou G5% • 100 mg + 10 mL → c = 10 mg/mL <u>Dilution</u> : avec NaCl 0,9% ou G5% pour obtenir une concentration entre 0,1 et 1 mg/mL ^{1,172} Ex : 100 mg (1x 10 mL) + 100 mL → 1 mg/mL 200 mg (2x 10 mL) + 250 mL → 0,8 mg/mL <u>Administration</u> : par gravité par voie centrale ou périphérique ¹ <u>Durée</u> : 1 - 4 heure(s) ^{1,172} (minimum 1h pour 100 mg)		pH : 1,8-3,3		Osmolarité/ osmolalité : -	
		Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -		ATTENTION : - La solution est de couleur jaune. Ne pas utiliser une solution ayant changé de couleur . ¹¹² - Garder à l'abri de la lumière directe du soleil pendant la perfusion. ¹⁷²	
		Mode de conservation : T amb (20-25°C) et à l'abri de la lumière ; ne pas congeler. ^{1,172} 			
		Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : 24h au frigo. ^{1,172} <u>Sol. diluée</u> : 12h à T amb, éviter lumière directe du soleil . ¹		Principaux risques / EI ^{1,172} Irritation au point d'injection, troubles gastro-intestinaux, N&V, céphalées, réaction d'hypersensibilité dont choc anaphylactique, œdème de Quincke, réaction de photosensibilité (érythème, œdème cutané, cloque), éruption cutanée, thrombophlébite, thrombocytopénie, colite pseudomembraneuse, insomnie, dépression Surveillance : Site d'injection, signes d'intolérance Principales incompatibilités (mélange + Y) : allopurinol, héparine , pipéracilline / tazobactam... ⁵	