



**DROPERIDOL (dropéridol)**

Neuroleptique

<b>Présentation</b>	Ampoule 1 mg / 2 mL → 0,5 mg/mL	
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>
<b>IM :</b> <u>Administration:</u> Sans dilution <sup>1</sup>	<p><b>pH :</b> 3- 3,8</p> <p><b>Osmolarité/ osmolalité :</b> hypotonique</p> <p><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -</p> <p><b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25°C) <sup>1,2</sup> et à l'abri de la lumière. <sup>2,4</sup></p> 	<p><b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b> -</p> <p><b>ATTENTION :</b> - IVD : Intervalle entre chaque dose: minimum 8 heures (selon OM) <sup>1</sup></p>
<b>IVD lent :</b> <u>Administration:</u> Sans dilution <sup>1</sup>	<p><b>Stabilité après ouverture :</b> Sol. mère : 12h T amb. à l'abri de la lumière <sup>1</sup></p>	<p><b>Principaux risques / EI :</b> hypoTA, tachycardie réflexe, dyskinésie, syndrome extrapyramidal, sédation, réaction anaphylactique <sup>4</sup> arythmie, prolongation du QT. <sup>1</sup></p> <p><b>Surveillance :</b> IVD : monitoring cardiaque jusqu'à 3h après l'injection vu les risques d'arythmies et d'hypotension. <sup>1</sup></p> <p><b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b> Allopurinol, céfépime, furosémide, héparine, piperacilline / tazobactam <sup>5</sup></p>
<p> étiquette n° 7123</p> <p><u>Durée / Débit :</u> lentement : 1 mL / min, en raison du risque d'hypotension. <sup>1</sup></p>		