FLOXAPEN (flucloxacilline sodique)

Anti-infectieux (pénicillines)

Présentation Ampoule sèche 1g

Reconstitution / Dilution / Administration

IM : **(pour dose ≤ à 1 g)**

Reconstitution :
1g + 3 mL d'eau ppi ou lidocaïne 0,5% ou 1% [2, 6]

Administration: Sans dilution supplémentaire, en i.m profond [1]

IVD lent: **(pour dose ≤ à 1 g)**

Reconstitution : 1 g + 20 mL eau ppi ou NaCl 0,9% [2]

Administration: Sans dilution supplémentaire. [2]

Durée: en 3 - 5 min. [1]

PI : **(pour dose ≤ à 2 g)**

Reconstitution :
Directement avec le soluté de dilution NaCl 0,9% ou G5% : pas besoin de reconstituer avec de l'eau avant [1]

- 1 g – 2 g (secs) + 100 mL → 10 - 20 mg/ mL [2]
- en cas de restriction hydrique : c_{max} = 50 mg/mL
  Par VVC uniquement

1 g + 20 mL eau ppi ou NaCl 0,9% → 50 mg/mL

Administration: par **gravité,** par voie centrale ou périphérique. [1]

Durée: en 20 - 30 min. [1, 2]

Tourner la page svp

PI (SI) : Sur demande du médecin chef, lorsque certaines situations cliniques le nécessitent, il est possible de faire

Informations techniques

pH :
5 - 7

Osmolarité/ osmolalité :
200 mOsm/kg (eau ppi)
500 mOsm/kg (NaCl 0,9%)

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):
-

Mode de conservation :
Température ambiante (15-25°C) [2]

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : 24h au frigo. [112]

Sol. diluée : 24h au frigo. [112]

Si dilué dans RL : utiliser immédiatement [112]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :

1 amp. de 1 g contient 50,7 mg (= 2,2 mmol) de Na^+ [2]

ATTENTION :

- Vérifier que le patient ne soit pas allergique aux pénicillines.

- PI : max. 2 g par perfusion. [2]

- IM : alterner les sites d'injection [86]

Principaux risques / EI :
Douleur au site d'injection, tbles gastro-intestinaux, réactions allergiques, [1] phlébites [86]

Surveillance :
Site d'injection, signes d'intolérance, trajet veineux

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Se référer au tableau de compatibilités en Y de la PIC.

Si Floxapen doit être perfusé en combinaison avec un aminoglycoside (amikacine, gentamycine etc..) : ne pas perfuser sur la même voie ou respecter un intervalle d'1h entre les deux en rinçant bien la ligne de perfusion. [86]

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 05.2020

des perfusions de plus longue durée en respectant la durée maximale de stabilité du produit (cf. stabilité après ouverture) [134, 135, 136] *Reconstitution* : Directement avec le soluté de dilution NaCl 0,9% ou G5% : pas besoin de reconstituer avec de l'eau avant [1] *Dilution* : 1 g ou 2 g + 50 mL → 20 à 40 mg/mL [1] *Administration* : par **PS**, par voie centrale ou périph. [1] *Durée* : sur OM du médecin cadre			

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 05.2020