

# FUNGIZONE (amphotéricine B)

Antifongique

Présentation	Ampoule sèche 50 mg	
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques	Particularités
<p>PI :</p> <p><u>Reconstitution</u> : 50 mg + 10 mL eau ppi → 5 mg / mL<sup>1</sup> Agiter vigoureusement quelques minutes jusqu'à ce que la solution se soit éclaircie.<sup>6,2</sup></p> <p><u>Dilution</u> : 50 mg (10 mL) ad 500 mL G5% → 0,1 mg / mL<sup>1</sup></p> <p><u>Concentration max.</u> = 0,4 mg/mL par voie centrale uniquement. En cas de restriction hydrique sévère<sup>1</sup></p> <p><u>Administration</u>: par pompe, par voie centrale ou périphérique.<sup>1,6</sup></p> <p><u>Durée</u> : selon OM, en 2 – 6h</p>	<p><b>pH</b> : 7,4 – 7,7</p> <p><b>Osmolarité/ osmolalité</b> : 46 mOsm/kg</p> <p><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...)</b>: Utiliser éventuellement un filtre "in line" (diamètre des pores &gt; 1 micron)<sup>1</sup></p> <p><b>Mode de conservation</b> : Conserver au réfrigérateur (2 à 8 °C) et à l'abri de la lumière.<sup>2</sup></p> 	<p><b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres</b> : -</p> <p><b>ATTENTION</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne jamais diluer avec NaCl 0,9%.</li> <li>N'utiliser que des solutions glucosées à pH &gt; 4.2<sup>1</sup> (Glucose 5% Bioren : pH = 5<sup>16</sup>)</li> <li>- Ne pas confondre avec AMBISOME : posologie et principes actifs différents.</li> <li>- Selon OM : dose test 1 mg/20 mL G5% sur 20 à 30 minutes afin d'évaluer la tolérance du patient<sup>1</sup></li> <li>- Précipitation si reconstitution avec un autre solvant que de l'eau ppi et si dilution avec NaCl 0,9%<sup>1,2</sup></li> <li>- Risque de dommages tissulaires graves si extravasation.<sup>85, 60</sup></li> </ul> 
	<p><b>Stabilité après ouverture</b> :</p> <p><u>Sol. mère</u> : Abri de lumière<sup>6</sup> 12h à T amb.<sup>1</sup> ou 24h au frigo.<sup>1</sup></p> <p><u>Sol. diluée</u> : Abri de lumière 24h à T amb.<sup>1</sup></p>	<p><b>Principaux risques / EI</b> :</p> <p>Fièvre, phlébites, hypo/hyperTA, réaction allergique / anaphylaxie, rougeur/chaueur cutanée, arrêt cardiaque et respiratoire...<sup>1</sup></p> <p><b>Surveillance</b> :</p> <p>Signes vitaux (pouls, TA, FR, température) toutes les 30 min et durant les 2 à 4 heures qui suivent l'administration.<sup>1, 2</sup></p> <p><b>Principales incompatibilités (mélange + Y)</b> :</p> <p>NaCl, alcool benzylique<sup>2</sup>, électrolytes, nutrition parentérale....<sup>60</sup></p> <p>⇒ Administrer seul sur une voie, sans autres produits en Y, ni dans la même perfusion.<sup>1</sup></p>