

GARDENAL (phénobarbital)		Anticonvulsivant	
Présentation	Fioline sèche 40 mg		
Reconstitution / Dilution / Administration			
IM : voie principale			
<u>Reconstitution</u> : 40 mg + 2 mL eau ppi → c = 20 mg/mL	Informations techniques pH : 8.5 - 10.5 (non-diluée) Osmolarité/ osmolalité : 200 mOsm/kg sol. reconst. ¹	Particularités Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : 1 ampoule contient 4,4 mg de sodium	
<u>Administration</u> : Sans dilution. ¹ Injecter dans large muscle. ⁸			
IVD lent : voie exceptionnelle	Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -	ATTENTION : - IVD : Nécessite d'avoir le matériel de réanimation à portée de main et une surveillance accrue du patient. ¹ - Vérifier l'aspect de la solution avant l'injection : n'utiliser que des solutions claires et sans particules. ¹ - Risque de dommages tissulaires graves si extravasation. ⁸⁵ ➔ PharmPic.ch L'administration s.c peut provoquer des nécroses locales ^{112, 85}	
<u>Reconstitution</u> : 40 mg + 2 mL eau ppi → c = 20 mg/mL	Mode de conservation : Température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de la lumière ¹ 		
<u>Dilution</u> : 40 mg (1 x 2mL/40mg) + 6 mL de NaCl 0,9% façon à obtenir concentration c = 5 mg/mL ^{85, 86}			
<u>Durée</u> : 3 à 5 minutes ^{5, 1} Débit max : 1 mg/kg/min Risque de dépression respiratoire si administration trop rapide.			
PI : (SI adultes)	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate. ¹	Principaux risques / EI : Somnolence, dysarthrie, arthralgie, trouble de l'humeur, trouble de la coordination + équilibre, vertige, céphalée, syndrome de sevrage, ⁴ dépression respiratoire stt si perfusé trop rapidement, phlébite. ¹ Réaction paradoxale possible chez la personne âgée	
<u>Reconstitution</u> : 40 mg + 2 mL eau ppi → c = 20 mg/mL			
<u>Dilution</u> : Dose prescrite ad 50 mL NaCl 0,9% ¹			
<u>Administration</u> : par PS , par voie centrale ou veine de gros calibre. Selon dose de charge repartir la dose en 2 seringues de 50 mL ¹			
<u>Débit</u> : max. 60 mg/minute ^{1, 112}			
PSSC : voie non officielle mais utilisée en Soins palliatifs cf. « liste non exhaustive des médicaments pouvant être administrés par voie s.c » en annexe		Surveillance : Paramètres respiratoires, monitoring cardiaque	
		Principales incompatibilités (mélange + Y) : Ne pas mélanger avec d'autres médicaments. ^{85, 112}	