


HAEMOCOMPLETTAN P (fibrinogène humain)

Hémostatique, facteur de coagulation

Présentation	Ampoule sèche 1g		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités
<p>PI : <u>Reconstitution</u> : 1 g + 50 mL d'eau ppi ¹</p> <p>1. Prélever 50 mL d'eau ppi dans une seringue et l'injecter dans le flacon avec une aiguille.</p> <p>2. Par de légers mouvements de rotation du flacon, la poudre va se dissoudre et le produit sera prêt à l'emploi. Faire en sorte que la poudre soit totalement humidifiée. Ne pas le secouer énergiquement, afin d'éviter la formation de mousse. La dissolution est complète dans un délai d'au maximum 15 minutes (5 à 10 minutes en général). ²</p> <p>3. Insérer le Mini-Spike sur le septum du flacon puis enlever le capuchon.</p> <p>4. Fixer la seringue sur le filtre fourni, puis visser sur le Mini-Spike et prélever la solution.</p> <p><u>Administration</u> : Sans dilution supplémentaire. ¹ Par Pousse-seringue par voie centrale ou périphérique.</p> <p><u>Débit max.</u> = 5 mL / min ¹</p>	<p>pH : 6,5 – 7,5</p>	<p>Osmolarité/ osmolalité : 240 - 320 mOsm/kg</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : 1 amp. de 1 g contient 164 mg (= 7,1 mmmol) de Na+ ²</p>
	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...): Utiliser le transfert set Mini-spike® et le filtre-seringue Pall® fournis.</p>		<p>ATTENTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La solution obtenue après reconstitution doit être incolore à jaunâtre, transparente jusqu'à légèrement opalescente. - Ne pas utiliser des solutions troubles ou des solutions contenant des résidus (sédiments/particules). ² - Ne jamais diluer la solution reconstituée ! ¹ - Contient du sodium !
	<p>Mode de conservation : Conserver au réfrigérateur (2-8°C) ²</p> 		<p>Stabilité après ouverture :</p> <p><u>Sol. mère</u> : 8h à T amb. à l'abri de la lumière ²</p> <p>Ne pas remettre au frigo après reconstitution! ¹</p> <p>Principaux risques / EI :</p> <p>Réactions allergiques, choc anaphylactique, hyperthermie, embolie, thrombose ^{2, 1}</p> <p>Surveillance : Signes vitaux, signes de réaction allergique ¹</p> <p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p> <p>Ne pas mélanger à d'autres médicaments. A passer seul sur une voie. ¹</p>