

**LACOSAMID DESITIN (Iacosamide)****Anti-épileptique**

<b>Présentation</b>	Flac. 100 mg/ 10 mL → 10 mg/mL		
<b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>	<b>Informations techniques</b>	<b>Particularités</b>	
<b>PI (SI adultes) :</b> <u>Dilution</u> : dose prescrite + <b>50 - 100 mL</b> NaCl 0,9% ou G5% <sup>1</sup>  Peut être administré pur aussi.  <u>Administration</u> : par <b>Pompe</b> , par voie centrale ou périphérique <sup>1</sup>  <u>Durée</u> : minimum <b>30 min.</b> <sup>1</sup>	<b>pH :</b> 3,8- 4,5 <sup>1</sup>	<b>Osmolarité/ osmolalité :</b> 260- 320 mOsmoL/kg <sup>1</sup>	
	<b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b> -	<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25°C) <sup>2</sup>	<b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b> 29,9 mg (1,3 mmol) de Na <sup>+</sup> max. par flacon
	<b>Mode de conservation :</b> Température ambiante (15-25°C) <sup>2</sup>		<b>ATTENTION :</b> - Générique de Vimpat®
<b>SC: voie non officielle mais utilisée en Soins palliatifs</b>  <u>Dilution</u> : <b>Pur</b> , sans dilution  <u>Durée</u> : <b>10 min.</b> minimum  (données extraites d'un case report : <sup>127</sup> )	<b>Stabilité après ouverture</b> <sup>1</sup> :  <u>Sol. mère</u> : 1h à T amb  <u>Sol. diluée</u> : 12h à T amb	<b>Principaux risques / EI :</b>  Vertiges, céphalées, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, troubles digestifs, douleurs ou troubles au site d'injection (2,5%), irritations (1%) et érythèmes (0,5%). <sup>2</sup>  Si administration trop rapide, le risque de somnolence, paresthésies et vertiges est augmenté. <sup>6</sup>	
		<b>Surveillance :</b> Monitoring cardiaque	
		<b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b>  Se référer au tableau de compatibilités en Y de la PIC.	