MEPHAMESONE (dexaméthasone phosphate sodique)

Glucocorticoïde

Présentation	Ampoule : 4 mg / 1 mL → (= 3 mg de dexaméthasone base par ampoule) Ampoule : 8 mg / 2 mL → 4 mg/mL (= 6 mg de dexaméthasone base par ampoule) Ampoule : 50 mg / 3 mL → 16,7 mg/mL (= 38 mg de dexaméthasone base par ampoule)

Reconstitution / Dilution / Administration

IM / SC : (dose max. 4 mg)

Administration : Sans dilution. [1]

IVD lent: (dose max. 8 mg)

Administration : Sans dilution. [6]
Possible de diluer dans NaCl 0,9% ou G5% [86]
étiquette n° 7132
étiquette n° 9005

Durée : 2 - 3 min. [1]

PI :

Dilution : dose prescrite dans 100 mL NaCl 0,9% ou G5%
ex : 8 mg (1x 2 mL) + 100 mL → 0,08 mg/mL

Administration: par **gravité** par voie centrale ou périphérique[1]

Durée : 15 - 30 min.

PC :
Dilution : avec NaCl 0,9% ou G5% à une conc. de 0,5 mg/mL [0]
Ex : 24 mg (3 x 8 mg/2 mL) + 42 mL

Administration: par **PS,** par voie centrale ou périphérique [1]

Débit / Durée : Selon OM. 0,5 mg/h = 1 mL/h

PSCC (soins palliatifs) :

Dilution: diluer la dose prescrite dans un volume convenable de NaCl 0,9%, G5% ou d'eau ppi. [86]

Administration : par **PS**
Durée : 24h

Informations techniques

pH :
8 - 9

Osmolarité/ osmolalité :
300 - 400 mOsmol/l

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):

-

Mode de conservation :
Température ambiante (15-25°C) et à l'abri de la lumière. [112]

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : 12h à T amb. [1]

Sol. diluée : 24h à T amb. [1]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :

-

ATTENTION :

- Générique du Fortecortin®.
- En concentration de 4 mg/ml uniquement, possibilité d'administrations supplémentaires: [2]
intra-articulaire, périarticulaire ou en infiltration locale.
-Privilégier l'administration par perfusion dès 8 mg.

Principaux risques / EI :
HTA, hyperglycémie, rétention sodium + oedèmes, retard cicatrisation, [2] réactions psychiatriques [85]

- IVD : Une injection trop rapide peut provoquer des paresthésies (pouvant durer plusieurs minutes) ou de désagréables fourmillements. [1]
- IM : Possibilité de lésions tissulaires, nécroses sur le site d'injection [1]

Surveillance :
Glycémie, TA, site d'injection

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Midazolam, topotécan, ciprofloxacin, glycopyrrolate, vancomycine…. [5]

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte SA, 06.2022