METHERGIN (méthylergométrine maléate)

Utérotonique

Présentation Ampoule 0,2 mg / 1 mL

Reconstitution / Dilution / Administration

SC :

Administration : Sans dilution. [26, 1]

IM : **(voie recommandée)**

Administration : Sans dilution. [4, 1]

IVD lent :

Administration Sans dilution. [4, 1]

Durée : minimum 60 secondes. [2, 1]

Informations techniques

pH : 2,7 – 3,5

Osmolarité/ osmolalité : ND

Matériel spécial (filtres/ tubulures…): -

Mode de conservation :
Conserver au réfrigérateur (2-8°C), à l'abri du gel et de la lumière. [2]



Peut être stocké à température ambiante (max. 25 °C) durant 4 à 8 semaines [26] à l'abri de la lumière.

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : utiliser immédiatement. [26]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :
-

ATTENTION :

- Eviter les injections intra-artérielles ou péri-artérielles. [2]

- Contre-indiqué si HTA sévère, prééclampsie, éclampsie, HIV+, maladie de Raynaud [1]

Principaux risques / EI :
HTA, bradycardie, tachycardie, douleur angineuse, vasospasme périphérique, infarctus du myocarde, N&V, douleurs abdominales à fortes doses, céphalée, vertige, réaction anaphylactique, éruptions cutanées… [4]

Surveillance :
TA, signes d'intolérance

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Copyright© Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 05.2020