

# METRONIDAZOLE (métronidazole)

Anti-infectieux (5 nitro-imidazolés)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Présentation</b>   | Miniperfusion (flex) 500 mg/100 mL → 1 mL = 5 mg   |  |
| <b>Reconstitution / Dilution / Administration</b>   | <b>Informations techniques</b>   | <b>Particularités</b>  |
| <b>PI :</b><br><br><u>Administration</u> : Sans dilution, <b>solution prête à l'emploi</b> <sup>2</sup><br><br>Par <b>gravité</b> , par voie centrale ou périphérique. <sup>1</sup><br><br><u>Dilution</u> : possible si nécessaire (p.ex. chez le nourrisson) avec du G5% ou du NaCl 0,9% <sup>1</sup><br><br><u>Durée</u> : <b>30 - 60 min</b> <sup>1</sup> | <b>pH :</b><br>4,5 – 6<br><br><b>Osmolarité/ osmolalité :</b><br>270 – 320 mOsm/kg<br><br><b>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</b><br>-<br><br><b>Mode de conservation :</b><br>Température ambiante (15-25°C) <sup>2</sup> et à l' <b>abri de la lumière</b> . <sup>2</sup><br><b>Ne pas conserver au frigo</b> car risque de précipitation. <sup>1</sup><br><br>  | <b>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</b><br><br><b>ATTENTION :</b><br><br>- <b>Générique du Flagyl®</b><br><br>- Incompatible avec le <b>G10%</b><br><br>- En cas d'extravasation, consulter la fiche correspondant en début d'ouvrage ou sur <a href="http://www.pharmpic.ch">www.pharmpic.ch</a>   |
|   | <b>Stabilité après ouverture :</b><br><br><u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate <sup>112</sup><br><br><u>Sol. diluée</u> : utilisation immédiate <sup>112</sup>   | <b>Principaux risques / EI :</b><br>Nausée, diarrhée, céphalée, coloration brun rouge des urines, vertige, urticaire, <sup>4</sup> goût métallique en bouche, <sup>1</sup> thrombophlébites <sup>86</sup><br><br><b>Surveillance :</b><br>Site d'injection<br><br><b>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</b><br><br>Se référer au tableau de compatibilités en Y de la PIC. |