

NOVALGIN (métamizole sodique = dipyrone = novaminesulfone)

Analgésique antipyrétique

Présentation	Ampoule 1000 mg / 2 mL → 500 mg/mL		
Reconstitution / Dilution / Administration			
IM : <u>Administration</u> : Sans dilution supplémentaire. ¹² max. 500 mg (1 mL) / min ¹¹² En raison du risque d'hypotension ou de choc, administrer lentement au patient allongé.	Informations techniques		Particularités
	pH : 6,6 - 7,6	Osmolarité/ osmolalité : 280 – 310 mOsmol/L (1 :10)	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :
	Matériel spécial (filtres/ tubulures...):		ATTENTION :
IVD lent : préférer l'administration par perfusion intermittente <u>Administration</u> : Sans dilution supplémentaire. ¹² <u>Débit</u> : max. 500 mg (1 mL) / min ¹¹² En raison du risque d'hypotension ou de choc, administrer lentement au patient allongé	Mode de conservation : Température ambiante (15-25°C) dans l'emballage original à l'abri de la lumière ² 		- Risque d'hypotension possiblement dose-dépendante, d'où une administration lente recommandée au patient allongé ^{112, 1} - Risque de réaction anaphylactique élevé par voie parentérale. ¹² - Porter la solution à température corporelle avant d'injecter. ² - Ne pas administrer si hypotonie ou hémodynamiquement instable. ¹²
	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate. ¹² <u>Sol. diluée</u> : 12 h à T amb ¹		Principaux risques / EI : Réaction anaphylactique, réaction cutanée, douleurs au site d'injection, phlébites, hypotension sévère. Coloration des urines en rouge (liée à l'ac. rubasonique, un métabolite du métamizole) ²
			Surveillance : TA, signe d'intolérance, site d'injection
PI : Voie de préférence <u>Dilution</u> : possible dans NaCl 0,9% ¹² Ex : 1000 mg (1x 2 mL) + 100 mL NaCl 0,9% → 10 mg/mL ¹² <u>Administration</u> : par gravité, par voie centrale ou périphérique, avec une tubulure standard. <u>Durée</u> : 20-30 minutes			Principales incompatibilités (mélange + Y) : Avec solutions acides (pH de la solution ne devant pas être inférieur à pH 6). Ne pas mélanger à d'autres médicaments dans la même seringue ou sur la même voie. ¹²