OCTREOTID (octréotide acétate)

Hormone

Présentation	Selon disponibilité des fournisseurs : Octreotid® ou Sandostatine® Ampoule 0,05 mg / 1 mL → 50 microgr./mL Ampoule 0,1 mg / 1 mL → 100 microgr./mL

Reconstitution / Dilution / Administration

SC : **voie de préférence**

Administration : Sans dilution [4]
Durée : en minimum 20 secondes. [4]

IVD lent : **(Urgences / SI)**

Dilution : Deux possibilités :
- Sans dilution [1, 60]
- 0,05 mg (1mL) + 9 mL NaCl 0,9%

Durée : 3 à 5 minutes[6, 86]

Monitoring cardiaque recommandé (Cf surveillance ci-contre)

PC :

Dilution : avec **NaCl 0,9%**
600 microgr. (6x 1mL) + 234 mL → 2,5 microgr./mL [0]

Si restriction hydrique: $c_{max.}$= 25 microgr./mL

Administration : par **pompe**, par voie centrale ou périph. [1]

Débit : selon OM. 25 microgr./h = 10 mL/h [1]

PC (SI adultes) :

Dilution : avec **NaCl 0,9%**
500 microgr. (5x 1mL) + 45 mL → 10 microgr./mL 66: *SIPHAROM*
étiquette n° 8437

Administration : par **PS** par voie centrale ou périphérique. [6, 1]

Débit : selon OM.
1 mL/h = 10 microgr./h 66: *SIPHAROM*

Informations techniques

pH :
3,9 – 4,5

Osmolarité/ osmolalité :
279 mOsm/kg

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):
-

Mode de conservation :
Conserver au réfrigérateur (2-8 °C) et à l'abri du gel et de la lumière. [2]



Pour l'utilisation quotidienne, les ampoules *non ouvertes* peuvent être gardées à température ambiante (pendant 15 j max.) [2]

Stabilité après ouverture :

Sol. mère : 12h à T amb, 24h au frigo.[1, 26]

Sol. diluée : 24h à T amb. [1]

Particularités

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :
-

ATTENTION :

- Générique de la Sandostatine®

- Pour réduire la douleur au site d'injection, administrer la solution à température ambiante et varier les sites d'injection [2]

- **PC**: utiliser de préférence NaCl 0,9% comme diluant car l'octréotide peut influencer l'homéostasie du glucose. [2]

Principaux risques / EI :
Anorexie, N&V, douleurs abdominales, diarrhées, hypo/hyperglycémie, [4] douleur/rougeur au site d'injection, céphalées, [1] arythmies, tachy/bradycardie [85]
réactions anaphylactiques [86]

Surveillance :
Site d'injection, glycémies, [0] diurèse, signe d'intolérance.
Monitoring cardiaque pour injection IVD [85, 86]

Principales incompatibilités (mélange + Y) :

Ne pas mélanger à un autre produit dans un même flacon et dans la même perfusion. [4]