

RATIVOR (lorazépam)

Benzodiazépine

Présentation	ampoule 4 mg / 1 mL	Informations techniques		Particularités	
Reconstitution / Dilution / Administration		pH : 6,4 ¹	Osmolarité/ osmolalité : 6490 mOsm/L à une conc. de 1 mg/mL ¹	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : - propylène glycol - alcool benzylique	
IVD lent: Ne jamais injecter pur !⁵ <u>Dilution</u> : dans un volume égal de G5% ou NaCl 0,9% (dilution 1 : 1) Mélanger doucement !^{112, 6, 86} <u>Ex</u> : 4 mg (1x 1 mL) + 1 mL G5% → 2 mg/mL² <u>C_{max}</u> : 2 mg/mL <u>Administration</u> : par voie centrale de préférence ou veine de gros calibre car très irritant.¹ <u>Débit</u> : Selon OM <u>Débit max.</u> : 2 mg par minute.¹¹²		Matériel spécial (filtres/ tubulures...):  Seringues sans PVC ¹⁵⁹		ATTENTION : - Remplace Temesta® & Lorazepam Xilmac® inj. hors commerce - Ne pas utiliser les solutions ayant changé de couleur ou contenant des précipités. ² Le lorazépam peut précipiter lorsqu'il est dilué. ^{128, 159} - Le lorazépam est adsorbé sur le PVC ¹⁵⁹ - Risque de dommages tissulaires graves si extravasation. ^{112, 148} → Pharmpic.ch - Antidote : flumazénil en cas d'intoxication	
		Mode de conservation : Conserver au réfrigérateur (2-8 °C) et à l'abri de la lumière. ¹¹²  		Principaux risques / EI : Dépression ou arrêt respiratoire, hypoTA (surtout si administration trop rapide), vertiges, sédation, somnolence, phlébite au site d'injection, réaction allergique (contient de l'alcool benzylique) ¹¹²	
		Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate ^{1, 112} <u>Sol. diluée</u> : 1h au frigo ¹¹²		Surveillance : Fréquence respiratoire, sédation, TA, saturation, site d'injection ¹	
				Principales incompatibilités (mélange + Y) : Aztréonam, flucloxacilline, nutrition parentérale, oméprazole, ondansétron, pantoprazole ⁵ , ...	