



TAMBOCOR (flécaïnide acétate)

Anti-arythmique

Présentation	Ampoule 150 mg / 15 mL → 10 mg/mL		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités
<p>IVD lent: (dose de charge) (Urgences, SI adultes)</p> <p><i>Administration</i> : Sans dilution. ^{4,1}</p> <p><i>Durée</i> : minimum 10 minutes. ¹</p> <p>(Dose de charge: 2 mg/kg selon OM ; maximum de 150 mg ¹)</p>	<p>pH : 5 - 6</p>	<p>Osmolarité/ osmolalité : 240 - 300 mOsm/kg</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : -</p>
<p>PI: (dose de charge) (Urgences, SI adultes)</p> <p><i>Dilution</i> : 150 mg (1x 15 mL) + 50 - 100 mL G5% → 1,5 à 3 mg/mL ⁰</p> <p><i>Administration</i>: par gravité par voie centrale ou périphérique ¹</p> <p><i>Durée</i> : 30 min. ¹</p> <p>(Dose de charge: 2 mg/kg selon OM ; maximum de 150 mg ¹)</p>	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -</p> <p>Mode de conservation : Température ambiante (15 - 25 °C) et à l'abri de la lumière. ²</p> 		<p>ATTENTION :</p> <p>- PC: doit toujours être précédée d'une dose initiale administrée en IVD lente ou en mini-perfusion (PI). ¹</p> <p>- Dilution avec G5% : soluté de choix car avec NaCl 0,9% risque de formation d'un précipité pour des volumes < 500 mL. ²</p>
<p>PC : (dose d'entretien, toujours précédée d'une dose de charge en IVD ou PI) (Urgences, SI adultes)</p> <p><i>Administration</i>: 300 mg (2x 15 mL) PUR → 10 mg/mL ^{66: SIPHAROM}  étiquette n°8439</p> <p>Perfuser par PS par voie centrale ou périphérique. ¹</p> <p><i>Débit</i> : selon OM ^{66: SIPHAROM} 10 mg/h = 1 mL/h</p> <p>En général : Débit initial 1^{ère} heure : 1,5 mg/kg/h puis 0,1 à 0,25 mg/kg/h ¹¹²</p> <p><i>Durée max.</i> : 24h ¹</p> <p>(Max. 600 mg/24h incluant la dose de charge ^{2, 85})</p>	<p>Stabilité après ouverture :</p> <p><u>Sol. mère</u> : 12h à T amb. ¹</p> <p><u>Sol. diluée</u> : 24h à T amb. ¹</p>		<p>Principaux risques / EI : troubles du rythme, vision trouble, vertige, tremblements, céphalée, asthénie, nausée, troubles digestifs... ⁴</p> <p>Surveillance : Monitoring cardiaque, TA,⁰ taux plasmatiques selon OM surtout si doses élevées. ²</p>
			<p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p> <p>Ne pas mélanger à d'autres médicaments ⁸⁵</p>