


TORA-DOL (kétorolac trométamol)

Anti-inflammatoire

Présentation	Ampoule 30 mg/mL		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités
<p>IM : voie principale</p> <p><i>Administration</i> : Sans dilution. ¹</p>	<p>pH : 7</p>	<p>Osmolarité/ osmolalité : 290 mOsmol/kg ⁸⁵</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : Contient 12% d'alcool (100 mg d'éthanol pour 1 mL). ²</p>
<p>IVD :</p> <p><i>Administration</i> : Sans dilution. ¹</p> <p><i>Durée</i> : minimum 15 secondes. ¹</p>	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -</p>	<p>Mode de conservation : Température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de la lumière ; ne pas congeler. ²</p> 	<p>ATTENTION :</p> <p>- Le traitement par voie IM ou IV est indiqué en présence d'états douloureux aigus et sévères; durée maximale de traitement = 2 jours. ^{2, 85}</p>
<p>PSSC : voie non officielle mais utilisée en Soins palliatifs</p> <p>cf. « liste non exhaustive des médicaments pouvant être administrés par voie s.c » en annexe</p>	<p>Stabilité après ouverture :</p> <p><u>Sol. mère</u> : 24h à T amb. ⁶⁰</p>		<p>Principaux risques / EI :</p> <p>Purpura, céphalée, somnolence, sudation, vertiges, HTA, N&V, dyspepsie, troubles abdominaux, exanthème, oedème, douleur au point d'injection, réactions d'hypersensibilité, ² ulcérations, saignements ⁸⁵</p> <p>Surveillance : Site d'injection, signes d'intolérance</p> <p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p> <p>Halopéridol, péthidine, morphine.... ^{5, 71}</p>