


VITALIPID N (vitamines A, D, E K)

Préparation polyvitaminique

Présentation	Ampoule 10 mL (Vitamines liposolubles : A 3300 UI, D2 : 200 UI, E : 10 UI et K1 : 150 µg)		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques		Particularités
<p>PI : seul</p> <p><i>Dilution</i> : 1 amp.(1x 10 mL) + 100 mL NaCl 0,9% ou G5% ⁷⁹</p> <p><i>Administration</i>: par Pompe par voie centrale ou périphérique ⁷⁹</p> <p><i>Durée</i> : 60 min. minimum ⁷⁹</p>	<p>pH :</p> <p>ND</p>	<p>Osmolarité/ osmolalité :</p> <p>260 mOsm/L</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :</p> <p>-</p>
<p>PC : mélangé dans nutrition parentérale (NPT)</p> <p><i>Dilution</i> : ajouter dans la poche de nutrition en respectant les quantités du tableau d'adjonctions maximales autorisées</p> <p><i>Administration</i> : par Pompe et en fonction de la nutrition utilisée : par voie centrale ou périphérique, à l'abri de la lumière. ²³</p> <p><i>Durée</i> : 18 - 24h ⁷⁹</p> <p><i>Débit</i> : selon le débit de la NPT ¹⁵</p>	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...):</p> <p>Utiliser une poche de protection de la lumière si mélangé à NPT ou si PI > 30 min.</p> <p>Mode de conservation : T amb. (15-25°C), à l'abri de la lumière ²</p> 		<p>ATTENTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combiné avec Soluvit N : remplace temporairement le Cernevit - PI possible avec Soluvit N, Addaven et Dipeptiven: voir tableau « Mélange de produits » section 7 ci-après. - Après stockage prolongé des ampoules, une séparation des liposomes peut survenir. Ceci n'altère en rien la qualité du produit. <p>Les ampoules qui présentent par contre à la surface du liquide une phase huileuse transparente ou qui renferment des gouttes d'huile sont inutilisables et doivent être détruites.</p> <p>Homogénéiser le contenu de l'ampoule en la secouant légèrement avant emploi.</p> <p>- Ne pas prélever Addaven et Vitalipid N avec la même seringue.</p>
	<p>Stabilité après ouverture :</p> <p><i>Sol. mère/ diluée</i> : 24h à T amb. à l'abri de lumière. ¹¹²</p> <p><i>Sol. diluée dans NPT</i> : 24h à T amb. et à l'abri de la lumière ⁷⁹</p>		<p>Principaux risques / EI : Elévation température corporelle rares réactions anaphylactiques, N&V, diarrhée, tremblements, frissons ¹¹²</p> <p>Surveillance : Site d'injection, signes d'intolérance</p> <p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p> <p>-</p>