


VITARUBINE (vitamine B12 = cyanocobalamine)

Vitamine

Présentation	Ampoule 1 mg / 1mL	
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques	Particularités
IM : voie principale <u>Administration</u> : Sans dilution. ¹ Injecter profondément dans le muscle. ¹	pH : ND	Osmolarité/ osmolalité : ND
SC : <u>Administration</u> : Sans dilution. ¹	Matériel spécial (filtres/ tubulures...): -	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : -
	Mode de conservation : Température ambiante (15-25°C) et à l'abri de la lumière. ⁵ 	ATTENTION : - Voie intraveineuse possible mais non recommandée car élimination rapide de la vitamine. ² - Prudence si prédisposition aux thromboses, psoriasis et eczéma de contact. ²
	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate ² <u>Sol. diluée</u> : utilisation immédiate ¹	Principaux risques / EI : Réactions allergiques, acné, ² choc anaphylactique, erythème, prurit, ⁴ vertiges, fièvre, frissons, flushs, irritation du site d'injection ⁸⁵
PI: voie possible mais non recommandée (cf ci-contre) <u>Dilution</u> : 1 amp. (1x1 mL) + 100 mL NaCl 0,9% ou G5% ¹ <u>Administration</u> : par gravité par voie centrale ou périphérique ¹ <u>Durée</u> : 15 – 30 minutes. ¹ Si durée de perfusion > 30 min : protéger de la lumière. ¹		Surveillance : Signes d'allergie, d'intolérance, site d'injection
		Principales incompatibilités (mélange + Y) : Substances fortement acides ou alcalines, agents oxydants ou réducteurs (p.ex. acide ascorbique, sel de fer (II), thiamine, riboflavine, nicotinamide...) ² ⇒ Ne pas mélanger à d'autres médicaments.