

VOLTAREN (diclofénac sodique)**Anti-inflammatoire**

Présentation	Ampoule 75 mg / 3 mL → 25 mg/mL	
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques	Particularités
IM : <u>Administration</u> : Sans dilution. ¹ profondément dans le quadrant supéro-externe de la fesse ¹¹² 75 mg au maximum par site d'injection. ¹	pH : 7,8 - 9 Osmolarité/ osmolalité : ND	Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : - Contre-indiqué si hypersensibilité à l' alcool benzylique (conservateur) - Présence de sulfites ² → risque d' allergie + choc anaphylactique chez des asthmatiques ou personnes hypersensibles aux sulfites.
PI : <u>Dilution</u> : avec solutions de NaCl 0,9% ou G5% tamponnées <u>Solution taponnées</u> : Ajouter 0,5 ml de bicarbonate sodium 8,4% à 100 ml de NaCl 0,9% ou G5% Puis ajouter 1 amp. 75 mg (1x 3 mL) dans cette solution. ¹ <u>Administration</u> : par gravité , par voie centrale ou périphérique ¹ <u>Durée</u> : 30 minutes à 2h ^{1, 85, 60}	Matériel spécial (filtres/ tubulures...): - Mode de conservation : Température ambiante (15-25°C) et à l' abri de la lumière. ⁵ 	ATTENTION : - Ne pas injecter en bolus intraveineux ! ¹ - L'utilisation des solutés de perfusion de NaCl 0,9% ou de G5% sans adjonction de bicarbonate de sodium peut provoquer une sursaturation et la formation d'un précipité. ²
PC : <u>Dilution</u> : 75 mg (1x 3 mL) + 100 – 500 mL NaCl 0,9% ou G5% tamponnées (cf ci-dessus) ⁸⁵ <u>Administration</u> : par gravité , par voie centrale ou périphérique ¹ <u>Débit</u> : 5 mg/h ^{2, 85}	Stabilité après ouverture : <u>Sol. mère</u> : utilisation immédiate. ² <u>Sol. diluée</u> : utilisation immédiate. ²	Principaux risques / EI : Céphalée, étourdissement, vertige, douleurs épigastriques, troubles gastro-intestinaux, éruption cutanée, douleur + induration au point d'injection (im) ²
PSSC : voie non officielle mais utilisée en Soins palliatifs cf. « liste non exhaustive des médicaments pouvant être administrés par voie s.c » en annexe		Surveillance : Site d'injection Principales incompatibilités (mélange + Y) : Ne pas mélanger avec d'autres médicaments ²