

ZYPREXA (olanzapine)

Neuroleptique

Présentation	Flacon sec 10 mg		
Reconstitution / Dilution / Administration	Informations techniques	Particularités	
<p>IM / (SC : Voie non officielle mais utilisée en Soins palliatifs ¹⁴⁷)</p> <p>Reconstitution : 10 mg + 2,1 mL eau ppi uniquement → 5 mg/mL ²</p> <p>Administration : sans dilution supplémentaire. ²</p>	<p>pH : 5,3 – 5,9</p> <p>Osmolarité/ osmolalité : 94 mOsm/kg</p>	<p>Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres : -</p>	
	<p>Matériel spécial (filtres/ tubulures...) : -</p>	<p>Mode de conservation :</p> <p>Température ambiante (15-25°C)</p>	<p>ATTENTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas administrer par voie intraveineuse ou s.c ! ² - Reconstituer uniquement avec de l'eau ppi ! ² - Traitement par benzodiazépine parentérale : administrer au minimum une heure après l'injection d'olanzapine IM. ² - La solution obtenue après reconstitution est de couleur jaune. ¹
	<p>Stabilité après ouverture :</p> <p>Sol. mère : 1h à T amb. ^{41, 1}</p>		<p>Principaux risques / EI :</p> <p>Bradycardie, hypoTA sévère, hypoTA orthostatique, dépression respiratoire, douleur au site d'injection, somnolence, hyperglycémie, hypoventilation...²</p>
			<p>Surveillance :</p> <p>Surveillance étroite pendant les 2 à 4 premières heures après l'injection : TA, pouls, fréquence respiratoire, niveau de conscience, site d'injection... ²</p>
		<p>Principales incompatibilités (mélange + Y) :</p> <p>Ne jamais mélanger dans la même seringue avec diazépam, lorazépam, halopéridol. ²</p>	