


Date :		<b>PROTOCOLE D'ADMINISTRATION D'EVUSHELD®</b>	
Coller ici étiquette patient			
<b>Présentation du produit</b>	Principe actif :	Anticorps monoclonaux : tixagevimab et cilgavimab	
	Excipients :	Histidine, Histidine HCl, Polysorbate 80, eau	
<b>Conditionnements :</b>	1 boîte de 300 mg contient 2 flacons Flacon 1 : tixagevimab (150 mg/1,5 mL) Flacon 2 : cilgavimab (150 mg/1,5 mL)		
	 <p><b>Pour 1 patient :</b> <b>1 dose = 2 boîtes = (2x flacon 1) + (2x flacon 2) = 2 injections i.m de 3 mL</b></p>		
<b>Indications et dosages</b>	<p><b>Traitement et prophylaxie de l'infection CoVID-19 chez les patients remplissant les critères d'éligibilité selon les recommandations de la Société suisse d'infectiologie (SSI).</b> <a href="https://pharmpic.ch/Actualites/COVID-19.html">https://pharmpic.ch/Actualites/COVID-19.html</a></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Prophylaxie</b> : 1 dose de 600 mg sous la forme de 2 injections i.m distinctes de tixagevimab (2x150 mg) et de cilgavimab (2x150 mg), à répéter après 6 mois tant que le SARS-COV-2 circule.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Traitement</b> : 1 dose unique de 600 mg sous la forme de 2 injections i.m distinctes de tixagevimab (2x150 mg) et de cilgavimab (2x150 mg)</p>		
<b>Contre-indications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypersensibilité à l'un des principes actifs ou l'un des excipients</li> <li>- Prudence chez les patients à haut risque d'évènements cardiovasculaires</li> <li>- Prudence chez les patients présentant des troubles de la coagulation : le médecin évaluera alors la nécessité de donner la dose en intra-veineux plutôt qu'en intra-musculaire</li> <li>- Contre-indication relative en cas de thrombocytes &lt; 20/mm<sup>3</sup> et précaution d'emploi en cas d'immunosuppression</li> </ul>		
<b>Matériel nécessaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 emballages d'Evusheld®</li> <li>- Matériel pour désinfection</li> </ul>		
<b>Préparation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Administration par voie i.m.</b> : doses prêtes à l'emploi</li> <li>➤ <b>Administration par voie i.v (off-label)</b> : consulter la monographie Refmed de Evusheld® [5]. Si besoin contacter la PIC</li> </ul>		
<b>Administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Administration par voie i.m</b></li> </ul> <p>Injecter <b>consécutivement</b> chacun des anticorps dans le quadrant supéro-externe de la fesse <b>sur 2 sites distincts</b> (fesse gauche et droite).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Administration par voie i.v (off-label)</b> : consulter la monographie Refmed de Evusheld® [5]. Si besoin contacter la PIC</li> </ul>		

Rédacteur	N. Marcoz	V 1.4 23.08.2022
Vérificateur	M. Ackermann ; E. Muffat	
Approbateur	N. Schaad, L. Christin, O. Marchetti	

<b>Effet indésirables</b>	Anaphylaxie - Eruption cutanée, urticaire, prurit - Toux, rhinorrhée, congestion nasale - Céphalée, fièvre, frisson - Diarrhée, nausée, vomissement - Douleur au point d'injection - Douleur, myalgie - Infarctus du myocarde - Thromboembolie										
<b>Surveillance</b>	<p style="text-align: center;"><b>Après : pendant 60 min.</b></p> <p style="text-align: center;">Signes d'intolérance ou d'allergie, paramètres vitaux aux 15 min jusqu'à 1h après les injections</p> <p style="text-align: center;"><b>Si réaction allergique / anaphylactique : tel 144</b></p>										
<b>Surveillance</b>	<p>➤ En cas de questions, appeler :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Hôpital</th> <th style="width: 40%;">Durant les heures ouvrables</th> <th style="width: 45%;">En dehors des heures ouvrables</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GHOL</td> <td>Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44</td> <td>médecin de garde : 022 994 61 61</td> </tr> <tr> <td>EHC</td> <td>Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13</td> <td>Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13</td> </tr> </tbody> </table>		Hôpital	Durant les heures ouvrables	En dehors des heures ouvrables	GHOL	Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44	médecin de garde : 022 994 61 61	EHC	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13
Hôpital	Durant les heures ouvrables	En dehors des heures ouvrables									
GHOL	Dr L. Christin 022 994 62 27 Dr G. Ongaro 022 994 63 44	médecin de garde : 022 994 61 61									
EHC	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13	Chef de Clinique Médecine : 075 434 55 13									
<b>Conservation et stabilité</b>	<p><b>Avant ouverture</b> : frigo (2-8°C) et à l'abri de la lumière. Ne pas secouer</p> <p><b>Après ouverture</b> : 4h à T° ambiante (15-25°C)</p>										
<b>Commentaire / Remarques particulières</b>	<p>➤ Attendre au moins quatre semaines après la vaccination contre le SARS-CoV-2 : si sérologie négative, l'administration d'Evusheld® peut être envisagée selon les indications recommandées par la Société Suisse d'Infectiologie</p> <p>➤ Tout effet secondaire observé consécutivement à l'injection d'Evusheld® doit être immédiatement annoncé au médecin traitant.</p>										

**Références :**

[1] Information fabricant AstraZeneca, 2022

[2] RefMed, CHUV, juin 2022

[3] Anticorps monoclonaux recommandations pratiques HUG, v3, 31.05.2022

[4] Evusheld for covid 19 FAQ for clinicians, mai 2022, Victoria AU

[5] <https://refmed-consult.chuv.ch/consult/fami/573863/admMode/40/protocol/1>

[6] Recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI) concernant le traitement précoce et la prophylaxie du COVID-19 (04 août 2022)