

Date : Coller ici étiquette patient		PROTOCOLE DE PERFUSION DE VYEPTI		
Présentation du produit ^[1]	Principe actif :	eptinézumab		
	Excipients :	L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, polysorbate 80, sorbitol (E420), eau pour prép. injectable		
	Conditionnement :	Flacon de solution à diluer pour perfusion 100 mg / 1 mL	Spécialité utilisée : VYEPTI®	Numéro de lot à inscrire/coller:
Indication et dosages ^[1]	Prévention de la migraine chez l'adulte ☐ 100 mg en perfusion intraveineuse = 1 flacon ☐ 300 mg en perfusion intraveineuse = 3 flacons Validé le : par Dr : Signature :			
Mises en garde / Précautions / CI ^[1]	<u>A vérifier avant chaque perfusion :</u> - Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients - Dose - Informer le médecin si: ▪ patiente enceinte ou allaitante ▪ intolérance héréditaire au fructose (IHF) : Vyepti® contient du sorbitol (40,5 mg/flc) et doit être évité en cas d'IHF, sauf si strictement nécessaire ^[1,4].			
Matériel nécessaire	- 1 ou 3 flc de Vyepti® - 1 perfusion de NaCl 0,9% 100 mL - 1 miniplasco NaCl 0,9% 20 mL - Venflon, robinet à 3 voies + IV dressing - Seringues 10 mL + aiguille - 1 filtre Codan Set i.v Star 10® - filtre 0,22 µm (à commander au magasin central EHC ou GHOL : n° art. EHC 110'774; n° art. GHOL 432'595)			
Préparation	Toujours diluer avant administration Quelle que soit la dose prescrite, toujours la diluer dans un volume de 100 mL NaCl 0,9% : - Prélever la dose prescrite - Puis, l'injecter dans le flex de 100 mL de NaCl 0,9% 100 mg (1 mL = 1 flc) + 100 mL NaCl 0,9% → c = 1 mg/mL 300 mg (3 mL = 3 flc) + 100 mL NaCl 0,9% → c ≅ 3 mg/mL - Mélanger <u>délicatement</u> en retournant la poche. NE PAS AGITER ! Ne jamais injecter la solution si elle présente des particules visibles, une coloration altérée ou trouble.			
Administration & Vitesse de perfusion ^[1]	Administration seulement après dilution. - Poser le Venflon avec robinet à 3 voies (1 voie pour rinçage NaCl 0,9%, 1 voie pour Vyepti®) - Ajouter le filtre 0,22 µm Codan Set i.v Star 10® en ligne - S'assurer que la solution préparée soit à température ambiante avant de la perfuser - Perfuser en IV exclusivement par voie périphérique en 30 minutes minimum, que ce			

Rédacteur	V. Barbey
Vérificateur	C. Challet
Approbateur	N. Schaad

	soit pour une dose de 100 mg ou 300 mg. Ne pas injecter en bolus ! - Administrer Vyepti® seul (autres médicaments séparément, sur une autre tubulure) - Rincer avec 20 mL de NaCl 0,9%		
Surveillance	<u>Avant</u> : TA, T°, fréquence cardiaque	<u>Pendant</u> : TA, T°, fréquence cardiaque toutes les 10 min ^[5] pendant les 30 min. de perfusion, signes d'intolérance, allergie, anaphylaxie, ...	<u>Après</u> : Surveillance pendant 1h après la fin de la perfusion ^[5] ou selon ordre médical
	Si réaction allergique / anaphylactique : stop perfusion et tél Dr.		
Conservation et stabilité	- <u>Flacon non ouvert</u> : au frigo (2-8°C) dans l'emballage original et à l'abri de la lumière - <u>Solution diluée</u> : 8 h à T° ambiante ^[3]		
Fréquence RV	Toutes les 12 semaines.		
Commentaire / Remarques particulières	Des réactions d'hypersensibilité comprenant des réactions anaphylactiques, dyspnée, urticaire, rougeur du visage et rash ont été décrites. La plupart des cas se sont produits pendant la perfusion et n'étaient pas graves. Vu le coût élevé du traitement, ne pas préparer la perfusion en avance, mais attendre la confirmation écrite de l'ordre médical. A chaque traitement, documenter le numéro de lot et la date d'expiration dans le dossier du patient		

Abréviations :

c concentration finale ; flc flacon ; IV voie intraveineuse

Références :

[1] www.swissmedicininfo.ch, consulté avril 2026

[2] Fichier d'Administration des Médicaments Injectables (FAMI), Service de Pharmacie, CHUV, consulté avril 2026

[3] Utilisation de la perfusion Vyepti®. Lundbeck (Suisse) SA, CH-VYEP-0520 05/2026

[4] Hegde V. et al, Hereditary Fructose Intolerance, StatPearls, 29.5.2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559102/>

[5] Propositions PIC, 24 août 2026