

## PROTOCOLE DE PREPARATION ET ADMINISTRATION DE VERDYE®

<b>Présentation du produit</b>	principe actif (p.a):	Vert d'indocyanine
	excipients :	-
	conditionnement :	Poudre pour préparation sol. injectable (25 mg/ flacon)
<b>Indications et dosages</b> [1], [2]	<b>Indications</b>	
	Visualisation des voies biliaires	2,5 mg
	Angiographie de perfusion (anastomose digestive, parathyroïde,...)	5 mg
<b>Mise en garde / Précautions / CI</b>	<b>A vérifier avant chaque injection:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dose</li> <li>- absence d'hypersensibilité à l'indocyanine ou à l'iode</li> </ul>	
<b>Matériel nécessaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdye® flacon 25 mg</li> <li>- Eau stérile amp. 10 mL</li> <li>- NaCl 0,9% 100 mL (rinçage)</li> </ul>	
<b>Préparation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconstituer 1 flacon de Verdye® 25 mg avec 10 mL <b>d'eau pour préparation injectable</b>. [2]</li> <li>- Aspirer le contenu du flacon dans une seringue de 10 mL et apposer l'étiquette suivante :</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="margin: 0;">VERDYE - vert d'indocyanine 25 mg (1 Note) + 10 mL eau ppi 1 mL = 2,5 mg Date:.....H:.....Visa:.....</p> </div> <p style="text-align: right;">(n°10870)</p>	
<b>Administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pour injection par <b>voie intraveineuse uniquement</b> ! Périphérique ou centrale.</li> <li>➤ <b>Timing et technique d'injection:</b></li> <li>- <b>Visualisation voies biliaires</b> : injection <u>au moins</u> 60 min. avant l'intervention (dès l'arrivée dans le service) sachant que plus le délai est grand, meilleure est la qualité des images.</li> <li>- <b>Contrôle de la perfusion</b>: bolus au moment de la détection en flushant avec 10 ml de NaCl 0,9% (en salle d'opération en coordination avec l'opérateur ; détection 20 à 30 secondes plus tard). (peut être répété jusqu'à la dose max.)</li> <li>➤ <b>Technique de rinçage avec NaCl 0,9%:</b></li> <li>- si injection préopératoire dans le service : rincer avec perfusion d'entretien posée (NaCl 0,9%)</li> <li>- si injection en salle : flusher à la seringue avec 10 mL NaCl 0,9% après l'injection de Verdye®</li> </ul>	
<b>Effets indésirables potentiels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Réaction anaphylactique</b></li> <li>- Bouffées de chaleur, prurit, urticaire, bronchospasme, rougeurs cutanées, hypotension, tachycardie, nausées, œdème du visage...</li> </ul>	
<b>Conservation et stabilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Flacon non ouvert</u>: Température &lt; 30° + abri de la lumière</li> <li>- <u>Solution reconstituée</u> : 6h à T° ambiante [3]</li> </ul>	

**Références :**

[1] information du fabricant, 2016

[2] Recommandations de pratiques Dr A. Garcia

[3] <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>