

Morges, le 16 juin 2021

NOUVEAU : Dextrose gel 40% pour la néonatalogie

Madame,
Monsieur,

Suite aux nouvelles guidelines de la Société Suisse de Néonatalogie sur la prévention et le traitement de l'hypoglycémie néonatale¹, le **Dextrose gel 40%** entre dans la liste des médicaments réservés à la pédiatrie.

DEXTROSE GEL 40% n° art. PIC : 12'826 Seringue prête à l'emploi 2,5 mL	
Composition	Glucose 400 mg/mL
Excipients	Hydroxyéthylcellulose, sorbate de sodium, acide citrique, eau pour préparation injectable
Stockage	à température ambiante
Stabilité après ouverture	Usage immédiat, jeter le gel restant

Le mode d'administration recommandé est le suivant ² :

Administration

Ne jamais administrer le Dextrose gel directement dans la bouche du patient ou à travers une sonde entérale.

1. Mettre un gant propre
2. Sécher doucement la muqueuse buccale interne des joues avec une compresse stérile.
3. Appliquer la moitié de la dose de Dextrose gel 40% sur le doigt ganté et masser délicatement un côté de la muqueuse interne de la joue du nouveau-né pendant 30 secondes pour permettre l'absorption du glucose.
4. Répéter la même opération avec le restant de la dose sur l'autre côté de la muqueuse buccale.

Seringue à usage unique et pour un seul patient. Jeter la seringue avec le reste de gel non utilisé

En espérant que ce nouveau produit vous donnera satisfaction, je reste à disposition pour tout complément d'information et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Dr Corinne Challet
Pharmacien-chef adjoint

¹ https://www.neonet.ch/application/files/9716/0915/3976/2020_SSN_hypoglycaemia_e_neu.pdf, consulté le 9.6.2021

² Extrait de la Monographie 'Dextrose Bichsel gel buccal 40%', RefMed, NINJA, CHUV, <https://refmed-consult.chuv.ch/login>, consulté le 9.6.21